

De mexikanske Levermosser.

Efter Prof. Fr. Liebmans Samling

beskrevne af

Dr. C. M. Gottsche.

Forord.

Om afdøde Professor *Liebmans* Fortjenester af Botaniken og om den utrættelige Iver, hvormed han tilveiebragte sine store Samlinger til den *mexikanske Flora*, er det unødvendigt her at sige Noget; derom foreligger der tilstrækkeligt Vidnesbyrd i de af ham i dette Selskabs Skrifter udgivne Arbeider. Men netop ligeoverfor det betydelige Plante-Udbytte af hans mexikanske Reise maa det være mig tilladt at udtale den Beklagelse, at endnu en saa stor Deel af det henligger, om ikke ubenyttet, saa dog endnu monographisk ubearbeidet; jeg skal exempelviis her kun nævne de mexikanske Bladmosser, der visselig turde indeholde baade sjeldne og rige Skatte, og det saameget mere, som Mosserne havde været en Yndlingsgjenstand for hans Studier.

Jeg havde den Lykke allerede inden *Liebmans* Afreise til Mexico at være i Forbindelse med ham, og allerede da havde jeg forud givet ham det Løfte at ville bestemme hans Samling af Levermosser, et Arbeide, hvortil den afdøde *Lindenberg* havde tilsagt mig sin Bistand. I Forening have vi ogsaa indfriet dette Løfte i vort *Supplementum Synopseos Hepaticarum*; men vi havde dog der forbeholdt os at bekjendtgøre en udførligere Undersøgelse af dem som et botanisk Anhang til *Liebmans* mexikanske Reise. Begge disse mine Venners Død har imidlertid tilintetgjort denne Plan; mig alene blev det forbeholdt at fuldstændiggjøre vort Fælleds-Arbeide og her at forelægge det større Publicum dette, udstyret med tyve Kobbertavler, som Selskabet saa forekommende har indrømmet dertil. Hvorledes skulde ogsaa Selskabet bedre vise sin Anerkjendelse af dets for Videnskaben saa tidlig tabte Medlems Virksomhed, end ved at gjøre Udbyttet af hans Planteindsamlinger saa frugtbart og lettilgængeligt for Videnskabsmændene som muligt?

Før *Liebmans* Reise til Mexico kjendte man fra dette Land kun 23 Arter af Hepaticæ, hvoraf de 8 varer nye; de vare deels samlede af *Alexander v. Humboldt*, *Ruiz* og *Pavon*, *Schiede* og *Deppe*, samt *Leibold*, deels vare de tilfældigen fundne paa hjembragte Løvmosser af *Hampe* og *Sommerschü*. *Liebmann* alene samlede derimod over 200 Arter af mexikanske Levermosser, og af disse vare de tre Fjerdedele nye for Videnskaben.

Til dette nye Materiale har jeg her tilføjet Uddyttet af en senere Indsamling, gjort af den afdøde *Frederik Müller* i Omegnen af Vulkanen Orizaba, ligesom ogsaa de allerede tidligere i Synopsis Hepaticarum optagne Former, saa at de efterfølgende Blade ville indeholde en Oversigt over samtlige mig hidtil bekjendte mexikanske Levermosser.

Da det ikke var muligt i Figurer at gjengive alle de nye Arter, maatte der efter Skjøn træffes et Valg; at Slægten *Plagiochila* har i denne Henseende faaet Forrang, har deels sin Grund i, at den er den rigest repræsenterede i Mexico, og deels deri, at dens Planters Størrelse mest vil tildrage sig Samlerens Opmærksomhed.

G.

I. **Gymnomitrium.** *Synops. Hep. p. 2.*

1. ? *Gymnomitrium miniatum* *Lindbg. et Gottsche.*

G. rhizomate repente microphyllo radiculoso, ramis adscendentibus erectis capitatis stoloniferis, foliis arcte imbricatis ovato-quadratis basi apiceque attenuatis integerrimis emarginato-bilobis, fructu . . .

Synops. Hepat. p. 617. n. 8. b.

Den danner tætte Tuer, og er funden uden Frugt paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 10,000 Fod, i September. Hb. Liebm. n. 358^a.

Caules 3—5-lineares, vix 2 lineas emergentes deorsum in rhizomata defossa, radicellis parcis vestita transeuntes, intricati, ramosi; rami teretiusculi foliis arcte imbricatis praedita nullum inflorescentiae vestigium produnt. Folia parva, ovato-quadrata, apice lunata, parte superiore miniato-purpurea. Discus folii cellulis tetragonis, pentagonis et hexagonis, magnitudine inaequalibus conformatur, quarum parietes miniato-rosei apparent; basi media cellulae maxima sunt. Si folia cum liquore kali caustici paulisper cocta et aqua abluta liquore zinci bijodati tinguntur, colore violaceo omnes cellulae aequaliter coloratae apparent, interjecta linea hyalinata, quae cellulae membranam primariam sistit nec hoc processu alteratur*). Areola violacea plerumque angulos et parietes obscurius tintos monstrat, scilicet incrassationes membranae secundariae. Levi ictu series cellularum e nexus suo separari possunt, quia concoctione cum liquore caustico inter se solvuntur; ruptura autem cuticulae folium ambientis liberae fiunt. Cellulae singulæ circumcirca margine hyalino depictae in angulis embolum conicum apice clariorem monstrant, inter quos paries in sinum parvum recedit; quare linea hyalina inter cellulas in contextu normali remanentes saepe quasi crenulata appetat. In foliis gemmae terminalis incrassationem hanc a primis initii sequi possit; dum cellulae apicem versus sitae, quae aetate proiectiores sunt, characterem descriptum monstrant, in cellulis basalibus, quae juniores sunt, incrassationis

* Cl. Wigand (Flora, Regensburg 14 Febr. 1861 p. 88. 89) in »Beleuchtung von Schachts Behandlung der Frage über die Intercellularsubstanz und Cuticula« hanc lineam hyalinam pro membrana prima habet, cl. Schacht contra in commentariis suis (Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewächse I. 1856 p. 115 sq.) hanc lineam e materia intercellulari consistere docet.

nullum vestigium adest; si series paullo superiores perlustres, unum alterumve punctum obscure violaceum in angulis observes, mox autem quatuor anguli incrassatione fortiore depinguntur, donec denique emboli prominentes omnium cellulae angularum invenientur. Linea alba ubique inter cellulas incrassatas observatur, sed in cellulis junioribus nondum omnino excultis visum effugit, et tantum in triangulo parvo hyalino notissimo inter 3 vel 4 cellulas posito videri potest; unde membranam primariam in juventute tenuiorem non solum expansione crescere sed etiam incrassari (aeque ac membrana secundaria incrassatur) optime cognoscimus. — Saccus primordialis cellulae coctione cum liquore caustico in discum irregularem viridi-flavum coagulatur. In cellulis parietibus incrassatis gaudentibus interdum unus alterve porus obnubilatur, sed accuratiore investigatione locus hyalinus parietis facile invenietur, cui alter cellulae vicinae respondebit. Caulis cellulis longioribus et angustioribus componitur, quarum quaevis fere 3—4 cellulas folii longitudine aequat, latitudinem tamen cellularum minorum folii raro habet; supra et subtus hae cellulae oblique truncatae cellulas prosenchymaticas imitantur; parietes laterales plerumque per totam longitudinem ita incrassati sunt, ut canalis remanens tertiam totius latitudinis partem vix expletat.

Cum inflorescentiae ne vestigium quidem innotuerit, dubitatio de genere nobis restat; habitu *Gymnomitrium adustum* vel *Sarcoscyphi Funckii* formam minorem refert, qua re commoti plantulam hoc loco cum signo dubitationis collocavimus.

II. *Sarcoscyphus.* *Synops. Hep. p. 6.*

1. *Sarcoscyphus Mexicanus Lindbg. et Gottsche.*

S. foliis subrotundis basi lata amplectentibus subcomplicatis apice patentibus sinu acutiusculo laciiniis ovatis acutis, involucralibus convolutis acute bifidis profunde discretis, radicibus flagellaribus.

Synops. Hep. p. 618. n. 6. c.

Liebmann fandt denne Art i de tætte Skove, som bedække Siderne af Cerro de Sempaltepec i en Høide af 9000 Fod, i Juni. Hb. Liebm. n. 188.

Caulis pollicaris et longior, flagella emittens, erectus, parce ramosus; rami non-nunquam fasciculati, basi foliis vestiti brevioribus dissitis. Folia superiora imbricata, verticalia, subrotunda, basi caulem amplectentia et subcomplicata, apice patenti-reflexa (suprema magis erecta) ad tertiam partem bifida, sinu plerumque acuto, laciiniis latiusculis ovatis acutis. Folia involucralia tenera, convoluta, acute bifida, profunde discreta. Fructus matus non visus.

Folii discus areolis inaequalibus componitur, quae, si folia cum liquore kali caustici cocta liquore zinci bijodati tinguntur, formā substellatā propter angulos conice prominentes apparent, inter quas linea hyalina varie sinuata decurrit; saepius in hoc spatio hyalino hiatus appareat, quia secundum clar. Schacht (Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewächse I. (1856) p. 115) materia intercellularis liquore kali caustici soluta evanuit, vel si cum clar. Wigand illam materiam conjungentem deneges, quia cellularum parietes invicem tantum per intervalla solvuntur. Ex mea sententia autem in illis locis cuticula folii rupta est, quae cellulas etiam solutas continet, donec levi ictu contra laminam vitream dirumpitur. Cellularum incrassatio a primordio angularis est, sed protrahitur per totum parietem, ut cellulae margine violaceo obscuriore circumscripiae appearant; in foliis gemmae terminalis basis tota e cellulis angulis rotundatis sine ulla incrassatione componitur, nec in imis seriebus praesertim versus marginem triangulum hyalinum intercalare videri potest, dum cellulae basales mediae jam hanc crucem hepatologicam monstrant. Si series paullo superiores perlustres, invenias incrassationem punctiformem in angulis, interjecto illo trigono hyalino intercalari; incrassationes mox crescunt usque donec denique in embolum conicum notabilem prominent, qui apice colore violaceo dilutiore tinctus magis conspicuus est. Inter hosce embolos porus parietalis invenitur, qui cum poris adjacentium cellularum circulationi inservire videtur, et easdem leges sequitur, quae in plantis phanerogamis normales putantur. Si cautius et brevius folia cum liquore kali caustici coquuntur, plerumque in cellulis tinctis saccus primordialis conservatur ejusque brachia poris supra commemoratis respondent; si folia diutius coquuntur, plerumque in discum viridi-flavescensem reducitur; acido sulphurico concentrato saccus primordialis clarior fit, et calore adhibito, e cellula, cuius tegmen solvitur, protruditur. — Cellulae caulis longiores formam cellularum prosenchymaticam lignorum imitantes, 3—5 cellulas folii longitudine aequant, sed latitudine minores sunt; incrassatio parietum mihi non obvia.

Affinis *Sarcoscypho Ehrharti* habitu, sed foliorum laciniis magis acutis et involucri foliis acute bifidis discretis diversus.

III. **Plagiochila N. et M. Synops. Hepat. p. 22.**

1. **Plagiochila dimorpha Lindbg. et Gottsche.**

Pl. caule repente ramoso, ramis adscendentibus (in sterilibus saepe fasciculato-comosis apicem versus plerumque aphyllis) foliis subhomomallis ovatis apice emarginato-bifidis uno altero dente interjecto (vel polymorpho in sterilibus surculis), margine ventrali

e basi nuda interdum reflexa arcuato dentatis (rarius subintegerrimis), dorsali subintegerrimo recto vel levi flexura paullo decurrentibus, perianthio obovato compresso alato (ala latissima spinoso-dentata) ore spinoso-dentato, foliis involucralibus majoribus arctius dentatis, ceteroquin conformibus.

Synops. Hepat. p. 627. n. 2. d.

Denne Plante fandt Liebmamn paa Vulkanen Pico de Orizaba i en Høide af 10,000 Fod iblandt *Plagiochila longispina* i September; Hanplanten fandtes i de dybe Skove paa Cerro de Sempaltepec i Juni med udstøvede Antherer.

Planta fertilis foliis paullo longioribus et inter se magis congruentibus primo adspectu paullum aliena videtur; tamen quo longius autem illam conspexeris, eo magis cum planta sterili originali convenire videtur, ita ut has duas formas in unam speciem conjungere non dubitarim. Rami 2—3-pollicares, plerumque flexuosi; steriles saepe propter iniquum situm inter alias Plagiochilas, ut suspicamur, vel tempestatis injuria coacti in cirrhos nudos pollicares et plus quam pollicares abeuntes. Hi ramuli vel omnino nudi sunt, ut nec foliorum nec radicularum vestigium prodant, vel interrupte foliati foliis caducis, vel apice tantum novam foliorum gemmulam evolentes. Folia imbricata, et ubi magis disticha sunt, ab utroque margine magis convoluta; ubi distantiora, subsecunda sunt; longitudo 1— $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{3}$ lin., apice fere $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. lata, pars disci latissima $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ —1 lin.— $1\frac{1}{3}$ lin. metitur; folia caulinata (sive rectius rami principalis) ovata, vel in planta sterili ovato-quadrata, basi folii latitudinem dimidiata fere aequantia, margine ventrali parce dentata vel rarius subintegerrima (dentes 3—6 numeravi), apice excisura polymorpha gaudentia, plerumque emarginato-bifida, laciniis versus basin aequa ac sinu obtuso uno altero dente ornatis, rarius truncata, interdum 4 dentibus armata; margo dorsalis integerrimus vel interdum unico dente armatus recta vel linea leviter arcuata, praesertim si reflectitur, in caulem longius decurrit; folia ramulorum oblongo-quadrata vel oblongo-ovata, marginibus subintegerrimis apice sinu angustiore lunatove bifida. Rarius ad basin ramulorum amphigastria ovato-acuta vel elliptica uno altero dente praedita nonnulla (duo) inveniuntur. Textura qualis in plerisque Plagiochilis; componit enim folii discus cellulis inaequalibus plerumque 6-angularibus, quibus rarius areolae quadrangulares, saepius 5—7—8-angularares interpositae sunt. Incrassatio plerumque in angulis adest, quin, si porus nullus relinquitur, totum parietem lateralem invadit et exosmosin hac parte turbare videtur; in plerisque cellulis autem 6 pori, si areola sexangularis est, ad communicationem liberam per ambas membranas primarias et interjectam materiam intercellularem cum cellulis adjacentibus relinquuntur. Folia cum liquore kali caustici cocta ablutaque zinco bijodato tincta membranam cellulae primariam hyalinam, secundariam violaceam maculasque angularares obscuriores et interdum incrassationes parietales monstrant; saepissime ex coctione in medio cellulæ discus subrotundus flavescens (sacci primordialis

residua, e materia azotica(?) constantis) invenitur. Si levi ictu contra laminam vitream cellulae cuticulae ruptura inter se solvuntur, areolae discum superiorem et basalem loraque angusta in angulis descendantia videoas, dum paries lateralis inter angulos hyalinus est.

Spicae masculae confertae e paribus 6—10 foliorum perigonialium compositae; folium perigoniale obovatum lobulo dorsali conduplicatum, apice et margine repandum dentatumve. Perianthium junius obovatum compressum $1\frac{1}{3}$ lin. longum, ore $\frac{2}{3}$ lin. latum; ala latissima ($\frac{1}{4}$ lin.) tota longitudine spinoso-dentata; labia subrotundata spinoso-dentata. Folia involucralia majora, 2 lin. longa, latissima parte $1\frac{1}{6}$ lin., apice $\frac{1}{3}$ lin. metiuntur, margine dorsali reflexo parce spinoso-dentata, ventrali arctius spinoso-dentata; in insequentiibus foliis subinvolucralibus margo dorsalis integerrimus; longitudo eorum $1\frac{1}{2}$ lin. est, latissima parte $\frac{2}{3}$ lin. metiuntur.

Tab. II. fig. 1. Ramus plantae magnitudine naturali. fig. 2. pars rami a ventre visa $\frac{1}{7}$. aucta. fig. 3. folium caulinum inferius. figg. 4. 4. folia perigonalia (6). Tab. XIV fig. 1. perianthium. fig. 2. folium involucrale. fig. 3. folium subinvolucrale primum. fig. 4. folia caulina inter laminas vitreas compressa.

2. *Plagiochila patula N. ab E.*

Pl. caule repente, ramis erectis dichotomis laxis, foliis subimbricatis dimidiato-ovatis elongatis patulis basi dorsali longe decurrentibus margine ventrali apiceque truncato spinuloso-denticulatis, fructu in ramulis terminali, perianthio obovato margine dorsali alato (ala integerrima) ore oblique truncato dentato-ciliato.

Lindenbg. Monographia Plagiochil. p. 21. n. 10. tab. 3. — Synops. Hep. p. 26. n. 5.

β Leiboldi, perianthio ore brevius dentato, ala apice 3—10-denticulata, foliis longioribus utrinque longe decurrentibus, amphigastriis in ramis basalibus saepius obviis.

Synops. Hep. p. 629. n. 5.

I Nærheden af Plantagen Zazuapan (5 Leguas Ø. for Byen S. Antonio de Huatusco) i Departementet Vera Cruz fandt sandsynligvis Leibold denne Plante med riig Fructification. (2500—3000' Høide.)

Plantae 3-pollicares, valde ramosae; rami cum foliis 2— $2\frac{1}{2}$ lin. lati. Folia cinereo-flava 1— $1\frac{1}{3}$ lin. longa, medio $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. lata; majora basi $1\frac{1}{6}$ lin. et apice $\frac{1}{3}$ lin. lata; tota longitudo marginis dorsalis fere 2 lin.; margo ventralis, e basi nuda deorsum in laciniam angustam producta, in angulum rotundum assurgens leviter sinuatus inaequaliter serrato-dentatus; apex truncatus quadridentatus; margo dorsalis ad medium usque anguste reflexus et integerrimus, excepta parte subapicali bi—tri-dentata. Discus folii cellulis hexa-

gonis inaequalibus componitur, quae versus basin longiores et irregulares fiunt et cum cellulis tetragonis oblongis saepius commutantur; areolae majores prope baseos medium. Cellulae ubique angulis incrassatis; incrassatio tamen angularis tam angusta est, ut cellula 6 punctis majoribus definita appareat. In folio perichaetiali fere dimidia pars inferior cellulatis elongatis subtetragonis irregularis formae componitur, quae angulos obtuso-rotundatos habent, quamquam plerumque sex (rarius quinque) aliis cellulis cinguntur. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta intra limites hyalinos membranae primariae parietes violaceos subsinuato-emarginatos angulis leviter incrassatos monstrant. In stirpibus nonnullis ad basin versus et in novellis ramis basalibus, quae plerumque majoribus gaudent foliis, amphigastria bi-plurifida margine dentata inveniuntur. Folia involucralia $1\frac{1}{3}$ lin. longa, parte latissima $\frac{2}{3}$ lin. lata, margine ventrali spinoso-dentata, dorsali in parte superiore dentato-serrata; folia subinvolucralia prima, interdum etiam alterum folium subinvolucrale secundum, marginem dorsalem summum denticulatum habent. Perianthium junius campanulatum, $\frac{2}{3}$ lin. longum, ore $\frac{5}{6}$ lin. latum, adultum $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{3}$ lin. longum, ore $\frac{2}{3}$ lin. latum, ala dentata praeditum. Capsula ovalis componitur 6 stratis, quorum extimum cellulas duplo maiores hyalinas monstrat; omnia autem habent incrassationes validas fuscas parietes cellularum fulciantes; stratum intimum fibris semicircularibus, ut mos est, depictum.

Observat. Inter Hepaticas beati Liebmanni apud Mirador sub n° 225 collectas formam sterilem et masculam inveni, quae *Plagiochilae patulae* adnumerari potest, et quam in commentariis meis var. γ *brevifoliam* designavi. Habet amphigastria parva distantia bifida (laciniis ciliato-dentatis) vel plurifida, et quasi forma intermedia videtur inter *Plagiochilam patulam* β *Leiboldi* et formam trinitensem hujus plantae a celeberrimo Crüger collectam. A *Plagiochila aliena* forma folii recedit; *Plagiochila paupercula* folium paullo latius et fortius dentatum habet.

In Synopsi Hepaticarum p. 629 legitur: «Specimina in regno Mexicano a cl. Leibold lecta habent folia subundulata et perianthii alam dentatam. Reliquis vero convenient cum planta Jamaicensi». Folia subundulata et perianthii alam apice dentatam, qualem in nostra planta video, in planta Bancroftii e Jamaica quoque invenio; os perianthii dentibus brevioribus in nostra armatum. Lindenberg verisimiliter «plantam Jamaicensem» stirpem Swartzianam, cuius perianthium alam integerrimam revera habet, nec Bancroftii significabat.

Exemplaria mexicana a Ruiz et Pavon collecta, quorum frustula tantum vidi, mihi adhuc suspecta. Exemplaria Deppii prope Xalapam collecta haud hujus loci, sed propriam speciem ex mea sententia sistunt.

Tab. II. fg. 1. Perianthium auctum $1\frac{7}{11}$. fg. 2. folium involucrale. 3. fol. florale. fg. 4. pars rami a dorso visa. fg. 5. 6. folia ramea soluta inter laminas vitreas compressa. fg. 7. amphigastria in ramo principali obvia.

3. *Plagiochila subcontracta* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis iterato-dichotomis, foliis imbricatis ovatis patentibus, margine ventrali e basi nuda (interdum reflexa) arcuato serrato-dentatis, dorsali reflexo integerrimo levi sinu longe decurrentibus, apice subrotundato truncatove inaequaliter dentato-spinuloso, perianthio (juniore) campanulato compresso non alato, ore subrotundo spinuloso-dentato, foliis involucralibus conformibus spinosioribus, dentibus curvatis interdum duplicatis.

Synops. Hepat. p. 629. n. 5. c.

Iblandt flere andre Jungermannier fandt Liebmann denne Art ved La Foya og i Districtet Chinantla. Hb. Liebm. n. 513 et 417.

Rami adscendentes, flexuosi, 2—3-pollicares, basi indivisi, a medio inde dichotome ramosi, ramulis patentibus subfasciculatis, basi nudiusculi, tum arcte foliosi. Folia rami principalis majora $1\frac{1}{2}$ lin. longa, medio $\frac{5}{6}$ lin. lata, prope apicem $\frac{1}{2}$ lin. lata; folia ramea 1 lin. longa et $\frac{1}{2}$ lin. lata, imbricata, siccitate apice contracta, divergenti-remotiuscula, paullum oblique ovata, suprema patula aliquanto longiora angustiora acuminata, reliqua apice subdivergentia basi convexa, longe decurrentia; margine dorsali vel basi vel (superiora praesertim) tota longitudine late reflexo-convoluta integerrima, ventrali basi interdum reflexa vel (inferiora imprimis) dilatata et supra caulem producta, ut cum foliorum basibus alterius lateris cristam nudam efficiant, integerrima, a medio ad apicem serrato-dentata, apice ipso rotundato serrato-spinosa, ob dentes inaequales acuta vel truncato-emarginata. Rarius et margine dorsali sub apice dens unus vel alter accedit. Discus folii componitur celiulis plerumque sexangularibus inaequalibus, sed intercurrunt, ut fieri solet, areolae 5—7— et 8-angulares, quarum anguli incrassati sunt; in cellulis basalibus mediis incrassatio angularis paullo fortior, et saepius totus paries interangularis incrassatur. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tineta duplificem cellulae membranam, hyalinam primariam et secundariam violaceam monstrant; residuum materiae in cellulis obviae in discum oblongum vel ovatum inaequalemque coagulatur; jam compressae inter laminas vitreas, sed melius adhuc, si ictu levi solvuntur, cellulae discum superiorem violaceum monstrant, ex quo radii angulares ad basin descendunt, quae iterum disco violaceo cellulam claudit; parietes cellulae laterales, nisi incrassati sunt, pellucidi, loro angulari angusto violaceo discreti; punctum extrellum angulare radio plerumque paullo latius et obscurius violaceum incrassationem membranae secundariae manifestat; quae incrassationes angulares, si maiores fiunt, in disco folii, ubi omnes cellulae adhuc cohaerent, spatium hyalinum inter cellulas quasi crenulatum vel serpentinum depingunt, quia per membranam hyalinam primariam in cellularum connubio perlucent. Spicae masculae breves, ovatae, terminales; paria 6—8 foliorum perigonialium. Folia haec arcte imbricata, basi concava amplectentia margine

anguste reflexa, apice acuto patulo serrato-denticulato. Perianthium (junius) campanulatum aequo longum ac latum, obovatum, nulla ala praeditum, ore rotundatum, labiis spinulosodentatis. Folia involucralia et floralia (subinvolucralia) margine ventrali spinoso-dentata, dorsali saltem ad apicem versus serrato-dentata.

Plagiochila patula, foliis supremis affinis, foliis omnibus erecto-patulis angustioribus, *Plagiochila socia* foliis angustioribus paullo aliter formatis et dentibus validioribus differt, dum folia involucralia dentes minores habent quam *Plag. subcontracta*.

Tab. III. fg. 1. Ramus plantae magnitudine naturali; fg. 2. folia ramea a ventre visa $\frac{1}{4}$ aucta; fg. 3. folia rami principalis apicalia a dorso visa; fg. 4. perianthium junius; fg. 5. folium involucrale; fg. 6. folium florale vel subperichaetiale primum; fg. 7. folium rami principalis inferius.

4. *Plagiochila Chinantlana* *Gottsch.*

Pl. caule repente ramis erectis, foliis interdum retroversis laxioribus ovato-deltoideo-truncatis, margine ventrali e basi contracta dentata reflexa subarcuatim adscendente spinoso vel duplikato-spinoso, dorsali subrecto reflexo, apice lunulato-bidentato dentibus uno vel pluribus minoribus interjectis, perianthio obovato compresso angustissime alato (ala nuda), labiis rotundis spinuloso-dentatis (dentibus mediis longioribus), foliis involucralibus majoribus argutius et densius spinoso-dentatis.

- α , *laxior*, foliis retroversis laxius dispositis subconvolutis;
- β , *minor*, foliis paullo minoribus magis imbricatis;
- γ , *elongata*, foliis longioribus quam in β , dentibus brevibus.

Liebmann fandt denne Art i Districtet Chinantla imellem 4—5000 Fods Høide, og Varieteten γ i de tætte Høiskove, som bedække Siderne af Cerro de Sempaltepec i Departementet Orizaba*).

Rami varietatis α longiores, sesquipollicares, fusi, laxius foliati. Folia fusco-viridia, inter laminas vitreas compressa figuram ovali-trapezoideam monstrant, basi et apice fere aequalia, $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine ventrali rotundato spinoso-dentata, dorsali plerumque integerrima (tamen unum alterumve dentem invenimus); longitudo 1 lin. — $1\frac{1}{2}$ lin.; latitudo variat a $\frac{1}{2}$ lin. — $\frac{2}{3}$ lin. — imo 1 lin.; folia involucralia $1\frac{1}{3}$ lin. longa et $\frac{5}{6}$ lin. lata sunt. Perianthium (junius adhuc) alterum $\frac{5}{6}$ lin. longum et $\frac{1}{2}$ lin. latum, alterum 1 lin. longum et

* Paa den originale Kapsel, hvori denne Plante iblandt andre Jungermannier fandtes, stod: »Chinantle $\frac{5}{4}$ n. 506.« Jeg antager, at det skal være: »Districtet Chinantla i Depart. Oajaca«; men muligt er det, at Liebmann fandt Planten ved Chinautla, som er en Indierlandsby i Provindsen Puebla paa omtrent 7000 Fods Høide; isaafald skulde Navnet lyde: *Plagiochila Chinautlana*.

$\frac{2}{3}$ lin. latum prope os. Textura foliorum qualis in reliquis; areolae sexangulares cum quinquangularibus et octangularibus promiscue apparent; folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta incrassatos cellulæ angulos monstrant, et versus basin folii etiam totus paries lateralis incrassatione induitur. Si coctionis experimentum felicius absolvitur, omnes cellulæ monstrant sacculum primordiale sexradiatum vel totidem radiis praeditum, quot angulos habet cellula; sacculus flavicans manifesto per violaceum colorem membranae secundariae perlucet et extrema brachii parte aliquantum dilatata projecturam parvam facere videtur, cui prominentia cellulæ proximae respondet, ut ibi exosmosis per angustissimum parietem interjacentem fieri possit. Eodem modo prius hanc conditionem vidi in *Plag. meridana*, et si quis poros lignorum vidi, hanc imaginem eodem modo intelligere studebit.

Rami varietatis β minores, pollicares, fusci; folia fuscescentia, minora, sed dentes fere longiores habent; $\frac{2}{3}$ lin. — $\frac{5}{6}$ lin. longa, medio $\frac{1}{2}$ lin. lata; folia cocta et tincta sacculum brachiatum primordiale minus bene monstrabant, ceteroquin eodem modo se habent ac folia varietatis α . Inflorescentia mascula in medio ramo; spica fusiformis 6 paribus foliorum perigonialium constituitur, quae basi saccata et apice patente 3—4-dentato (dente medio apicali maximo) utuntur.

Rami varietatis γ pollicares, fusci; folia flavo-virescentia, $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa, basi $\frac{1}{3}$ lin., medio $\frac{1}{2}$ lin. apice $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{6}$ lin. lata; longiora quam in var. β , margine ventrali reflexa, superiora fere utrinque convoluta, patenti-disticha; textura qualis in var. β .

Diffr. var. α a *Plagiochila irregulari* foliis paullo aliter conformatis, denticulatione et praesertim conformatione apicis foliorum; a *Plagiochila Lansbergii* G. (Mss.) perianthii forma et ala foliorumque apicibus.*)

Tab. V. Plag. Chinantlana α . fg. 1. Perianthium $\frac{1}{7}$. auctum. fg. 2. folium involucrale. fg. 3. pars rami a ventre visa. fg. 4. 5. folia a dorso visa. fg. 6. 7. folia inter laminas vitreas compressa. Var. β fg. 1. ramus a ventre visus. fg. 2—7 folia varia. Var. γ pars rami a ventre visa $\frac{1}{7}$. aucta.

*)

Plagiochila Lansbergii Gottsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus, foliis discretis patentibus ovato-deltoideis, margine ventrali e basi contracta subnuda interdum ad medium reflexo spinoso-dentato, dorsali tota longitudine reflexo integrerrimo, apice rotundato spinoso-dentato (vel inter dentes maiores lunulato-bidentato), perianthio obovato elongato non alato ore rotundato spinoso, foliis involucralibus conformibus majoribus margine ventrali (aeque ac floralibus) dentibus curvatis spinoso ciliatis.

E Venezuela in Hb. Dozy et Molkenboer; communicavit vir nobilis Lansberg. (Ex Hb. Sand. Lacost.)

5. *Plagiochila irregularis* *Gottsch.*

Pl. caule repente, ramis erectis flaccidis subsimplicibus, foliis interdum retrorsus patulis laxioribus deltoideo-truncatis, margine ventrali e basi contracta nuda reflexa arcuatim adscendente subrotundo spinoso-dentatis, dorsali reflexo subrecto integerrimis, apice oblique truncato pluridentato vel dentibus minoribus interjectis bidentato, perianthio campanulato compresso alato, ala subintegerrima parva, ore subrotundo spinuloso-dentato, foliis involucralibus et floralibus conformibus longius dentatis et margine dorsali latius reflexis.

Plagiochila distinctifolia γ (lecta a Regel) *Synops. Hep.* p. 631. n. 14.

Denne Plante samlede Regel i Mexico uden nærmere Angivelse af dens Opdagelsessted. (Hb. Lindenberg et Hampe.)

Rami sesquipollicares erecti, fusi, parce ramosi. Folia viridi-flava, siccitate subcrispata, interdum subconvoluta praesertim margine dorsali; $1\frac{1}{3}$ lin. — $1\frac{1}{6}$ lin. longa, basi contracta $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. lata, parte latissima $\frac{2}{3}$ lin. — $\frac{5}{6}$ lin. — 1 lin. lata, dum apex folii ad $\frac{1}{3}$ lin. latitudine contrahitur; si expanduntur inter laminas vitreas, formam trapezoideam monstrant, marginem dorsalem fere rectum, ventram arcuatum prope basin indeque versus apicem deflexum spinisque parvis dentatum. Textura foliorum qualis in plerisque *Plagiochilis*; incrassatio cellularum angularis, quae versus basin folii saepius in incrassationem totius parietis lateralis transit.

Perianthium campanulatum compressum, medio subventricosum, $\frac{5}{6}$ lin. longum et prope os aequa latum, alatum, labiis subrotundis spinuloso-dentatis. Ala in tribus exemplaribus, quae dissecui, praesens, sed angusta et dimidiam perianthii altitudinem fere attingens; in uno exemplari tantum nonnullos denticulos monstrabat, in reliquis integerrima erat. Folia involucralia ejusdem magnitudinis ac folia ramea majora, ventram marginem spinosorem, dorsalem latius convoluto-reflexum habent.

Plagiochila Chinantlana α , quae habitu simillima, differt foliis et perianthio spinosioribus dentibus interdum duplicatis; *Plag. simplex* perianthii forma elongata labiisque ciliato-dentatis ut et foliis involucralibus diversa; *Plag. heteromalla* β ex Insula Sti. Christophori (*Synops. Hep.* p. 56. n. 86. β laxior) foliis latioribus aliterque conformatis eorumque denticulatione, perianthio et foliis involucralibus, *Plag. distinctifolia* γ *latifolia* (stirps guianensis Montagnei, *Synops. Hep.* p. 30 n. 14 γ) denique foliis angustioribus differt.

Tab. XI. fig. 1. Perianthium $\frac{1}{17}$. auctum cum folio involucrali. fig. 2. pars dimidia perianthii cum toro pistillorum. fig. 3. folium involucrale. fig. 4. pars caulis a ventre visa. fig. 5. 6. 7. folia a caule soluta.

6. *Plagiochila intermedia* *Lindbg. et Gottsche.*

Pl. caule repente intricato-ramoso, ramis strictiusculis fasciculatis, foliis patentibus contiguis oblongis, margine ventrali levi curvatura aequa ac apice truncato dentatis, dorsali subintegerrimo reflexo levi arcu in caulem descendantibus, fructu terminali vel in dichotomia vel subveniente innovatione laterali, perianthio campanulato labiis compressis spinoso-dentato alato (ala brevi angusta apice uni-tridentata), foliis involucralibus conformibus majoribus et fortius dentatis.

Synops. Hepat. p. 629. n. 6. c.

Liebmann fandt denne Art i Nærheden af Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Departementet Vera Cruz med Frugt i Januar.

Caules repentes, rami adscendentes sesquipollicares, inferne foliis detritis vestiti, mox inordinate dichotomo-ramosi vel etiam fasciculato-divaricati. Folia siccitate crispabilia, contigua, $\frac{5}{6}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{3}$ lin., apice $\frac{1}{6}$ lin. lata, oblonga, basi paullo dilatata, margine dorsali propter partem reflexam oblique vel levi sinu adscendente subintegerrimo, versus apicem interdum uno altero dente obsito, margine ventrali 6—8 dentibus laxe serrato versus apicem interdum repando, basi fere semper integerrima nec vestigium cristae formante, apice truncato plerumque tridentato. Textura foliorum vulgaris; areolae praecipue sexangulares cum areolis 5-, 7-, et 8-angularibus promiscue discum folii constituant. Folia cocta et zinco bijodato tincta incrassationem cellularum angularem et saepius alteram cum altera confluentem monstrant; sacculus primordialis tenerioris naturae esse debet, cum coctione semper in discum flavescentem coalescat. Folia involucralia majora, 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, patula, ceteroquin conformia, sed margine ventrali versus basin magis dentata dentibusque longioribus praedita. Perianthium junius foliis perichaetialibus superatur, quae adultum, $\frac{5}{6}$ lin. longum et ore aequa latum, fere aequat; junius obovatum campanulatumve compressum, anguste a medio alatum; ala saepius apice unidentata ceteroquin integerrima, semel 3 dentes monstravit; perianthium adultum ex ambitu trapezoideo magis in obovatum transit, basi propter fructum inclusum cylindricum, sed egresso fructu ore semper labiis compressis gaudet. Os perianthii spinoso-dentatum; in unico exemplari capsulae transitu angulo laterali perianthium divulsum erat. Capsula ovoidea, valvulis oblongo-ovalibus, pedicellus $2\frac{1}{2}$ lin. longus. Inflorescentiam masculam non vidi.

Est haec *Plagiochila intermedia* quasi forma inter *Plag. crispabilem*, *Montagnei* et *Plag. disticham*, sed foliorum forma ab omnibus differt.

Tab. I. fig. 1. Planta naturali magnitudine. fig. 2. perianthium $\frac{1}{4}$. auctum. fig. 3. folium involucrale. fig. 4. folium subinvolucrale. fig. 5. pars rami fructiferi a dorso visa. fig. 6. pars rami a ventre visa.

7. *Plagiochila dubia Lindbg. et Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis adscendent-i-erectis dichotome divisis, ramulis elongatis patentibus, foliis subimbricatis semisubverticalibus oblongo-ovatis utrinque decurrentibus margine dorsali rectiusculis integerrimis subreflexis, ventrali e basi subreflexa vel toto vel ad apicem parce serrato-dentatis, apice spinuloso-dentatis (supremis saepe bifidis laciniis acutis), perianthio (juvenili) campanulato compresso alato, ala apice parce dentata angusta, ore rotundato dentato, foliis involucralibus erectis conformibus.

Synops. Hepat. p. 630. n. 6. d.

Liebmann samlede denne Art i Departementet Vera Cruz ved Colipa (800') i Marts med unge Perianthier. (Hb. Liebm. n. 127. ex p.)

Caules repentes, rami adscendentes vel erecti, simplices aut in nonnullos ramulos dichotome divisi, ramuli patentes. Folia 1 lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, contigua, inferiora subimbriata, ramulorum sicco statu ob margines convolutos distantia et fere subulata, rami principalis folia sicca fere eundem ac humecta situm servantia, semi-vel subverticalia, oblongo-ovata, basi utraque (ventrali angustissima lacinia) decurrentia, margine dorsali recta vel paullum excisa, integerrima, saepe anguste reflexa, ventrali basi plerumque reflexa rarius, plana, rotundata, medio magis minusve arcuata vel integerrima vel parce serrata, ad apicem dentata, apice ipso vel truncato vel emarginato bi-quadridentata, dentibus spiniformibus inaequalibus. Folia involucralia 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, erecta, caulinis similia sed majora. Textura vulgaris folii; folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tineta incrassationem angularem vulgarem cellularum monstrant, interdum tamen tam tenuem, ut oculos effugiat, rarius confluentem et parietalem. Fructificatio junior tantum visa. Perianthium campanulatum, compressum, dentatum, alatum, ala apice dentata. In uno exemplari monstrositatem inveni, scilicet perianthium duplex; perianthium externum cylindricum rite alatum oreque labiis spinosis perfectis armatum, perianthium internum non alatum, pistilla fowens, ore obliquo ad modum perianthii junioris, sed labiis serrato-dentatis gaudens.

Maxime affinis *Plag. crispabili*, quae tamen distinguitur foliis sublinearibus medio non dilatatis, madido statu quoque margine subreflexis semper ad apicem solummodo dentatis, ut et majore statura.

Tab. II. fg. 1. Ramus magnitudine naturali. fg. 2. pars rami a dorso visa $\frac{1}{1}$. aucta. fg. 3. pars ejusdem rami a ventre visa. fg. 4. perianthium. fg. 5. folium involucrale. fg. 6. folium florale. fg. 7. 8. fructificatio monstrosa perianthium duplex ostendens. sc. fg. 7. perianthium externum et fg. 8. perianthium internum.

8. *Plagiochila acanthoda* *Lindbg. et Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus dichotome divisis ramulis subdivaricatis, foliis approximatis patentibus divergenti-deflexisque, infimis subrotundis superioribus subovatis ovatoque-lanceolatis, basi utrinque paullum decurrentibus, margine dorsali subreflexis integerrimis, ventrali subarcuatis dentato-spinosis (basi dentibus longioribus incurvis) apice inaequaliter dentato-spinosis (vel emarginato-spinosis), supremis basi ventrali subreflexis subintegerrimis, perianthio

Synops. Hep. p. 633. n. 21. b.

β *minor*, foliis subsecundis.

Synops. Hep. p. 633. n. 21. b. var. β .

Plagiochila stolonifera β Synops. Hep. p. 655. n. 83. d.

β^* *cirrhosa*, ramis in cirrhos nudos abeuntibus.

Liebmann fandt denne Art i Departementet Vera Cruz i Omegnen af Hacienda de Mirador ved Chistla i December uden Frugt samt Hanplanten; Varieteten β voxer paa Plantagen Mirador (3000') og ved San Antonio Huatusco (4500'); β^* fandt Fredr. Müller ved Rio de Orizaba i Omegnen af Vulkanen Orizaba uden Frugt.

Planta 2—3-pollicaris (in var. β pollicem haud multum excedens), basi simplex, tum dichotome ramosa; ramuli patentи-divergentes. Folia approximata vel basi imbricata, inferioria brevia, subrotunda, reliqua subovata vel (in primis in ramulis supremis) oblonga aut ovato-lanceolata, $\frac{2}{3}$ — $\frac{4}{5}$ lin. longa, medio $\frac{1}{2}$ lin. lata, basi ventrali transverse cauli adnata et paullum decurrentia, patentia vel subdivergenti-deflexa, margine dorsali subreflexa integerima basi longius sed angusto tractu decurrentia, ventrali paullum rotundata, dentato-spinosa, basi arctius dentata (dentibus longioribus incurvis) et subreflexa vel in nonnullis foliis etiam subintegerrima; apice vel obtusa vel oblique truncata vel emarginato-bispinosa, plus minus regulariter dentato-spinosa. Color viridis; nonnulla folia rufescentia. Textura foliorum vulgaris; incrassatio angularis parum conspicua, quae deinde lateralis fit; membrana prima et secundaria cellularum inter se solvi non possunt.

Var. β minore statura et foliis subsecundis aliquantum differt, sed foliorum textura et forma eadem est ac in varietate α ; planta e Huatusco, quam ad var. β adduxi, foliis paullo minoribus at conformibus gaudet, ceteroquin non diversa videtur. Var. β^* cirrhosa, foliis minoribus paullum diversa, caules habet apice in cirrhos nudos semipollicares aut pollicares interdum bifidos abeuentes, summo fine gemmam foliosam hic illic monstrantes. Similem statum etiam in *Pl. dimorpha* reprehendimus.

Spica mascula in medio ramo e 12 paribus foliorum perigonialium constat, quorum apices acuti 3-pluridentati sunt.

Differt haec planta a proximis *Plagiochilis* foliorum apice et denticulatione; *Plagiochila Maximiliana* G. MSS.^{*)} enim gaudet foliis margine ventrali toto et apice rotundato regulariter serratis, *Plag. Montagnei* aequo ac *Plag. incerta* G. habent folia magis triquetra minusque dentata; a plantis in *Synopsi Hepatic.* I. c. laudatis multo magis differt neque cum illis commutari potest.

Tab. V. fig. 1. Pars rami varietatis α a dorso visa $\frac{1}{7}$ aucta. fig. 2. pars rami varietatis β a ventre visa. fig. 3 et 5. folia varietatis β . fig. 4. folium varietatis α .

9. *Plagiochila expansa* *Gottscche.*

Pl. caule repente, ramis erectis apice dichotome fasciculato-ramosis, foliis subimbricatis patentи-divergentibus subhorizontalibus oblongis decurrentibus, margine ventrali e basi nuda subreflexa arcuatim adscendente toto serrato-dentatis, dorsali anguste reflexo usque ad apicem fere integerrimis, apice ipso subtruncato et sub apice dentatis (dentibus angularibus majoribus uno altero denticulo interjecto), fructu terminali et laterali, perianthio campanulato compresso alato (ala apice bidenticulata vel inermi) ore sinuato oblique subtruncato, labiis spinoso-dentatis laciniis mediis fere longioribus, foliis involucralibus majoribus magis ovatis, margine dorsali latius reflexis serrato-dentatis, ventrali spinoso-dentatis.

Frederik Müller fandt denne Art i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Rio blanco, og paa Sierra de San Cristobal i Januar med Perianthier.

Planta e caule repente multos (10—12) ramos $1\frac{1}{2}$ —2-pollicares erectos protrudit, ramiculos alternantes, interdum dichotomos vel apice fasciculatos edentes, ut in latitudinem 2 pollicum expandatur; rami cum foliis in statu humido 2 lin. lati. Folia subhorizontalia, apice oblique deflexa, $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa, parte latissima $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin. et apice fere $\frac{1}{4}$ lin. lata, superiora fortius dentata, viridia. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta incrassationem cellularum punctiformem angularem loraque angusta descendentia monstrant, versus basin folii interjecta materia incrassatio lateralis continua, sed tamen superficie

*)

Plagiochila Maximiliana *Gottscche* *MSS.*

Pl. caule repente, ramis erectis strictiusculis superne subfasciculatis, foliis imbricatis patentи-divergentibus elongato-ovatis, (in adultis) margine ventrali e basi nudiuscula rotunda toto et apice rotundato serrato-dentatis, dorsali recurvato integerrimo leni flexura longius decurrente (in novellis foliis brevioribus ovato-quadratis apice bi-tridenticulato truncatis); perianthio . . .

Jung. cristata N. ab Es. in Mart. Flor. Brasil. I. 1. p. 369. n. 64.

Plag. hypnooides *Synops. Hep.* p. 45 (secundum exemplaria in Brasilia in *Hornschuchia bryotrophe* a Seren. Princ. Maximiliano Neovidensi lecta.)

Differt a *Plag. hypnoide* amphigastriorum defectu.

cialis, oritur. Folia involucralia, quorum alterum saepe patens, alterum adpressum et perianthii fere altitudinem aequans, $1\frac{1}{6}$ lin. longa et parte latissima $\frac{2}{3}$ lin. lata sunt; foliorum subinvolucralium par primum et secundum marginem dorsalem dentatum habent. Perianthium 1 lin. — $1\frac{1}{6}$ lin. longum, ore sinuoso $\frac{5}{6}$ —1 lin. latum; labia interdum partim reflexa; e tribus perianthiis, quae dissecui, unum alam apice bidentatam, reliqua duo alam inermem habebant. Planta mascula desideratur.

Affinis est *Plagiochilae intermediae* et *dubiae*, sed foliis latioribus magisque dentatis diversa.

Tab. XVI. fg. 1. Perianthium $\frac{17}{1}$. auctum. fg. 2. folia involucralia. fg. 3. par subinvolucrale primum. fg. 4. pars caulis a ventre visa.

10. *Plagiochila socia* *Lindbg. et Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis erectiusculis flexuosis simplicibus dichotomeve divisis, foliis contiguis crispabilibus semi-subverticalibus ovato-oblongis basi utrinque longe decurrentibus reflexisque, margine ventrali a medio fere serrato-dentatis, apice ipso et sub apice inaequaliter spinoso-dentatis, fructu lateralı, perianthio (juniore) campanulato subalato, ala inermi angusta, ore rotundato arce breviterque dentato, foliis involucralibus erectis acuminatis.

Synops. Hepat. p. 630. n. 6. e.

Liebmann fandt denne Art i de hede skyggefulde Skove ved Colipa (800') i Departementet Vera Cruz med unge Perianthier i Marts. (Hb. Liebm. n. 127 ex parte).

Folia infima breviora ovato-rotunda, reliqua ovata vel oblonga, margine ventrali a medio fere serrato-dentata, apice saepe tri-, haud raro vero pluridentata, in nonnullis dente uno altero sub apice in margine dorsali accidente, basi ventrali cuneata vel reflexa vel planiuscula; in ramulis novellis minoribus folia subintegerrima apice exciso-bidentata; folia sicca ramulorum ab utrinque convoluta, subuliformia, dum rami principalis folia crispato-subcontorta fiunt nec eundem situm ac folia humecta servant. Folia 1 lin. longa, medio $\frac{1}{2}$ lin., apice $\frac{1}{3}$ lin. lata sunt. Textura qualis in reliquis *Plagiochilis*; cellulæ sexangulares vel 5-, 6-, 8-angulares discum folii componunt; in foliis coctis et dein zinco bijodato tinctis incrassationem angularem vulgarem atque transeuntem in parietalem videre licet; areolæ solutæ hyalinæ membranæ primariæ circumdatae a latere visae loris incrassatis angularibus ad basin descendantibus ibique cum disco basali connexis quasi cellulæ contiguationem monstrant, interjectis spatiis hyalinis pro sacculi primordialis brachiis cum cellulis adjacentibus correspondentibus. Cellulæ caulis elongatae, prosenchymatice apicibus acutis

vel oblique truncatis cum proximis conjunctae, fere dimidiam latitudinem quam disci cellulae habent, at longitudine varia, mox aequante mox duplo vel triplo longiore, gaudent.

Perianthium junius $\frac{5}{6}$ lin. longum, ore $\frac{1}{2}$ lin. latum.

Caute distinguenda a *Plag. dubia* foliis minus confertis non toto margine ventrali dentatis et perianthii ala inermi; *Plagioch. Zazuapana* foliorum positione secunda et forma diversa.

Tab. II. fig. 1. Planta magnitudine naturali. fig. 2. pars rami principalis $\frac{1}{17}$. aucta (folia inferiora) a dorso visa. fig. 3. ramus superior a ventre visus $\frac{1}{17}$ auctus. fig. 4. perianthium. fig. 5. folium involucrale a ventre visum.

11. *Plagiochila Zazuapana* Gottsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis inordinate et pauciramosis, foliis discretis (rarius subimbricatis in caule principali) retroversis secundisve subovatis basi cuneatis, margine ventrali e basi nuda reflexa inaequaliter dentatis, dorsali reflexo integerrimis, apice truncato 3-4-5-dentatis, perianthio . . .

Plagiochila rutilans β in Synops. Hep. p. 633. n. 21.

Liebmann fandt denne Art uden Frugt paa Plantagen Zazuapan (4500') 5 Leguas Østen for Byen S. Antonio de Huatusco, i Departementet Vera Cruz, i November.

Rami adscendentes flexuosi 2—3-pollicares, paucos ramulos patenti-flexuosos edentes, fusco-rubri. Folia $1\frac{1}{6}$ lin. longa, basi $\frac{1}{4}$ lin., apice $\frac{1}{3}$ lin. lata et, qua parte latissima sunt, $\frac{5}{6}$ lin., pallide flavo-viridia, siccitate minora utrinque subconvolvuntur, dum majora crispantur; foliorum forma subovalis, margo ventralis a basi ad medium fere reflexus dentibus spinosis 4—6 (rarius 8) armatus, apex plus minus truncatus, 3—5-dentatus, sed varius propter sinulos inter dentes minores vel majores; margo dorsalis anguste reflexus integerrimus vel sub apicem unum alterumve dentem habet. Textura folii vulgaris; discus areolis 6-, 5-, 7-, 8-angularibus componitur; folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta incrassationem angularem monstrant, sed plerumque totus paries lateralis invaditur, et in fundo folii cellulae plerumque tantum porum apicalem et basalem habent, si cum pariete recto conjunguntur, vel duos apicales, si cum parietibus obliquis cellularum adjacentium basi vel apice cohaerent; pori laterales, ut videtur, non adsunt, qua conditione magis caulis cellulas aemulantur, quae canalem medium habent; cellulae caulis prosenchymatice inter se apicibus acutis vel oblique truncatis conjunctae sunt; ubique videtur porus vel locus, ubi membrana primaria hyalina cellulae lumen sola occludit.

Plagiochila Xalapensis foliis minoribus apice angustioribus et toto habitu, *Plag.*

socia foliorum figura et denticulatione minore differt; a *Plagiochila irregularis*, quam habitu ex longinquo aemulatur, foliorum forma bene distinguitur; a *Plag. Lambertina* G. (= *Plag. rutilans* β Synops. Hep. p. 33) omnino diversa.*)

Tab. VI. fig. 1. pars rami a latere visa (folia secunda) $\frac{1}{1}$. aucta. fig. 2. 3. folia a ventre visa. fig. 4. folium a dorso visum.

12. *Plagiochila Xalapensis* Gottsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus pauciramosis subdichotomis, foliis basi imbricatis patentibus ovato-oblongis, margine ventrali e basi nuda interdum subreflexa paulo contracta serrato-dentatis, dorsali subreflexo integerrimo levi flexura in apicem truncatum pluridentatum (vel angustatum bidentato-lunulatum) transeunte, perianthio . . .

Plagiochila patula Lindenbg. in Monogr. Plagioch. p. 21. et in Synops. Hepat. p. 27 (quoad exemplaria a cl. Deppe apud Xalapam collecta.)

Deppe samlede denne Plante uden Frugt ved Jalapa (4500 Fods Høide).

Rami pollicares et ultra, fusi. Folia ramulorum juniora siccitate convoluta, vetustiora naturalem fere situm servant; inter laminas vitreas explanata trapezoideam figuram edunt; majora $1\frac{1}{6}$ —1 lin. longa, parte latissima $\frac{1}{2}$ lin., apice $\frac{1}{5}$ lin. lata, minora $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{2}$ lin. lata; color flavo-viridis. Textura foliorum qualis in plerisque *Plagiochilis*; discus folii areolis 6-angularibus, interjectis pentagonis et octagonis, componitur. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta figuram vulgarem obtuse stellatam violaceam obscurius coloratam in cellularum areola monstrant; incrassatio angularis ubique praesens, sed versus basin folii plerumque totus paries lateralis incrassatur, ut medio angustum lumen, aequo latum ac parietum amborum incrassationes, remaneat; tamen membranas primariam et secundariam inter se solvere, ita ut ictu levi nucleus (incrassatus cellulae saccus interior) ejiciatur, mihi non contigit.

*)

Plagiochila Lambertina Gottsche.

Pl. caule repente, ramis primariis adscendentibus strictiusculis subsimplicibus, ramulis patentibus apice curvatis, foliis distantibus erecto-patulis vel patenti-recurvis patentissimisque margine ventrali e basi nuda cuneata reflexa grosse spinoso-dentatis, dorsali convoluto-reflexo arcuato longe decurrentibus, apice angustato subacutis vel subtruncatis dentatis, perianthio ovato basi contracto (non alato) labiis rotundis dentatis, foliis involucralibus erecto-patulis (propter innovationem sub perianthio ipso prodeuntem) conformibus.

Plag. Lambertina Gottsche in Übersicht p. 37. (Mohl & Schlecht. Bot. Zeitg. 1858. Beiblatt.)

Plag. rutilans β . Lindenbg. Monogr. Plag. tab. XI. p. 47. — *Synops. Hep.* p. 33. n. 21. β .
Habitat in Jamaica (Comes de Lambert in Hb. Hook.)

Tab. III. fig. 1. Pars rami a ventre visa aucta $\frac{1}{4}$. fig. 2—6. folia a caule soluta inter laminas vitreas compressa.

13. *Plagiochila aliena Gotsche.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis, foliis basi imbricatis patulis subovatis oblongis utrinque longe decurrentibus versus fructificationem subcristatis, margine ventrali e basi subrepanda nuda subreflexa dentato-serrato in apicem truncatum 4—5-dentatum transeunte, dorsali fere tota longitudine reflexo integerrimo (excepta extrema parte apicem versus paucidentata), amphigastriis parvis bifidis angustis et marginibus lateralibus spinuloso-dentatis, perianthio campanulato compresso oblique truncato alato, ala inermi, labiis serrato-dentatis, foliis involucralibus paullo majoribus et latioribus, quam ramei sunt, margine dorsali 5—6 dentibus sparsis armato.

Fandtes i Mexico uden nærmere Angivelse af Opdagelsesstedet.

Rami bipollicares, flexuosi. Folia ramulorum juniora siccitate convoluta, dum folia rami principalis situm servant et paullum sinuoso-crispata fiunt; majora $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{2}{3}$ — $\frac{4}{3}$ lin. lata, apice contracto $\frac{1}{3}$ lin., minora $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. medio et apice $\frac{1}{4}$ lin. lata sunt; folia involucralia $1\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{5}{6}$ lin. lata. Incrassatio cellularum angularis ubique praesens versus folii basin augetur et denique, materia confluente, totus paries lateralis invaditur; membranam cellulae primariam a membrana secundaria violacea in cellulis coctis solvere non potui. Amphigastria parva, minora $\frac{1}{15}$ lin. lata, maxima $\frac{1}{6}$ lin. lata. Perianthium campanulatum 1 lin. longum; latitudo prope orificium in altero $\frac{5}{6}$ lin., in altero 1 lin. explet.

Diffrer a *Plagiochila patula* ♂ *Leiboldi* amphigastriis in ramulis praesentibus, foliorum forma subovata et latiore versus basin, foliis involucralibus majoribus, dentibus minoribus armatis, perianthio denique breviori.

Tab. I. fig. 1. Perianthium $\frac{1}{4}$. auctum. fig. 2. folium involucrale. fig. 3. pars rami a ventre visa. fig. 4. 5. folia caulina (cum amphigastrio adhaerente). fig. 6. 7. folia rami novelli. fig. 8. amphigastria.

14. *Plagiochila paupercula Gotsche.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus vase ramosis subdichotomis, foliis imbricatis patentibus ovato-elongatis utrinque longius decurrentibus, margine ventrali e basi nuda grosse dentato-serrato, apice truncato 4—5-dentato (dente medio interdum latiori prominulo), margine dorsali reflexo plerumque integerrimo, perianthio campanulato compresso alato (ala

inermi) ore subobliquo rotundato labiis spinoso-dentatis, foliis involucralibus conformibus margine ventrali spinis longioribus armatis.

Ikkun faa Planter (hvorf den kaldtes «paupercula») af denne Art fandt Liebmann sammenvoxende med flere andre Jungermannier i de dybe Skove i Omegnen af Hacienda de Mirador i Marts med unge Perianthier.

Ramuli sesquipollares, rectiusculi vel flexuosi, fusci, cum foliis $1\frac{5}{6}$ lin. lata. Folia flavo-viridia, siccitate apice convoluta, margine ventrali subcrispata, 1 lin. longa, medio $\frac{2}{3}$ lin., et apice $\frac{1}{4}$ lin. lata sunt. Textura foliorum qualis in plerisque *Plagiochilis*; inter cellulas sexangulares promiscue 5-, 7- et 8-angulares conspicuntur; incrassatio cellularum angularis, sed versus basin folii, ubi cellulae longiores sunt, puncta incrassata majora evadunt et ad incrassationem parietis totalem coalescunt; membranas binas cellulam constituentes in cellulis coctis inter se solvere mihi non contigit. Stolones basales, qui postea caulem repente plantae sistunt, radiculas breves et folia breviora habent apice truncato 4—5-dentata, margine ventrali interdum reflexa integerrima; tamen, si longiora sunt, unum alterumve dentem accipiunt. Perianthium campanulatum 1 lin. longum, ore $\frac{5}{6}$ lin. latum, alatum; in duabus perianthiis ala inermis medium perianthii altitudinem non attigit, in alio praeter morem lamina prominens marginis ventralis alam ventralem perianthii longitudinem aequantem formavit. Folia involucralia 1 lin. longa, $\frac{5}{6}$ lin. lata sunt. Differt a *Plag. aliena* proxima amphigastriorum defectu, foliis grosse dentatis et perianthii forma orisque denticulatione; a *Plag. Barutana* Gottsche MSS.* pars rami a ventre visa.

Tab. II. fg. 1. Perianthium $1\frac{7}{11}$. auctum. fg. 2. 3. folia involucralia. fg. 4. folium florale sive subinvolucrale primum. fg. 5. pars rami a ventre visa.

*)

Plagiochila Barutana Gottsche MSS.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus inordinate subdichotomis, foliis subovatis elongatis patentibus utrinque longe decurrentibus, margine ventrali (e basi nuda rectiusculo vel leviter repando) toto aequo ac apice rotundo serratis, dorsali tota longitudine reflexo integerrimo subrecto, amphigastriis nullis, perianthio oblique campanulato alato, ala apice subdenticulata, labiis oblique rotundatis serrato-dentatis, foliis involucralibus conformibus margine ventrali spinosioribus, dorsali convoluto-reflexis subserratis.

In Venezuela prov. Caracas in silva Baruta (4000 ped. alt.) legit A. Trumpff. (Hb. Hampe.)

Forma intermedia inter *Plag. alienam* et *pauperculam*, a priore perianthii forma, amphigastriorum defectu foliorumque configuratione, ab altera foliorum configuratione paullum diversa, statura robustiore perianthiique denticulatione minus prominente differt.

15. *Plagiochila Huatuscana* *Gottsc.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus divaricatis ramosis intricatis, foliis imbricatis subhorizontalibus patenti-divergentibus oblongis utrinque longius decurrentibus, margine ventrali (subrecto e basi nuda arcuatim adscendente) toto dentato-serratis, dorsali in medio sinu reflexis (nisi sub apice) integerrimis, apice oblique truncato pluridentatis, fructu terminali lateralive, perianthio campanulato compresso alato, ala apice denticulata, labiis subtruncatis serrato-dentatis, foliis involucralibus fere conformibus, margine ventrali spinoso-dentatis; spica mascula fusiformi terminali, e 10—12 paribus foliorum perigonialium apice acuto tridentato patulorum composita.

Frederik Müller fandt denne Art paa en Green i Omegnen af San Antonio Huatusco.

Planta ♂ inordinate dichotome ramosa fere sesquipollcaris; rami intricati, foliis mutilatis vestiti, cum foliis $1\frac{1}{2}$ lin. lati, surculos aphyllos plurilineares saepius emittunt, e quibus novelli rite foliosi oriuntur; spicae masculae terminales in ramulis solitariae, sed semel vidi spicam geminatam, ubi ex axilla folii perigonialis in media spica alia spica mascula antherifera exoriebatur. Spica mascula e 10—12 paribus foliorum perigonialium componitur; folium perigoniale basi saccatum in gremio continet 2—3 antheridia, pedicellis, interdum, quam anthera ipsa longioribus, fulta; apex folii acutus, tridentatus, patulus. Folia plantae ♀ rami principalis 1 lin. longa, parte latissima $\frac{2}{3}$ lin. lata, apice truncato $\frac{1}{4}$ lin. explet; ramorum $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, subhorizontalia, planiuscula, saturate viridia.

Folia cocta cum liquore kali caustici et tincta zinco bijodato cellulas angulis incrassatas loraque descendantia monstrant; saepissime adjiciuntur puncta incrassata interangularia, et majore vel minore tractu paries lateralis limbo marginali obscuriore incrassato obducitur.

Folia involucralia 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, qua parte latissima sunt, interdum hanc magnitudinem in fructificatione adulta haud nanciscuntur. Perianthium adultum fere 1 lin. longum, $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin. ore latum post fructus egressum.

Foliorum configuratione similes huic plantae sunt *Plag. aliena*, *Barutana* et *paupercula*, sed si surculi juxta positi simul sub microscopio perlustrantur, omnes diversi videntur; praeterea *Plag. aliena* amphigastria habet, quae in nostra non inveni.

16. *Plagiochila subconvoluta* *Gottsc.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus inordinate ramosis flexuosis, foliis imbricatis patulis subverticalibus ovatis interdum retroversis basi ventrali in ramis principalibus suberistatis, margine ventrali e basi nuda patula vel reflexa toto serrato-dentatis, apice

truncato-rotundatove pluridentatis, dorsali reflexo integerrimo versus basin levi flexura longe decurrentibus, perianthio (juniori) campanulato compresso alato, ala inermi, ore rotundato serrato-dentato, foliis involucralibus conformibus validius dentatis.

Plagiochila patula Lindenberg in Hb. Hampe.

Den fandtes i Mexico uden nøjere Angivelse af Opdagelsesstedet.

Rami 2—3-pollicares, flexuosi, subfuscii. Folia flavo-viridia, majora vel rami principialis $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{5}{6}$ lin. longa, medio 1 — $1\frac{1}{6}$ lin., apice $\frac{1}{3}$ lin. lata; basis, qua cum caule cohaerent, 1 lineae est; folia ramea sive ramulorum minora sunt et variant a $\frac{2}{3}$ lin.— $1\frac{1}{3}$ lin. longitudine, et a $\frac{1}{2}$ lin.— $\frac{5}{6}$ lin. latitudine; apice $\frac{1}{6}$ lin. lata. Stolones basales, e quibus novi caules deinde fiunt, radicellis densis brevibus gaudent eorumque folia, quae optimo jure «caulina» nominari debebant, breviora apiceque rotundo subrepanda vel subintegerrima sunt, mox patentia, mox subadscendentia, ut cum caule interposito canalem forment. Folia cocta et zinco bijodato tincta nihil memorabile praebent; incrassatio cellularum angularis, postremo totius parietis; macula violacea substellularis in cellulis 6-, 5-, 7-, 8-angularibus vulgaris videtur. Perianthium adhuc junius tantummodo visum, pistilla 16—20 habens, campanulatum, alatum; ala medium perianthii altitudinem transgreditur. In folio involucrali altero margo dorsal, aeque ac ventralis, totus serratus videbatur, in altero subintegerrimus.

Difert *Plag. subcontracta* foliis latioribus brevioribusque et dentibus validioribus, praeterea folia basi ventrali latiori caulem praetergradientia alternant vel cristam laxiorem efficiunt; a *Plag. truncata* insequente difficilius distinguitur.

Tab. III. fg. 1. Perianthium junius $1\frac{7}{11}$. auctum. fg. 2. 3. folia involucralia. fg. 4. aliud perianthium (junius). fg. 5. 6. folia involucralia. fg. 7. pars rami a ventre visa. fg. 8. 9. folia novellorum ramorum. fg. 10. folium rameum.

17. *Plagiochila truncata* Gottsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexiusculis pauciramosis, foliis imbricatis patentii-divergentibus ovato-trapezoideis basibus ventralibus alternantibus reflexisque subscristatis, margine ventrali e basi nuda adscendente inaequaliter serrato-dentato, dorsali longius reflexo subrecto levique flexura longe decurrente, apice truncato 4—6-dentato, fructu . . .

Liebmann fandt denne Plante i Urskovene, som beklæde Siderne af Cerro de Sempoaltepec uden Frugt i Juni. Hb. Liebm. n. 184^a.

Caules 2—3-pollicares cum foliis $1\frac{1}{2}$ lin. lati, strictiusculi, fusci, inordinate et parce ramosi, foliis flavescensibus vestiti. Folia a basi ad apicem 1 lin. longa et parte latissima $\frac{5}{6}$ lin., apice $\frac{1}{3}$ lin. lata; margo dorsal totus $1\frac{1}{2}$ lin. longus. Margo ventralis e

basi nuda breviter decurrente in angulum rotundum et, laminâ vitrâ injectâ, caulem longius superantem transiens, deinde tractu plus minus arcuato serrato-dentatus est; margo dorsalis interdum usque ad apicem reflexus hic inde dentes quoque nonnullos habet. Incrassatio cellularum angularis valida, mox totum parietem invadens, relictis tamen poris minoribus cum cellularum adjacentium poris ubique convenientibus.

Differt a *Plag. subconvoluta*, cui similima est, foliis paullo brevioribus paullo magis dentatis basi subcristatis reflexisque et rigidioribus, denique statura minore; a *Plag. andicola* Mont. foliorum conformatio distat.

Tab. X. fig. 1. Pars caulis a dorso visa $\frac{1}{7}$. aucta. fig. 2. pars caulis a latere visa. fig. 3. 4. folia a caule soluta a ventre visa.

18. *Plagiochila exesa* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus dichotome fastigiato-ramosis (rarius simpliciusculis), foliis contiguis patenti-divergentibus oblique ovatis, margine ventrali e basi nuda contracta arcuato crenulato-dentatis, dorsali integerrimo subrecto reflexis, apice rotundato exesis vel denticulis minutis crenatis, fructu in dichotomia vel laterali (unica innovatione proveniente), perianthio oblongo angulis compresso, medio conice inflato, ore subrotundato-crenulato.

Synops. Hepat. p. 629. n. 6. b.

Denne Art fandt Liebmann i de fugtige Urskove paa Siderne af Cerro de Sempoaltepec i Departementet Oajaca; den bærer Frugt og Antherer i Juni. (Hb. Liebm. n. 152 b. et 404.)

Rami erecti, pollicares, simplices, stricti, apice in binas innovationes terminati, vel iteratis innovationibus brevibus fructiferis geniculato-ramosi. Folia $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, ovata, distantia quum patent (sed inter laminas vitreas compressa, imbricata), margine ventrali repando-dentata, dorsali reflexo integerrima in caulem decurrentia, apice denticulato-exesa, vel angulato-exesa crenulatave; folia novellorum ramorum apice acutiore dentata. Textura foliorum vulgaris; in foliis cum liquore kali caustici coctis et zinco bijodato tinctis conspicitur saccus primordialis brachiatus flavescens, per membranam secundariam violaceam perlucens; incrassatio angularis fortior, deinde parietalis, poris pro sacculo primordiali interjectis. Folia involucralia conformia, paullo majora, 1 lin. longa, $\frac{2}{3}$ lin. lata, dorsali margine latius reflexa, patent-erecta. Fructus in dichotomia vel, si una tantum provenit innovatio, vel etiam, si ambae altero latere sub perichaetio protruduntur, lateralis. Perianthium oblongum, obconicum, $1\frac{1}{2}$ lin. longum, $\frac{1}{2}$ lin. latum, ore crenulato, medio superficie utriusque conice inflatum. Capsula ovalis, 6 stratis constans, quorum intimum fibris semicircularibus

fuscos depictum est; strata intermedia incrassationes fuscas irregulares cellularum angulares habent.

Pedunculus capsulae fere $2\frac{1}{2}$ lin. longus. Ex uno perianthio duos fructus egredientes semel vidi, quod in *Plagiochilis* rarius evenit. Planta mascula spicas terminales duodecim parium foliorum perigonialium gignit, et sub ipsa spica ad modum plantae feminae binae oriuntur innovationes heteromallae apice iterum inflorescentiam masculam procreantes.

Permutas plantas examinavi, sed omnium folia erant exesa, ita ut dentes veros marginis tantum hic et illic distinguere potuerim.

Tab. XVI. fig. 1. Pars rami fructiferi $1\frac{7}{8}$ aucta a dorso visa. fig. 2. perianthium. fig. 3. ejus sectio transversalis in superiore parte. fig. 4. eadem in parte iuferiore. fig. 5. calyptra cum capsula. fig. 6. 7. folia involucralia. fig. 8. pars caulis a ventre visa.

19. *Plagiochila Schlimiana* *Gottsc.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus subrectis inordinate dichotome ramosis, foliis imbricatis patentи-divergentibus elongato-obovatis, margine ventrali e basi longius reflexa ad medium fere nudo, a mediо ad apicem et apice rotundo ipso serratis, dorsali reflexo integerrimis longissime decurrentibus; (amphigastriis accessoriis sparsis ovalibus); perianthio campanulato-compresso alato, ala in superiore parte serrato-denticulata, labiis serrato-dentatis; foliis involucralibus majoribus aequae ac floralibus toto ventre sinuato-dentatis dorso subintegerrimis.

Plag. *Schlismiana* *Gottsc.* in Ann. d. sc. natur. (4 sér.) tom. VIII. p. 330. n. 15,
♂, foliis angustioribus, amphigastriis nullis.

Denne Art fandt Hampe blandt Mosser fra Sydmexico (Var. β.) Hovedarten samlede Schlism ved Minco i Provindsen Sa. Martha i Ny Granada.

Rami pollicares, subsimplices, fusi. Folia ovato-elongata, $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine ventrali e basi nuda (exceptis foliis floralibus) longius reflexa a medio ad apicem dentata, apice truncato vel rotundato dentata, margine dorsali toto reflexo rectiusculo versus apicem tantum (1—4—6)-denticulata. Textura foliorum vulgaris; incrassatio levis angularis, interdum in incrassationem parietalem transiens. Amphigastria nulla. Perianthium obovatum compressum, $1\frac{1}{3}$ lin. longum, ore $\frac{5}{6}$ lin. latum, alatum (ala apice subdenticulata) ore truncatum angulis rotundatis. In uno exemplari inveni in perianthio externe normaliter conformato alam internam $\frac{1}{6}$ lin. latam, apice serrato-dentato liberam. Folia involucralia majora, $1\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin. lata, conformia, aequae ac floralia margine ventrali sinuato fortius spinosa, dorsali magis dentata.

Perianthio et foliis involucralibus longioribus angustioribusque differt a forma typica.

Tab. I. fg. 1. Perianthium $\frac{1}{1}$. auctum. fg. 2. folium involucrale. fg. 3. folium subinvolucrale primum. fg. 4. folium subinvolucrale secundum. fg. 5. paries interior perianthii monstrat laciniam accessoriam accretam apice reflexo dentatam. fg. 6. pars rami a ventre visa. fg. 7. 8. folia ramea.

20. Plagiochila Martiana N. ab E.

Pl. caule repente, ramis procumbentibus dichotomis divaricatis laxis, foliis imbricatis subhorizontalibus plano-distichis patentि-divergentibus dimidiato-ovatis et ovato-lanceolatis obtusis vel acutiusculis sub apice apiceque ipso minute arguteque denticulatis, fructu in ramis terminali et e dichotomia, perianthio ovato ore oblique rotundato dentato-ciliato.

Lindenbg. Monogr. Plagioch. p. 12. n. 5. tab. 2; Synops. Hep. p. 28. n. 11.

β , tenerior, foliis integerrimis apice parce denticulatis minus arcte imbricatis.

Synops. Hep. p. 630. n. 11.

Den fandtes i Departementet Oajaca i Districtet Chinantla uden Frugt i Mai Maaned (Hb. Liebmamn n. 437.).

Rami pollicem ad sesqui pollicem longi, a ramificatione *Plag. Martiana* originalis multum aberrantes. Folia $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin. longa, apice $\frac{1}{6}$ lin. lata, parte latissima $\frac{2}{3}$ lin. explet; elongato-ovata, basi ventrali sinuato-patentia vel reflexa, longe decurrentia, apice rotundata vel bidentula, tridenticulata, repanda vel integerrima, margine ventrali e basi nudà arcuatà integerrima vel repanda, margine dorsali reflexa interdum tota longitudine rectà linea vel levi sinu in dorsum caulis paullum lecurrentia; folia flagellorum breviora, basi latiora. Textura foliorum ut in plerisque; discus folii cellulas plerumque sexangulares cum aliis 5—7—8-angularibus mixtas monstrat; incrassatio angularis ubique, rarius et versus basin tantum incrassatio parietalis. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta memorabilem indolem accipiunt; cohaerent enim inter se membranae cellularum primariae arctius, sed levi ictu totus nucleus, ut ita dicam, ejicitur; membrana secundaria violacea tota ad instar nuclei sexangularis secedit a primaria et hoc modo tunicas proprias binas diversa indole praeditas cellularum absque dubio probat; incrassationes angulares cum membrana secundaria cohaerent hancque sequuntur.

Spica mascula paribus foliorum perigonialium variat; vidi 4, 6 et 12 paria in medio ramo et ad basin ramorum; folia perigonalia apice integerrima. Fructificatio desideratur.

Tab. IV. fg. 1. Planta magnitudine naturali. fg. 2. pars rami a dorso visa $\frac{1}{1}$ ⁷. aucta. fg. 3. pars rami a ventre visa. fg. 4—7. folia ramea inter laminas vitreas compressa.

21. *Plagiochila apicalis* *Gottsch.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus inordinate vaseque ramosis apice subfasciculatis, foliis subimbricatis subhorizontalibus plano-distichis patenti-divergentibus oblongis, margine ventrali subarcuato apiceque truncato dentatis, dorsali rectiusculo angustissime subreflexo parum decurrentibus, perianthio obovato alato, ala apice pauci- (3-) dentata, labiis rotundatis spinoso-dentatis, foliis involucralibus majoribus latioribus brevidentatis.

Denne Art voxer paa gamle Træer i Skovene omkring Sartorius's Hacienda de Mirador paa 3000 Fods Høide i Departementet Vera Cruz; Liebmann samlede den med Perianthier i Marts. Der fandtes kun nogle faa Stængler, og da Spidsernes Form ikke alene hidrørte fra Beskadigelse, dannede jeg Speciesnavnet efter dem.

Rami sesquipollares inordinate ramosi, foliorum tantum vestigia ferentes. Folia ramulorum apicalium $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ lin. lata; margo ventralis 4—5 dentes monstrat; apex truncatus 3—4-dentatus, margo dorsalis angustissime subreflexus vel latius versus apicem. Textura foliorum ut in plerisque; folii discus areolis praecipue sexangularibus, cum 5-, 7-, 8-angularibus mixtis componitur; incrassatio angularis ubique, versus folii basin etiam parietes laterales toto circuitu incrassati inveniuntur. Spica mascula ad basin ramorum ex 8 paribus foliorum perigonialium componitur. Perianthium $1\frac{1}{3}$ lin. longum, or. $\frac{2}{3}$ lin. latum, obovatum, ut fieri solet, ventre subsinuosum compressumque. Folia involucralia 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine dorsali aequa ac folia floralia latius reflexa subintegerrima, ventrali brevidentata.

A *Plagiochila Martiana*, cui simillima est, differt ramificatione, perianthio longiori, foliis involucralibus et caulinis formâ et margine ventrali denticulis distinctioribus armato diversis; *Plag. disticha* differt foliis longioribus validius dentatis, forma perianthii non alati et foliis involucralibus spinoso-dentatis.

Tab. III. fg. 1. Perianthium $\frac{1}{1}$ ⁷ auctum. fg. 2. 3. folia involucralia. fg. 4. folium florale sive subinvolucrale primum. fg. 5. pars rami a dorso visa. fg. 6. pars rami a ventre visa.

22. *Plagiochila contigua Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus inordinate dichotome ramosis, summis interdum fasciculatis, ramulis flexuosis, foliis contiguis ovatis subhorizontalibus patentidivergentibus, margine ventrali e basi nuda contracta saepius reflexiuscula adscendente a medio ad apicem et apice ipso truncato serrato-dentatis, dorsali rectiusculo versus basin sinuatam anguste reflexis integerrimis, perianthio campanulato compresso (subalato, ala brevi apice subdenticulata inermive, vel nulla) ore rotundato spinoso-dentato, foliis involucralibus majoribus conformibus margine ventrali toto spinoso-dentatis.

β , *decerpta*, foliis minoribus parcus dentatis.

I Omegnen af Vulkanen Orizaba, ved Aserradero de Santa Cruz fandtes denne Plante af Frederik Müller med unge Perianthier i Juli; β taget af Mosser, indsamlede ved Liebmann i Mexico.

Planta biplicaris; e caule intricato (scilicet e ramis prioribus nunc terra defossis) rami primarii erecti, rigiduli, fusti, pollicares, ramulos mox dichotome-fasciculatos edentes vel simpliciores flexuosos; cum foliis $1\frac{1}{3}$ lin. lati. Folia contigua vel subimbricata, margine utroque recurvo convexiuscula, interdum oblique deflexa, dorso longius decurrentia, viridia, $\frac{2}{3}$ lin. longa, fere $\frac{5}{12}$ lin. lata, sicca crispati nec convoluta, a medio marginis ventralis circa apicem serrato-dentata. Cellulae in apice folii incrassationem angularem, versus basin lateralem monstrant, quae tamen superficialis tantum est; cellulae marginales et dentes parietes incrassatos non habent. Innovationes extra perichaetium sub folio involucrali oboriuntur, unde arctius perianthium basi cingunt. Folia involucralia majora, ceteroquin conformia, $\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine ventrali undulato toto spinoso-dentata, dorsali dentibus distantibus 3—4 armata. Perianthium junius tantum visum; $\frac{2}{3}$ lin. longum, $\frac{5}{6}$ — $\frac{5}{6}$ lin. ore latum; inter 5 perianthia 3 ala carebant, unum ala brevi basali inermi, unum ala apice bidentata praeditum erat; os rotundatum labiis spinoso-dentatis. Planta mascula ignota.

A *Plag. Martiana* et *apicali*, proximis habitu et ramificatione, foliorum forma magis ovata basique latiore et foliis involucralibus brevioribus differt; iisdem notis a *Plag. distinctifolia mexicana* diversa est.

Tab. XIV. fig. 1. Perianthium $1\frac{7}{11}$ auctum (non alatum). fig. 2. folia involucralia a latere visa. fig. 3. folium subinvolucrale primum et inséquens par a ventre visa. fig. 4. perianthium aliud (alatum) $1\frac{7}{11}$ auctum. fig. 5. folium involucrale. fig. 6. pars caulis a ventre visa.

23. *Plagiochila miradorensis* Gottsche.

Pl. caule repente ramis adscendentibus iterato-dichotomis, foliis imbricatis subhorizontalibus planis oblongo-ovatis, margine ventrali subintegerrimo dentatove e basi latius undulato-reflexa tractu subrotundato in apicem angustatum rotundum (interdum 2—3-dentatum) vel oblique truncatum transeunte, dorsali basi subreflexo sinuato integerrimo longius decurrente, amphigastriis angustioribus bi-trifidis, laciniis filiformibus, perianthio obovato compresso alato, ala bidentata, ore subtruncato labiis undulato-reflexis spinoso-dentatis, foliis involucralibus majoribus conformibus margine dorsali toto dentatis.

Plagiochila cucullata β Synops. Hepat. p. 642. n. 40. b.

Liebmann fandt denne Plante i Skovene omkring Hacienda de Mirador paa omrent 3000 Fods Høide med fuldkommen Frugt.

Rami sesquipollicares subdichotomi, cum foliis $1\frac{1}{3}$ lin.— $1\frac{1}{2}$ lin. lati. Folia sicca fere eundem situm servant nec corrugantur, flavo-viridia, 1— $1\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata; caulina e basi dentata vel toto margine ventrali dentata vel subintegerrima inveniuntur, dorsali integerrima; foliorum bases ventrales undulato-reflexae vel erecto-patentes et cum basibus alterius alternantes cristam erectam denticulatam faciunt. Textura foliorum vulgaris *Plagiochilarum*; folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta incrassationem angularem cellularum monstrant, quae versus basin folii fortior evadit et deinde in incrassationem totius parietis lateralis transit; vulgaris figura substellularis violacea etiam in hisce cellulis appetet; tamen membranam externam hyalinam ab interiore secundaria violacea solvere non potui. Amphigastria tenuissima facile praetervidentur, bi-trifida, laciniis elongatis ciliiformibus, ex unica cellularum serie constructis, $\frac{1}{3}$ lin. altis. Perianthium adultum oblongum, obovatum, $1\frac{1}{2}$ lin. longum, prope os $\frac{2}{3}$ lin. latum, alatum, labiis undulato-reflexis spinosis; ala a basi supra medium adscendit et bidentata est. Capsula exserta, pedicellus 2 lin. longus; elateres bispiri seminaque nihil memorabile monstrabant. Folia involucralia $1\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{5}{6}$ lin. lata, circumcirca dentata; apex folii a $\frac{1}{4}$ lin.— $\frac{1}{6}$ lin. latitudine variat.

Differt a *Plag. cucullata* jam primo adspectu, etiam si plantae siccatae sunt, cum *Pl. cucullata* convoluta corrugataque folia monstret, dum *Pl. miradorensis* folia sicca situm eundem ac folia humecta servant; a *Pl. Riojaneirensi* G.* (= *Plag. Javanica* e *Brasilia* in

*)

Plagiochila Riojaneirensis Gottsche.

Pl. caule repente ramis adscendentibus parce ramosis (?) foliis imbricatis subhorizontalibus semi-ovatis, margine ventrali e basi nuda arcuata toto serrato aequo ac apice angustato rotundato, dorsali

Hb. Acad. Petropolitanae, Synops. Hep. p. 631) distinguitur amphigastriis et foliis basi ventrali convoluto-reflexis, praeterea foliis floralibus (subperichaetalibus) margine dorsali inermibus, dum in planta Brasiliensi non solum folia subinvolucralia prima, sed etiam secundum par marginem dorsalem totum dentatum monstrant et in foliis reliquis dentes denique apicem excedunt marginemque dorsalem sub apice armant.

Tab. X. fig. 1. Perianthium $\frac{1}{1}$ auctum. fig. 2. folium involucrale. fig. 3. pars caulis a ventre visa. fig. 4, 5, 6. folia caulina majora a ventre visa. fig. 7, 8, 9. folia ramea. fig. 10. amphigastrium.

24. *Plagiochila distinctifolia* Lindbg.

Pl. caule repente, ramis erectis iterato-dichotomis elongatis subdivaricatis, foliis distantibus subverticalibus patentibus obovato-oblongis basi cuneatis margine dorsali longius decurrentibus, margine ventrali apiceque subacuto inaequaliter dentatis, fructu terminali et laterali, perianthio ovato ore truncato dentato.

Lindenbg. Monogr. Plagioch. p. 17. n. 8. tab. 3. Synops. Hep. p. 30. n. 14.

Multum abest, ut illae plantae, quas Lindenbergius in monographia sua et in Synops. Hepat. loco citato communi vinculo complectitur, sub microscopio observatori eandem imaginem praebeant, nec quemquam, qui plantas huic speciei addictas in Herb. Lindenb. nunc in Academ. Vindobonensi asservato examinaverit, hac in specie complures typos conjunctos esse, effugiet. Cujus rei nec beatus Lindenbergius nescius erat, sed nonnullas formas principales elegit, quibus reliquae adnectebantur. Typum originalem fecit, ut videtur secundum iconem in tab. 3. exaralam, plantam Jamaicensem Hb. Weberi, a Brownio collectam, cui adjecit plantam Brasiliensem a Martio et Comite de Lambert collectam; sed, pro dolor, nec hae plantae inter se omnibus partibus consentiunt; typus β , foliis obtusioribus fuscescentibus, quamquam e Brasilia, jam longius distat; typum γ e Guiana, auctori jam prius dubium, in schedis suis postea ad *Plagiochilam simplicem* traduxit.

A. *Typus Jamaicensis*. Folia breviora basi ventrali latius reflexa apice variabili (lanceolato rotundiusculo) dentata; folia involucralia brevius dentata margine

anguste reflexo levique sinu vel versus apicem latius reflexo et tunc linea recta decurrentibus, perianthio , foliis involucralibus conformibus aequo ac floralibus (ad tertium par) circumcircum dentatis (dentibus marginis ventralis saepe duplicatis).

Plagiochila javanica Lindenbg in Synops. Hep. p. 631. n. 12. (Ex Herb. Acad. Petropolit.)
Denne Art blev samlet ved Riojaneiro.

Defectu amphigastriorum caudaeque crispatae foliorum manifesto differt a *Plag. javanica* originali.

dorsali subintegerrima; perianthium campanulatum alatum ala inermi vel apice bidenticulata (pl. Hb. Weberi).

B. *Typus Brasiliensis.* Folia longiora angustiora apice oblique truncata dentata (dentibus angularibus majoribus uno alterove dente minore interjecto); folia involucralia margine dorsali integerrima (planta Martiana) vel dentata aequa ac folium florale alterum (planta Lambertina).

C. *Typus Mexicanus:* Plag. distinctifolia Liebmenniana.

Pl. caule repente, ramis primariis erectis iterato-dichotomis subdivaricato-ramosissimis, foliis rami principalis contiguis subverticalibus patentibus ovalibus ovatis (rameis distantibus obovato-oblongis), margine dorsali reflexis integerrimis, ventrali paullum arcuato basi leviter reflexo apiceque inaequaliter dentatis, fructu terminali et laterali, perianthio campanulato obovatove, ore dentato-spinoso.

Variat. α , foliis magis discretis truncatis brevioribus (n. 516 b. et 522). Hacienda de Jovo.

β , foliis magis contiguis apice magis ovali. — Mirador.

a) perianthio alato, ala integerrima vel apice unidentata vel pluridentata; foliis involucralibus serrato-dentatis, margine dorsali 3—4 dentibus serrato, apice truncato (n. 339).

b) perianthio obsolete (n. 169) vel non alato (n. 377), foliis involucralibus margine dorsali minus spinosis apiceque rotundiore (4—6 a).

Sed hae formae interdum promiscue quoque in una eademque planta inveniuntur.

Synops. Hepat. p. 631. n. 14.

Liebmann fandt Varieteten α i Nærheden af Hacienda de Jovo (1800—2000') i April og Juli, Varieteten β paa Hacienda de Mirador (3000') i August, October og Februar med unge Perianthier; ligeledes blev den fundet i den dybe, fugtige, skovbedækte Baranka ved Huitamalco paa omrent 2500 Fods Høide og i Urskoven af Cerro de Semipoaltepec.

Lindenbergius hasce plantas ipse pro sua *Plagiochila distinctifolia* declaravit itaque nomen sanxit, sed a planta Brasiliensi multum distant; forma β proprius ad plantam Jamai- censem accedit, cuius perianthium quoque in duobus exemplaribus, quae dissecuere licuit, alam satis perspicuum, alteram integerrimam, alteram apice bidentulam habet; in monographia sua p. 19. Lindenbergius perianthium non alatum inter signa characteristica *Plag. distinctifoliae* enumerat.

Plantae apud Hacienda de Jovo sub n^o 516 et n^o 522 collectae foliorum forma *Plagiochilae distinctifoliae Brasiliensi* magis adpropinquant, sed folia breviora habent. Foliorum cellulae sine ulla incrassatione sunt, vel si adest, tam parca et punctiformis in angulis invenitur, ut attentius folium adspicere debeas, dum in varietate β (n^o 339 et 377)

ubique in omnibus cellulis egregie adparet. Perianthium non alatum, campanulatum, $\frac{2}{3}$ lin. longum et ore subtruncato aequo latum; labia spinoso-dentata. Folium involucrale, $\frac{5}{6}$ lin. longum, $\frac{1}{2}$ lin. latum, alterum margine dorsali inerme, alterum quadridentatum; folia subinvolucralia prima margine dorsali non armata; folia caulina in planta humecta distantia, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. lata sunt.

Plantae varietati β addictae floribus valde variant. N. 339 exempli gratia, ramum praebuit perianthiis onustum, quorum unum alam angustam integerrimam, alterum alam latiorem apice dentatam et tertium alam apice dentibus duobus armatam monstrabat; in n. 127 quoque ala adest; in n. 377 contra in 3 perianthiis ala nulla inveniebatur; in uno exemplari utrumque folium involucrale marginem dorsalem quadridenticulatum habebat, in altero exemplari alterum folium perichaetiale tantum marginem dorsalem quadridentatum habebat; eandem varietatem characterum in n. 46. a, quem in icona nostra depinximus, invenimus. Perianthium 1 lin. longum, ore $\frac{2}{3}$ lin. latum; folia involucralia 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata sunt; folia caulina $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa, $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ lin. lata.

N. 464 ex Huitamalco formam intermedium sistit, tamen varietati α magis adpropinquans, sed δ tantum invenimus. Spica mascula, vel terminalis vel in medio ramo vel basalis, 8—10 perigoniorum paribus apice patente 2—3 dentatorum componitur.

Tab. VI. Plag. distinctifolia α , ex Hacienda de Jovo. fg. 1. pars plantae fructiferae $\frac{1}{7}$ auctae a ventre visa. fg. 2. perianthium. fg. 3. fol. involucrale margine dorsali dentatum. fg. 4. fol. involucrale margine dorsali integerrimum. fg. 5. pars caulis a ventre visa. fg. 6. pars caulis a dorso visa.

Plag. distinctifolia β e Mirador. fg. 1. perianthium basi obsolete alatum $\frac{1}{7}$ auctum. fg. 2. perianthium alatum. fg. 3. 4. folia involucralia. fg. 5. fol. subinvolucrale primum. fg. 6. pars rami a ventre visa. fg. 7. pars rami majoris a ventre visa. fg. 8. 9. folia ramea. fg. 10. folium caulinum basale.

25. *Plagiochila germana* *Gottsc.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis inordinate ramosis, foliis distantibus subverticalibus patentibus ovato-cuneatis, margine ventrali e basi contracta nuda plus minus reflexa adscendente rotundato plerumque a medio spinuloso-dentatis, dorsali recurvo vel angustissime reflexo rectiusculo integerrimis (rarius sub apice uno altero dente armatis), apice contracto subacuto emarginato-bidentato vel oblique truncato rotundiusculo spinoso-dentatis, fructu laterali terminalique, perianthio obovato compresso alato, ala apice dentata vel inermi, ore subtruncato labiis spinoso-ciliatis, foliis involucralibus majoribus ovatis margine ventrali ciliato-dentatis, dorsali margine plerumque alterius folii parce (6 dentibus) spinoso-dentato.

β *Mülleriana*, perianthii ala inermi, ore aequa ac margine ventrali foliorum involucralium simplicius ciliato-dentato.

I Omegnen af Vulkanen Orizaba fandtes denne Plante, voxende paa Bark af gamle Træer, med Perianthier (Liebmann og Fred. Müller).

Planta Liebmanniana (unica) bipollicaris, rami innovationibus iteratis extra et intra folia involucralia provenientibus flexuosi, elongati; alii rami ex axilla foliorum exoriuntur; caulis fuscus. Folia distantia, majora 1 lin. longa, latissima parte $\frac{1}{2}$ lin. lata, minora $\frac{5}{6}$ lin. longa, medio $\frac{1}{3}$ lin. fere, apice $\frac{1}{6}$ lin. lata; basi contracta $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ lin. lata sunt; margine ventrali rotunda, dorsali rectiuscula, decurrentia, quum sicca sunt, plus minus contracta vel convoluta et patentissima; colore viridi-flavo vel ochraceo. In foliis cum liquore kali caustici coctis et zinco bijodato tinctis cellularum incrassatio angularis punctiformis; in cellulis solutis a latere inspectis in angulis lora versus basin descendentia et interstitia hyalina magna videoas; saccus primordialis coctione in discum flavum coagulatur; in foliis involucralibus angularis incrassatio fortior, mox punctis interjectis totum parietem lateralem corripit, relicto tamen foramine rotundo pro brachio sacci primordialis; dentes et cellularum marginalium paries externus membranam primariam hyalinam haud incrassatam habent. Perianthium $1\frac{1}{3}$ lin. longum, ore $\frac{2}{3}$ lin. latum, obovatum, retroversum; ala in uno specimine angusta et inermis, in duobus aliis exemplaribus sat lata apiceque dentata; dentes labiorum interdum basi denticulo armati. Folia involucralia patentia $1\frac{1}{3}$ lin. longa, parte latissima 1 lin. explet, margine ventrali longius spinoso-dentata, dentibus inaequalibus vario modo flexis interdum basi dente minore quasi duplicatis. Planta mascula desideratur.

Var. β paullo minor; dentes oris perianthii aequa ac foliorum involucralium simpliciores, nec denticulum accessorium basalem habent; ala perianthii et margo dorsalis foliorum involucralium integerrimus.

Propius nostra planta accedit ad *Plag. distinctifoliam* ex Insula S^t Vincentii Herbarii Hook. in Synopsi Hepatic. nostra citatam, sed differt nostra ciliis foliorum praesertim involucralium longioribus, perianthii forma longiore labiisque longius ciliatis, ut ad summum pro varietate haberri possit; tamen *Plag. distinctifoliae* var. *Vincentina* jam aegre cum varietate *Brasiliana* Martii conjungi potest, et ramificatione totoque habitu omnino a *Plag. distinctifolia Mexicana* abhorret, ut nostram plantam sub nomine «*Plag. germanae*» seponere maluerimus, quam confusam cohortem speciei jam polymorphae novis formis amplius implicare.

Tab. XIV. (Exemplar Liebmannianum) fig. 1. Perianthium $1\frac{7}{1}$ auctum. fig. 2. folium involucrale. fig. 3. pars caulis a ventre visa. fig. 4—7. folia caulina a ventre visa.

26. *Plagiochila truncatella* *Gottsch.*

Pl. caule repente, ramis erectis effuse ramificantibus, ramulis alternis iterum divisis divaricatis, foliis distantibus patulis subverticalibus subovatis decurrentibus, margine ventrali e basi parum contracta nuda reflexa a medio ad apicem serrato-dentatis, dorsali reflexo rectiusculo praeter partem extremam 2—4 denticulis armata integerrimis, apice ipso subtruncato emarginatoe inaequaliter spinoso-dentatis, perianthio campanulato compresso alato, ala sat magna apice denticulata, ore truncato labiis dentatis, foliis involucralibus magis ovatis margine dorsali involutis ceteroquin conformibus.

Frederik Müller fandt denne Plante ved Rio blanco i Omegnen af Vulkanen Orizaba.

Planta e caule repente 1 pollicem longo protrudit 8 ramos erectos, quorum expansio latitudine fere 3 pollices explet, dum rami 2 pollices alti sunt; ramorum caulis fuscus, superne viridis. Folia, quum sicca sunt, crispata et propter margines recurvos subconvoluta canaliculataque, humido statu patenti-divergentia, semiverticalia, dorso convexiuscula; in ramulis contigua utroque margine subreflexa, $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa, medio $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. et apice $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ lin. lata, viridia. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta incrassationem cellularum angularem punctiformem et lora angusta in angulis versus basin descendenter, si a latere conspiciuntur, interstiiis hyalinis magnis parietis lateralis relictis, monstrant; discus cellulae violaceus e compressione figuram magis vel minus stellarem accipit. Perianthium retroversum $1\frac{1}{6}$ lin. longum, ore truncato 1 lin. latum; ala 1 lin. longa, apice 3—4 denticulis serrato-dentata. Folia involucralia, ad medianam perianthii altitudinem adscendentia, apice patentia, $1\frac{1}{6}$ lin. longa, medio $\frac{2}{3}$ lin. lata sunt, margine ventrali quoque a medio tantum ad apicem dentata, dorsali reflexo-involuta, praeter apicem subintegerrima. Planta mascula desideratur.

Folia hujus plantae forma magis conveniunt cum *Plag. distinctifolia Jamaicensi* a Brownio collecta et in Hb. Weberi asservata, sed perianthii forma ejusque ala major sicut folia involucralia ita differre videntur, ut plantam nostram congruam cum planta Jamaicensi non dixerim; praeterea multitudo plantarum *Plag. distinctifoliae* in scriptis et herbariis addicitarum tanta est et diversissimas inter se complectitur formas, ut tandem accuratiore observatione in species plures dividere necesse sit; nostra planta denique toto habitu et ramificatione a *Plag. distinctifolia Mexicana*, quam depinximus, omnino diversa est.

Tab. XIV. Perianthium $1\frac{7}{1}$ auctum. fig. 2. folia involucralia (cum parte basali perianthii). fig. 3. pars caulis a ventre visa. fig. 4—7. folia caulina a ventre visa.

27. *Plagiochila demissa* *Gottsche.*

Pl. caule repente intricato, ramis adscendentibus subflexuosis parvis parce ramosis basi stoloniferis, sursum interdum omnino vel interrupte aphyllis, foliis discretis ovalibus patentи-divergentibus, margine ventrali e basi contracta nuda leni arcu adscendente a medio fere 3—4 dentibus inaequalibus grosse serrato-dentatis, dorsali recurvo integerrimo leniter arcuato decurrentibus, apice contracto emarginato-bidentatis (denticulo minore interdum interjecto), perianthio (in planta Peruviana) obovato non alato, labiis serrato-dentatis, foliis involucralibus longioribus margine dorsali reflexis ceteroquin subconformibus.

Plagiochila frondescens β lecta in *Peruvia* (Pöppig)- in *Synops. Hepat.* p. 31. 32.
n. 17.

Frederik Müller fandt denne Art uden Frugt ved Rio de Orizaba i September.

Surculi pollicares, basi stolonibus inter se caespitose implexi, fusci, infima parte foliis destituti, superne saepius in flagella omnino nuda vel interrupte aphylla, summo apice in 2 ramulos microphyllos divisa, vel ramulum tenuem lateralem edentia, terminati, foliis viridi-flavis vestiti, cum his $1\frac{1}{4}$ lin. lati. Folia ovalia vel ovali-elliptica, $\frac{2}{3}$ lin. longa, latisima parte $\frac{1}{3}$ lin. lata, basi et apice ad $\frac{1}{8}$ lin. contrahuntur; margines recurvi faciem dorsalem foliorum oblique deflexorum convexiusculam faciunt. Folia summa novellorum integerrima, apice bifida. Incrassatio cellularum lateralis perfecta, ut brachia sacci pri-mordialis oblitterentur et tantum canalis longitudinalis relinquatur; membrana secundaria figuram substellatam crenulatam in foliis coctis et tinctis monstrat. Cetera desiderantur.

Plantae Peruvianae, a cel. Pöppig lectae, quam Prof. Kunze cum Lindenbergio sub nomine *Jung. patulae* e *Peruvia* communicavit, herbarium Lindenbergianum, nunc in aca-demia Vindobonensi asservatum, frustulum tantum habet, quod beatus Lindenberg in schedula herbarii insignivit: »*Plagiochila frondescens* β videtur, foliis longius ciliatis.»

Plagiochilae alpinae, quam e formis in herbariis *Plagiochilae gymnochylicinae* ad-dictis separavi, ex longinquo similis est, sed nostra foliis brevioribus minus distantibus distingui potest.

Tab. XVI. Fg. 1. Planta magnitudine naturali. fg. 2. perianthium $1\frac{7}{10}$ auctum.
fg. 3. folia involucralia. fg. 4. folium subinvolucrale primum. (Planta Peruviana). fg. 6.
Pars caulis sterilis plantae Mexicanae a ventre visa.

28. *Plagiochila Miqueliana* *Lindbg.*

Pl. caule repente, ramis erectis innovando subramosis, ramulis patulis, foliis sub-distantibus patentи-divergentibus oblongis subacuminatis margine dorsali strictis reflexis integerrimis longius decurrentibus, ventrali basi reflexis subarcuatis ante apicem denticulatis,

apice ipso emarginato-bidentatis, fructu in ramulis superveniente innovatione subterminali, perianthio oblique obovato alato, ala angustissima inermi, ore compresso rotundato, labiis inaequaliter argute dentatis.

Lindenberg in Monogr. Plagioch. p. 95. n. 58. tab. 21. et in Synops. Hep. p. 32. n. 18.

Iblandt mexikanske Mosser fandtes den af Prof. Miquel.

Planta madefacta folia utroque margine reflexa monstrat; margo ventralis prope basin (rarissime versus apicem) modice reflectitur, margo dorsalis fere totus a basi reflexus est usque ad apicem, ubi haec pars tertiam vel quartam partem folii latitudinis aequat. Folia explicata inter laminas vitreas $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, formam subovalem basi truncatam plus minus elongatam praebent; dentes in iconе Lindenberгii laudata nimis longi sunt. Perianthium apice quadruplo latius quam basi, 1 lin. longum, prope os fere 1 lin. latum; labia rotunda dentibus subaequalibus, interjectis nonnullis majoribus spiniformibus, armata sunt. Folia involucralia magnitudine caulina aequant, sed sinuose laciniato-dentata sunt; in margine dorsali 3 dentes minores, in folio florali altero duos, in altero nullum dentem inveni.

Tab. XV. Fg. 1. Perianthium $\frac{17}{1}$ auctum. fg. 2. folium involucrale. fg. 3. folium subinvolucrale primum. fg. 4. pars caulis a ventre visa. fg. 5. par foliorum a dorso visum. fg. 6. 7. folia a caule soluta.

29. *Plagiochila Mülleriana Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis erectis pauciramosis iterata innovatione flexuose elongatis validioribus rigidis, foliis approximatis patentи-divergentibus elongato-ovatis apice retroversis decurrentibus, margine ventrali e basi nuda arcuatim ad apicem usque aequa ac dorsali anguste reflexo vel recurvo subintegerrimis, apice subacuto vel oblique truncato dentato-spinosis, fructu laterali, perianthio vix emergente obovato-campanulato compresso, ore rotundato (in juniore) truncatoe spinoso-dentato, foliis involucralibus majoribus subconformibus margine ventrali et apice longius spinoso-dentatis.

Fred. Müller fandt denne Plante paa Vulkanen Orizaba med Perianthier.

Planta 3—4-pollicaris, rami rigiduli erecti pollicares vel $1\frac{1}{2}$ -pollicares, sed iteratis innovationibus ad 3—4 pollices elongati. Folia ramorum patentia approximata, apice oblique deflexa, 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata; paria 4 summa in fructificationes versus magnitudine alia superantia, et basi imbricata; colore viridi-flavo. Textura qualis in reliquis Plagiochilis, vulgaris; folia cocta et zinco bijodato tincta incrassationem lateralem cellularum superficialem

monstrant; cellulæ solutæ lora descendantia, angularia habent, inter quae saccus primordialis flavus per membranam primariam pellucidam appetet, ita ut non tota altitudine paries lateralis incrassatus sit, sed limbus tantum superior et basalis. In foliis coctis majoribus membrana primaria cum altera secundaria minus arcte cohaerere videtur, cum ictu levi inter se solvi possint, et cellula interior tamquam nucleus sexangularis ejiciatur; figura violacea substellaris inter brachia subprominentia residua flava sacculi primordialis monstrat. Innovationes plerumque extra perichaetium oboriuntur; tamen interdum intra folia involucralia apparent; in exemplaribus nostris in altero latere proveniunt, unde fructus lateralis. Folia involucralia majora, $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{6}$ lin. lata, patentia vel etiam conniventia et altitudinem oris perianthii adaequantia, apice et margine ventrali usque ad angulum basalem spinoso-dentata; semel folium majus accessorium apice et margine ventrali spinoso-dentatum, basi subplicatum margineque dorsali subcarinatum perianthium circumdans inveni.

Perianthium junius $1\frac{1}{6}$ lin. longum, ore $\frac{5}{6}$ lin. latum, os rotundum habet; in majore $1\frac{1}{2}$ lin. longo et $1\frac{1}{6}$ lin. lato os truncatum erat. Ala nulla. Monstrositatem perianthii bis inveni; in utroque margo ventralis non concretus erat, sed ad basin usque fissus, dum pars complicata antrum perianthii quasi clausit; in altero perianthio margini dorsali ala externa accreta erat. — Planta mascula ignota.

Diffrert a *Plag. rigidula* proxima foliis minus sed paullo validius dentatis, floralibus et involucralibus obtusioribus aliterque configuratis et perianthio non alato. Sed *Plag. rigidulae* exemplaria in nostro herb. tam parca sunt, ut, si majorem copiam hujus plantae fructiferae comparare licaret, nostra pro *Plag. rigidulae* varietate forsan declaranda esset, cum nec perianthii ala angustissima nec nonnulli dentes in foliorum margine tanti momenti mihi videantur, ut non in unam speciem possint conjungi; sed praeter differentias allatas etiam planta mascula utriusque formae ignota est.

Tab. XVI. Fg. 1. Perianthium junius $1\frac{7}{1}$ auctum. fg. 2. Ejus folia involucralia a latere visa. fg. 3. Perianthium adultum $1\frac{7}{1}$ auctum. fg. 4. folium subinvolucrale primum. fg. 5. 6. 7. folia et pars caulis a ventre visa.

30. *Plagiochila rutilans* *Lindbg.*

Pl. cauie repente, ramis erectis parce ramosis, foliis dissitusculis patentibus divergenti-reclinatisque subverticalibus oblongis utroque margine basi reflexis integerrimis versus apicem planis apiceque ipso denticulatis, supremis angustioribus convolutis, fructu terminali, perianthio obovato-tetragono margine anguste alato (ala nuda) ore bilabiato, labiis brevibus spinuloso-dentatis.

Lindenberg Monogr. Plagioch. p. 47. n. 26. tab. 9. — Synops. Hepat. p. 33. n. 21.

β . *Liebmanniana*. Forma intermedia inter *Plag. crispabilem rutilantem* α et *patentissimam*.

Synops. Hepat. p. 633. n. 21.

Denne Plante (Var. β) samlede Liebmann paa Hacienda de Jovo (1800—2000') i Mai med unge Perianthier, og i Skovene omkring Hacienda de Mirador (3000').

Rami adscendentes, 3-pollicares et ultra, flexuosi, inordinate dichotomi, rubrofusci. Folia distantia, $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. lata, utrinque reflexa, ideo a dorso visa convexa, patentia, paulo ad ventrem reversa, apice tantum serrato-dentata, fuscenscentia. Discus folii cellulis 6-angularibus vel 7-, 5- et 8-angularibus componitur; folia cum liquore kali caustici cocta solam incrassationem angularem rarius monstrant; saepius enim in medio pariete laterali incrassatio intermedia oritur, quae massa interjecta in parietem quasi secundarium conjungitur, cujus margo internus et externus antis illis primariis majoribus crenulatum praebet adspectum. In nonnullis cellulis depositio hujus massae secundariae tam vehemens est, ut saccus primordialis poros legitimos non amplius servare potuerit; hae cellulae a latere visae laminam violaceam ad angulos geniculatam continuam monstrant, dum in reliquis duo vel tria interstitia (hyalina sub microscopio) pro brachiis sacculi primordialis relinquuntur. Perianthium junius ore oblique truncatum alam unidentatam, magis adultum alam apice denticulatam, os rotundatum spinoso-dentatum (dentibus mediis validioribus, omnibus subincurvis) habebat. In uno exemplari leviorem monstrositatem inveni; perianthium alam angustum internam paudentatam prope angulum ventralem monstrabat. Folia involucralia apice magis truncata, basin versus paullo dilatata, marginem ventralem totum spinoso-dentatum habent, quem etiam folia subinvolucralia prima et (saepius) secunda monstrant, sed dentes minores sunt.

In schedula Lindenbergius scripsit: «Planta haec Mexicana foliis utitur minus, plerisque solo apice denticulatis, habitu vero ceterisque notis cum *Pl. rutilante* α convenit.» Statura minor est, et, dum folia plantae originalis Raddiana 1 $\frac{5}{6}$ —1 $\frac{1}{2}$ lin. longa et $\frac{2}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. lata sunt, nostra folia habet $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa et $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. lata. Inter formas *Plag. crispabilis* Hb. Lindenbergii nonnullae plantae Brasilienses inveniuntur, partim a Beyrichio, partim a Martio collectae, quae a vulgari forma foliis involucralibus oblongis linearibus minus dentatis, foliis caulinis apice rotundiore minusque dentato differunt et hisce characteribus magis ad nostram plantam accedere videntur. De magna affinitate inter *Plag. patentissimam* et *rutilantem* α in commentariis suis Lindenbergius non loquitur, sed planta Hb. Reg. Berolinensis, a Gaudichaudio prope Riojaneiro collecta, facile ad utramque speciem adduci potest.

Tab. VI. Fg. 1. perianthium $\frac{1}{4}$ auctum. Fg. 2. folium involucrale. Fg. 3. fo-

lium subinvolucrale primum. fig. 4. pars rami a ventre visa. fig. 5. folia a dorso visa. fig. 6. folium rami principalis.

31. *Plagiochila simplex Lindbg.*

Pl. caule repente, ramis erectis simplicibus vel proliero-divisis, foliis dissitusculis subverticalibus obovato-oblongis patentibus obtusis basi cuneatis margine ventrali apiceque spinuloso-serratis, fructu terminali, perianthio ovato ore compresso dentato.

Lindenbg. Monogr. Plagioch. p. 54. n. 34. tab. 9 et 31.

Synops. Hepat. p. 30. n. 16. et p. 632.

I Selskab med andre Plagiochiler fandt Liebmann denne Art paa Hacienda de Mirador (2000') i Marts uden Frugt, og Frederik Müller samlede Hanplanten iblandt andre Hepaticae i Omegnen af Vulkanen Orizaba.

Plantae pollicares in arboris cortice repentes; caules fusci in ramos coloris clarioris abeuntes. Folia inferiora ovata, toto margine ventrali spino-dentata, apice plerumque dentibus validioribus divergentibus (intermedio minore rarius adjecto) armata, margine dorsali recurvo vel leviter reflexo usque ad apicem integerrima, sed sub apice plerumque binos dentes minores habentia. Folia superiora angustiora; sed dentes marginis ventralis magis magisque pariores sunt a medio fere incipientes, postremo juxta solum apicem obvii, ut totum folium 4 dentes monstret. Spica mascula terminalis in ramulis, vel crescente ramo media evadens, vel basalis, perigoniorum paribus 6—8—10—15, in gremio unum antheridium continentium, componitur; folium perigoniale saccatum, apice patenti-recurvo bipluridentatum. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tineta incrassationem punctiformem in angulis cellularum monstrant; si ictu leviore contra laminam vitream cellulæ superne comprimuntur itaque in latitudinem paullo extenduntur, figura notissima stellaris violacea propter parietes hyalinæ perlucens appetet; ictu fortiore cellulæ inter se, dirupta cuticula folium ambiente, separantur; saepe tamen, ubi membranae primariae cellularum arctius cohaerent, dirumpuntur et totum nucleum, scilicet membranam secundariam cum incrassationibus et plasmate, quod cellula continet, intactum ejiciunt.

32. *Plagiochila cuneata Lindbg. et Gottsche.*

Pl. caule repente flagellifero intricato, ramis adscendentibus geniculato-divaricatis, foliis distantibus subheteromallis cuneatis, margine ventrali e basi contracta subarcuato grosse unidentato (uno altero denticulo interdum adjecto), dorsali integerrimo subrecto basi saepe reflexo, apice bidentato (sinu interjecto variabili) dentibus conniventibus incurvis

validis, fructu laterali vel in dichotomia, perianthio deflexo nudo obovato-elongato, ore compresso rotundato, labiis dentibus duplicatis (mediis majoribus) armatis, foliis involucralibus patentibus elongatis margine dorsali latius reflexis, ventrali pluridentatis.

Synops. Hepat. p. 632. n. 19. b.

Liebmann fandt denne Art iblandt andre Hepaticae i de dybe Skove, som bedække Siderne af Cerro de Sempalaltepec, i Juni med Perianthier og Hanplanten; han samlede den ligeledes i Nærheden af Hacienda de Mirador. (Hb. Liebm. n. 155, 198, 225 et 581. ex parte.)

Caules repentes, intertexti. Rami primarii pollicares, adscendentes, subsimplices, apice sub perianthio innovatione geniculati, quod in eadem stirpe interdum ter et ultra iteratur. Folia distantia, $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, alterna, subheteromalla, patentissima, cuneata, apice latiora, propter dentem ventrale fere triloba, lobis lanceolato-subulatis; re vera apex folii bidentatus vel bifidus, dens ventralis major quam insequens dens marginis ventralis, quem interdum alter dens minor sequitur. Textura folii vulgaris; discus cellulis 6-angularibus, 5-, 7- et octangularibus componitur; incrassatio levis angularis, quae deinde saepius parietalis fit.

Perianthium 1 lin. longum, ore $\frac{1}{2}$ lin. latum, deflexum, plerumque nudum, elongatum, pyriforme, sine ala, ore oblique rotundato duplicato-dentatum, laciniis mediis longioribus. Folia involucralia 1 lin. longa, latissima parte $\frac{1}{2}$ lin. lata, patentia, interdum quadrifida, interdum biloba vel triloba, lobis uno altero dente armatis, margine dorsali reflexa integerrima, ventrali plus minusve dentata reperiuntur. Novelli rami sub ipso perianthio, non sub foliis involucralibus, ut mos est, altero latere oriuntur; inde folium perichaetiale plerumque totum deflexum et patentissimum, et perianthium basi nudum est. Planta mascula tenuissima; spicae ovato-cylindricae, plerumque caulem ex apice continuatum interrupte cingentes, rarius apicales, e foliorum paribus 4—8 compositae. Folia perigonalia laxius imbricata basi valde inflata, margine apiceque inaequaliter vel duplicato-dentata.

Est quasi intermedia inter *Plag. tenuem* et *Plag. gymnochalcinam*, cujus formam minorem hanc primo adspectu crederes; sed differt defectu foliorum dentatorum et forma foliorum insigniter cuneato-triloba; a *Plag. tenui* foliorum et perianthii forma facile dignoscitur. Semel visa cum nulla commutari potest. Forsan, quae sequitur, *Plag. bicuspidata* hujus varietas habenda est, sed propter foliorum constantem in eadem stirpe formam legitima species nobis videtur.

Tab. IV. fig. 1. Pars plantae fructiferae a dorso visa $\frac{1}{7}$. aucta. fig. 2. perianthium. fig. 3. labia perianthii alias inter laminas vitreas compressa. fig. 4. folium involucrale. fig. 5. 6. folia a ventre visa. fig. 7. folium a dorso visum.

33. *Plagiochila bicuspidata Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis, foliis ovato-cuneatis distantibus erecto-patentibus retroversis, apice bicuspidiatis utroque margine integerrimis (vel ventrali repando-unidentato), fructu laterali vel in dichotomia propter innovationem intra folia involucralia supervenientem, perianthio nudo, erecto deflexo obconico, ore compresso rotundato, labiis dentatis (dentibus mediis majoribus), foliis involucralibus majoribus patulis apice bicuspidiatis lobis iterum dentatis.

Plagiochila cuneata Synops. Hepat. p. 632. n. 19. b. (ex parte.)

Liebmman fandt denne Plante voxende sammen med den foregaende Art i Skovene paa Cerro de Sempoaltepec, og i August 1841 med Perianthier ogsaa paa Plantagen Mirador. Fr. Müller samlede den voxende for sig i Nærheden af Vulkanen Orizaba ved Saugmøllen Aserradero de Sta. Cruz i Juli 1853 ligeledes med Perianthier.

Forsan, ut jam diximus, varietas *Plag. cuneatae* habenda, sed pleraque folia ovalia sunt apiceque semilunato-biloba, nec dentes tam longos habent, quam *Plag. cuneata*. Folia $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ lin. lata; folia involucralia $\frac{2}{3}$ lin. longa et $\frac{1}{3}$ lin. lata. Perianthium cum dentibus computatis $\frac{5}{6}$ lin. longum et $\frac{1}{3}$ lin. ore latum; labia simpliciter dentata. Textura foliorum eadem, quae in praecedente, sed incrassatio angularis fortior rariusque totum parietem invadens.

Tab. IV. fg. 1. Pars rami fructiferi a dorso visa $1\frac{7}{8}$. aucta. fg. 2. pars rami a ventre. fg. 3. pars rami fructiferi alius a ventre visa. fg. 4. perianthium. fg. 5. 6. folia involucralia. fg. 7—9. folia caulina (omnia $1\frac{7}{8}$. aucta).

34. *Plagiochila gymnocalyrina Lindbg.*

Pl. caule repente, ramis erectis dichotomis, foliis dissitusculis subverticalibus subreflexis semioblongo-ellipticis falcatis basi apiceque angustioribus convexis apice margineque ventrali spinuloso-dentatis basi margineque dorsali reflexis integerrimis, fructu terminali et in dichotomia, perianthio ovato-elliptico nudo, ore truncato angustato, labiis ciliatis.

β . *subsimplex*, foliis magis distantibus angustioribus margine utroque magis reflexis, ventrali ad apicem solummodo dentatis.

Lindenb. Monogr. Plag. p. 48. n. 27. t. 10. — Synops. Hepat. p. 32. n. 20.

I blandt andre Hepaticae fandt Liebmman Varieteten β i Omegnen af Plantagen Hacienda de Mirador (3000') uden Frugt; de faa Exemplarer vare meget beskadigede, saa at jeg i Bestemmelsen følger Lindenbergs Auctoritet.

35. *Plagiochila bursata* *Lindbg.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis dichotomis, foliis subdistantibus distichis divergenti-patentissimis scalpelliformi-lanceolatis, margine ventrali e basi nuda (foliis floralibus exceptis) integrerrimo prope apicem 2—3 dentibus longioribus armatis, dorsali subarcuato integrerrimo, apice bifido dentibus elongatis (rarius denticulo in sinu intermedio), amphigastriis angustis lanceolato-subulatis, fructu e dichotomia ramorum, involucro polyphyllo, foliis involucralibus ovato-cordatis aequae ac floralibus elongato-ovatis toto margine ventrali dentatis, perianthio campanulato ore compresso subrotundato laciniatodentato.

Lindenb. Monogr. Plag. p. 88. n. 53. α . tab. 15. — Synops. Hepat. p. 33. n. 22.

β , *minor*, amphigastriis ubique praesentibus, foliis brevioribus angustioribusque ceteroquin conformibus, statura minore.

Variet. β fandtes ved Rio de Orizaba i September af Fred. Müller med Perianthier.

Quamquam varietas α nondum in terris Mexicanis hucusque collecta est, folii texturam omnino aliam quam in var. β hic describere juvat. In foliis gemmae apicalis intimis cellulae quadratae sunt, totae sacculo primordiali replete, nec ullam incrassationem monstrant; imo eas mera membrana primaria consistere dicas. In foliis magis evolutis, cum liquore kali caustici coctis et zinco bijodato tinctis, video similes cellulas longiores basales; sed paulatim magis excoluntur, et in medio folii disco cellulas margine hyalino circumscriptas invenio. Huic parti cellulae vicinae hyalino-violaceae utrinque marginem hyalinum monstrant, qui trigonum hyalinum interstitiale, ubi tres cellulae convenient, includere videntur. Non possum hanc imaginem aliter interpretari, quam ut revera unamquamque cellulam membranā suā primariā obductam videam, et trigona e parte externa declivi membranae primariae trium cellularum composita et cuticulā folii adhuc vestita habeam. Si altius versus apicem folium observes, membrana secundaria externe maculas discretas violaceas marginales ostendit, quae mox confluunt, et membrana secundaria subinde varias zonas habet; trigona interstitialia non amplius apparent, et linea hyalina inter cellulas simplex tantum observatur, licet lentibus fortissimis utaris. In cellulis hexagonis sacculus primordialis sexbrachiatus optime appet. In foliis omnino adultis plerumque basin versus lumen cellulae angustatur in tubulum; tamen, si acidum sulphuricum concentratum adhibeas, saccum primordiale, etsi elongatum et angustum, brachia longa apiceque dilatata adversus poros cellularum adjacentium extendentem videas. Propter marginem cellulae internum inaequaliter incrassatum et zonam exteriorem plerumque obscuriorum vel interrupte obscurius maculatam monstrantem, ambitus cellulae, si minus fortibus lentibus ($\frac{200}{1}$) utaris, subcrenulatus appet. Si ictu levi inter se solvuntur, angulos cel-

lularum prominentes video hyalinis acutos, quales etiam in aliis *Plagiochilis* et *Jungermanniis* inveni.

Var. β minor. Rami pollicares et ultra, cum foliis $1\frac{1}{2}$ lin. lati, parce ramosi. Folia 1 lin. longa, fere $\frac{1}{4}$ lin. lata, margine ventrali inermia usque ad apicem, ubi uni-vel bidentata sunt, margine dorsali anguste subrecurvo integerrima, apice dentibus binis longioribus angustis (interdum minore intermedio interjecto) armata. Amphigastria caulinis ubique praesentia, $\frac{1}{6}$ lin. longa, basi 2—3 cellulas lata, in apicem subulatum unica cellularum serie constantem producta. Cellulae foliorum majores, longiores; tamen textura a *Plagiochila bursata typica* diversa est. Perianthium $\frac{5}{6}$ lin. longum, ore aequo latum, labiis rotundis dentibus spinosis armatum, alam angustissimam inermem habet et involucro trium fere parium foliorum circumdatur. Folia intima s. involucralia vera rotundiora, $\frac{2}{3}$ lin. (cum dentibus) longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, toto margine ventrali spinoso-dentata, dorsali paucidentata; folia floralia sequentia s. subinvolucralia prima oblonga, $\frac{2}{5}$ lin. lata; tertium par jam magis ad foliorum formam revertitur, sed marginem ventralem laxius dentatum habet.

Tab. XV. fg. 1. Perianthium $\frac{17}{17}$. auctum. fg. 2. folia involucralia (facies externa). fg. 3. folia subinvolucralia prima a ventre visa. fg. 4. folia subinvolucralia secunda cum amphigastrio. fg. 5. pars caulis a ventre visa. fg. 6. 7. folia caulinis.

36. *Plagiochila aërea Tayl.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis gracilibus, foliis distantibus disticho-patentibus linearis-oblongis, margine ventrali ciliato-dentatis, dorsali subarcuato integerrimis, apice bifidis dentibus elongatis (interdum denticulo basali duplicatis vel interjecto minore), amphigastriis nullis, fructu laterali, perianthio subnudo (propter innovationem intra perichaetium prodeuntem) obovato ore rotundato ciliato-dentato, foliis involucralibus patulis conformibus margine ventrali magis dentatis.

Plagiochila aërea Tayl. in Lond. Journ. of bot. 1846. p. 263.

Plagiochila bursata β minor Synops. Hep. p. 635. n. 22. β .

Liebmann samlede denne Plante iblandt andre Jungermannier i Nærheden af Hacienda de Jovo, under n. 275 i Februar, og paa Plantagen Mirador.

Rami tenues, flexuosi, parcus ramosi, $1\frac{1}{2}$ -pollicares, laxe foliati. Folia flavovirescentia, $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ lin. lata, margine ventrali bi- (rarius tri-) dentata, apice bidentata dentibus divergentibus. Incrassatio cellularum nulla. Folia involucralia caulinis conformia, longiora, 1 lin. longa, $\frac{1}{4}$ lin. fere lata, margine dorsali laxius spinoso-dentata; sub involucro innovationes exoriuntur. Perianthium $\frac{2}{3}$ lin. longum, ore $\frac{2}{3}$ lin. latum, labiis rotundis spinoso-dentatis, dentibus mediis duplo fere longioribus.

Statura minore, foliis distantioribus, amphigastriorum defectu, involucro haud poly-

phyllo, foliis involucralibus conformibus bene a *Plag. bursata* α et β , aegrius autem sterilis a nonnullis formis *Plag. gymnocalycinæ* distinguitur; *Plag. Tabinana* G. MSS. e Peruvia foliis profundius (ad $\frac{3}{4}$ disci) bipartitis magis recedit.

Tab. IV. fig. 1. Pars rami fructiferi a dorso visa $\frac{1}{7}$. aucta. fig. 2. perianthium dissecatum. fig. 3. folium involucrale. fig. 4. folium subinvolucrale. fig. 5. pars rami novelli a dorso visa. fig. 6. folium caulimum.

37. *Plagiochila Columbica* Gotsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis inordinate ramosis, foliis distan-
tibus patulis ovato-spathulatis convexiusculis, margine ventrali basi contracta angustissime
reflexis a medio usque ad apicem et apice ipso acute serrato-dentatis, dorsali anguste
reflexis subrectis a medio ad apicem acute serrato-dentatis; perianthio elongato cylindrico
compresso, ore rotundo, labiis spinoso-dentatis, ala nulla (capsula magna, elliptica); foliis
involucralibus longioribus conformibus latius reflexis altius versus basin et fortius utrinque
dentatis; spica mascula elongata 19 paribus foliorum perigonialium apice denticulatorum
composita.

Gotsche in Annal. des sc. natur. (4^e série) tom. VIII. p. 325. tab. fg. 12—16.

β . *Orizabensis*; foliis contiguis brevioribus acutis, spica mascula breviore.

Fred. Müller fra Bern fandt denne Art med Frugt og Hanplanten i Omegnen af
Vulkanen Orizaba ved Engenio, Rincon de la Carbonera og ved Aserradero de la Cruz, i
October.

Rami adscendentes, 3 pollices longi, flexuosi, paucos ramulos inordinate protru-
dentes, cum foliis 3 lin. lati; in caespitibus prostrati videntur. Folia in ramis principalibus
contigua, majora, $1\frac{3}{4}$ lin. longa, media $1\frac{1}{6}$ lin. lata, trapezoidea, obovato-acuta, basi sub-
contracta, patentissima, interdum retroversa, convexa marginibus recurva, circumcircum circa confor-
miter dentata excepta basi utraque; majore ambitu tamen specimina Mexicana dentata sunt
quam exemplaria Columbica originalia. Color cinereo-viridis; textura vulgaris, qualis in ple-
risque *Plagiochilis*; incrassatio angularis adest; nec dentes nec cellulae marginales parietes
externos incrassatos monstrant. Innovationes sub perichaetio, ut in plerisque *Plagiochilis*
fit, oriuntur. Perianthium cylindricum elongatum, 3 lin. longum, ore subcompressum
angulisque reflexum igiturque coarctatum, labiis spinoso-dentatis rotundiusculis subaequi-
longis; in perianthio juniori, 1 lin. longo, os sinuosum oblique compressum, labia rotun-
data spinoso-dentata, sed alterum labium $\frac{1}{6}$ lin. altero brevius erat. Capsula elliptica,
valvulis $1\frac{1}{4}$ lin. longis validis, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ lin. latis, sectione transversa 6 strata cellularum mon-
strans, quorum extimum fere duplo maiores cellulas habet; strata intermedia incrassatio-
nibus punctiformibus in parietibus depicta sunt; intimum fibras semicirculares fuscas vul-

gares monstrat; pedunculus semipollicaris. Folia involucralia in flore juniore adpressa, 2½ lin. longa, 1 lin. lata, margine dorsali convoluto-reflexa, circumcirca ad basin usque aequaliter dentata, ceteroquin conformia; in fructificatione perfecta magis patentia, recurva basique magis contracta.

Spica mascula in medio ramo parva, 6 paribus foliorum perigonialium apice aequae dentatorum conflata valde differt a spicis elongatis speciei originalis.

38. *Plagiochila diversifolia* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente crasso, ramis adscendentibus dichotomo-ramosis validis, foliis subimbricatis distichis oblongo-quadratis longe decurrentibus apice rotundiusculo dentato, marginibus nudiusculis reflexis, fructu ad speciem laterali, perianthio juniore oblique campanulato compresso, labiis spinoso-dentatis, foliis involucralibus minoribus.

Synops. Hep. p. 640. n. 33. c.

β , *minor*, perianthio adulto ore hiante, capsula permagna pallida crassa, amphigastriis bifidis in ramis fructiferis. (— *Plag. hians* G. in Hb. Carol. Müller; olim.)

Liebmann fandt denne Art paa Vulcanen Pico de Orizaba, i en Høide af 10,000 Fod, med unge Perianthier i September (Hb. Liebm. n. 160 et 491.) Fred. Müller bragte Var. β fra samme Sted i fuldkommen Frugt og Hanplanten.

Plantae speciosae, caule valido, ramificatione divaricata spectabiles. Rami primarii iterato-dichotome ramosi, caule lignoso nigro; ramulorum innovationes foliis minoribus alium habitum induunt. Folia oblongo-quadrata, rotundata, nonnulla trapezoidea acuta, marginibus reflexis usque ad medium fere subnudis, subtus canaliculata, apice valide dentata; dentes apicis in utrumque marginem in foliis majoribus interdum ad medium descendunt. In tribus foliis rami primarii, quae mensus sum, longitudo cuiusvis erat 2 lin., latitudo in singulis variabilis, scilicet $1\frac{1}{6}$, $1\frac{2}{3}$ et $1\frac{1}{4}$ lin. Color flavescentia in supremis, fuscescens in inferioribus. Folia cocta et zinco bijodato tincta incrassationem vulgarem angularem monstrant, qua postremo totus paries induitur. Perianthium junius, 1 lin. longum, $1\frac{1}{4}$ lin. latum, oblique campanulatum, ala nulla, labiis spinoso-dentatis fere orbicularibus. Folia involucralia minora, sed majore ambitu dentata quam caulina, ceteroquin conformia. Fructus perfectus aequae ac planta mascula in varietate α desideratur.

Var. β statura minore foliisque minoribus paullum differt, sed perianthii forma et foliis involucralibus convenit cum speciminibus originalibus florigeris Liebmennianis; exemplaria tamen fructifera (var. β) capsulae textura, seminibus permagnis et elaterum adspectu prorsus alienam inter Plagiochilas reliquas hucusque notas conditionem praebent, ut propriam

sectionem sistere possint, qua re commoti hanc olim separavimus et exemplaria Novi-Granatensis Hb. Carol. Mülleri Halensis nomine *Plagiochilae hiantis* insignivimus. Capsula enim rotunda, mole seminis sinapeos et habitu fere *Pelliam epiphyllam* aemulans, pallida vel flavo-virens (in statu effoeto), valvulis 4 crassis apice incurvis (vel interdum pluribus numero incertis) non usque ad fundum secedentibus dehiscens. Sectione transversa 8 numerantur strata, quorum extimum cellulis cubicis duplo majoribus quam sequentium constat, quae fibram crassam flavam semicircularem, cuius convexitas introrsum conversa est, continent, unde, si faciem capsulae externam microscopio conspicias, in utraque cellula duo puncta flava in parietibus oppositis videoas. Stratum intimum pallide flavescentis, cellulis tabulatis valde polymorphis constans, nullis depingitur fibris semicircularibus, sed si capsula cum liquore kali caustici coquitur et zinco bijodato tingitur, strias nonnullas arcuatas (quasi fibras semicirculares rudimentarias) interdum in illis cellulis observes. Cum illa coctione cellularum strata solvantur, cellulas singulas in parietibus incrassationem punctiformem habere videoas.

Semina triplo majora quam in *Plag. asplenioide*, laevia, flavescentia, massam subviridem continentia.

Elateres duplo longiores quam in *Plag. asplenioide*, sed angustiores, solidi, monospiri, toti flavo-fusci. Sub microscopio speciem edunt, ac si fibra flava unica circa baculum flavum spiraliter circumvoluta esset, cuius spiras in margine prominentes videoas. In fundo capsulae nonnullos tubulos majores inveni, qui legitime fibram unicam fuscum in tunica hyalina monstrant; sed in elateribus veris nihil tale appetet, nisi forte elater furcatus est, quo in casu in axilla, ubi tubuli concreti sunt, membranae hyalinae rudimentum videoas.

In Linnaeae tom. 29. p. 592 sqq. cl. P. T. Reinsch in tractatu «Entwickelung der Sporen und Schleudern von Jungermannia pusilla» fibras spirales elaterum tubulos hyalinos externe circumdare tradit; sed iteratis observationibus ibi non aliter rem video, quam e. gr. in *Plag. asplenioide*, ubi microscopium meum optime fibram fuscum internam in tubulo hyalino (qui inter spiras paullum contrahitur, sed spiras fibrarum externe certissime vestit) monstrat; igitur, nisi forte lusus naturae in exemplari Reinschii aderat, sententiam auctoris haud probare possum. In nostra planta autem lusus naturae in tam multis exemplaribus praesentem et in plantis e diversis locis (e provincia Rio Hacha Novae Granadae et e monte ignivomo Orizaba in Mexico) constantem non admitto.

Planta mascula spicam 7—8—10 parium foliorum in medio ramo, interdum ter quaterque repetitam in eodem ramo monstrabat; folia perigonalia apice 2—3—4-dentata.

Plagiochila macrostachya, *adiantooides* et *flaccida*, foliorum forma et denticulatione totius marginis ventralis jam a sterili planta differunt, *Plagiochila Columbica* perianthii,

fructus et foliorum forma diversa est. *Plag. praetermissa* Gottsche MSS.*), quae eandem fructus conditionem habet, statura minore, foliorum forma, amphigastriis ubique praesentibus et perianthii ala apice dentata notabili dignosci potest, nisi hanc varietatem amphigastriatam ejus habere malis.

Tab. VII. fig. 1. Planta magnitudine naturali. fig. 2. perianthium ($\frac{1}{1}$ ⁷. auctum) junius. fig. 3. folium involucrale. fig. 4. pars rami a dorso visa. fig. 5. basis foliorum ventralis. Tab. XV. fig. 1. pars plantae fructiferae $\frac{1}{1}$ ³ aucta, a ventre visa. fig. 2. folium involucrale. f. 3. pars caulis inferior a ventre visa. fig. 4. folia ramea. fig. 5. pars elateris unispiri ($\frac{6}{1}$ ⁰⁰). fig. 6. spora ($\frac{6}{1}$ ⁰⁰).

39. *Plagiochila adiantoides* Lindbg.

Pl. caule repente, ramis erectis laxis apice innovantibus, foliis basi approximatis suboppositis divergentibus semiovato-oblongis obtusis margine dorsali reflexis subdentatis ventrali apiceque dentato-ciliatis, fructu terminali, perianthio obovato-campanulato dorso alato (ala lata crenulato-serrata) ore truncato ciliato.

Lindenberg Monogr. Plagioch. p. 77. n. 45. tab. 14. — Synops. Hepat. p. 38 et 641. n. 37.

Liebmann fandt denne Plante i Districtet Chinantla ved Jocotepec uden Frugt i Juni (n. 187. a).

Rami adscendentes 2-pollicares et ultra, cum foliis $2\frac{1}{2}$ lin. lati; folia $1\frac{1}{2}$ lin. longa, fere $\frac{3}{4}$ lin. lata, viridia. Folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta in cellularum angulis monstrant incrassationem punctiformem, interdum linea tenui conjunctam; sed praeterea in areola conspicitur stella 6—8-radiata, cuius radii versus puncta angularia incrassata decurrunt, non ubique tamen cum iis cohaerent. Imago egregia, quia

*) *Plagiochila praetermissa* Gottsche (Mss. in Hb. Reg. Berol.)

Pl. caule repente, ramis flexuosis adscendentibus divaricato-ramosis, foliis flaccidis contiguis patent-divergentibus planis ovatis vel ovalibus caule nudum inter bases ventrales ostendentibus, margine ventrali toto vel a medio grosse serrato-dentatis, dorsali rectiusculis subrecurvis basi decurrentibus, apice subtruncata pluri-(4-) dentatis; amphigastriis minutis distantibus in nudo caule ubique conspicuis quadri-pluridentatis, perianthio campanulato compresso alato (ala lata apice dentata) ore subrotundo lato, labiis laciniato-spinosis, capsula rotunda flavo-virescente; foliis involucralibus conformibus; spica mascula in medio ramo 6—12—18 foliorum perigonialium apice 3—4-dentatorum paribus conflata.

Plagiochila hians Gottsche in Hb. Mülleri (Collect. v. d. Linden n. 864).

Habitat in Columbia, ubi cl. Moritz ♂ et ♀ juniores sub n. 176 in colonia Tovar legit; etiam in Peruvia circa Callao collecta; in Novae Granadae provincia Rio Hacha, in monte Taquinaar altitudine 8000 pedum legit L. Schlim a. 1852 cum fructu perfecto (Collect. v. d. Linden n. 864).

nucleus stellaris interdum in cellulis singulis vario modo contrahitur, igitur sine laceratione diversam partium constructionem monstrat; levi ictu nucleus totus stellaris e cellula protrudi potest, dum incrassationes punctiformes angulares membranae primariae arctius adhaerentes in ea relinquuntur. Inter radios videoas saccum primordiale flavescentem brachia sua cum stella violacea alternantia versus brachia saccorum cellularum adjacentium extendentem.

Capsula (exemplaris Trinitensis) sex stratis componitur, quorum intimum fibris semicircularibus crassis depictum est. Stratum extimum cellulis majoribus cubicis hyalinis constat; strata 4 intermedia incrassationibus irregularibus crassis hic inde sparsis grosse punctata apparent.

40. *Plagiochila longispina* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule ramoso, ramis elongatis flaccidis adscendentibus, foliis contiguis vel sub-imbricatis ovatis circumcirca ciliato-dentatis, margine ventrali paullum arcuatis, dorsali leniter sinuato longius decurrentibus, apice rotundo vel truncato vel repando, amphigastriis parvis discretis caule angustioribus pluridentatis, perianthio campanulato compresso basi brevialato, ore rotundo spinoso-ciliato.

Synops. Hep. p. 642. n. 37. c.

Liebmann fandt denne Art i den tætte Skov, som omgiver Vaqueria del Jacal paa Vulkanen Pico de Orizaba, i en Høide af 10,000 Fod, i September med Frugt (Hb. Liebm. n. 172, 165, 482 et 491 e. p.)

Caules ramosi, rami plerumque elongati, flaccidi, angulo acuto ramulos demittentes. Folia subimbricata basi tantum vel contigua, ovata, versus fructificationem crescentia, basi lata cum caule conjuncta, circumcirca ciliato-dentata, sed cilia vel dentes in margine dorsali rariora, in ventrali versus basin longiora et densiora fiunt. Folia innovationum distantia et latitudinis ratione longiora, novellorum laxiorum mire polymorpha, apice plus minusve repanda. Textura disci folii tenuior; cellulae majores, sed incrassatio angularis levior, ut in foliis coctis et zinco bijodato tinctis punctum tantum violaceum vel zonam levissimam angularem violaceam videre liceat; nec dentes nec paries externus cellularum marginalium incrassati sunt. Amphigastria parva apice in plura cilia dissecta in caule apparent. Fructus in dichotomia vel ad speciem lateralis, superveniente innovatione sub foliis involucralibus orta; perianthium campanulatum compressum sesquilineam latum et lineam fere altum, basi propter calyptram (fructus mole semen sinapeos aequante) tumidum, ore rotundo bilabiato spinoso-ciliato; altero latere profundius fissum. In pluribus, quae dissecui, perianthiis basi alam brevem binis vel ternis ciliis longioribus vestitam inveni; in nonnullis non aderat.

Calyptra globosa, basi pistillis abortivis stipata. Capsula globosa. Pistilla in perianthio juniore 23 numeravi. Planta mascula desideratur.

Propius accedit haec ad *Plag. adiantoidem* et quae sunt similes, sed ciliorum longitudine, quae plantam sicciam circa folia griseo nimbo circumdant et amphigastriis in ramis novellis conspicuis, distingui potest.

Tab. VIII. fg. 1. Plantae pars naturali magnitudine. fg. 2. perianthium $\frac{1}{1}$. auctum. fg. 3. folium involucrale. fg. 4. folium caulinum. fg. 5. caulis venter cum amphigastriis. (Omnia $\frac{1}{1}$. aucta.)

41. *Plagiochila speciosa* *Lindbg. et Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis erectis dichotomo-ramosis strictiusculis, foliis imbricatis oblongo-subovatis retrorsum in cristam nudam conniventibus, margine dorsali reflexo integerrimo oblique descendantibus, ventrali e basi nuda rectiusculo a medio aequa ac apice truncato serrato-dentatis, fructu in dichotomia vel ad speciem laterali, perianthio campanulato compresso, ala nulla, ore spinoso-dentato, foliis involucralibus circumcirca laciniato-dentatis.

Synops. Hepat. p. 643. n. 53. b.

Liebmann fandt denne Planter i Nærheden af Plantagen Hacienda de Mirador med Perianthier i Januar, og Hanplanten i Marts. (Hb. Liebm. n. 128 et 235 ♂, n. 387 ♀.)

Caules repentes intricati, rami adscendentes stricti, erecti, dichotomo-ramosi, 3—4 pollices longi. Folia imbricata oblongo-subovata, apice truncato vel rotundiusculo serrato-dentata, basi paullum dilatata in cristam nudam conniventia, margine ventrali rectiusculo aut repando, in novellis magis serrato-dentato, in ramo principali laxe dentato, margine dorsali reflexo integerrimo arcuata linea decurrente. Folia floralia margine ventrali magis serrata postremo in folia perichaetalia circumcirca laciniato-dentata abeunt; laciniae saepe duplicito-serratae. Color laete viridis; textura, qualis in plerisque *Plagiochilis*; maxime enim areolis 6-angularibus, tum 5-, 7-, et 8-angularibus componitur discus folii. Folia cocta cum liquore kali caustici et tincta zinco bijodato incrassationem angularem vulgarem cellularum apicem versus angustiorem, in basi folii fortiorum monstrant, et levi ictu membrana secundaria violacea a primaria solvi potest, ita ut e dirupta cellula, quae nunc sola membrana hyalina primaria constituitur, discus sexangularis angulis fortius tinctis, qui membranam secundariam cum inclusu sacculo primordiali sistit, tamquam nucleus ejiciatur. Perianthium junius campanulatum, $2\frac{1}{4}$ lin. longum, $1\frac{1}{4}$ lin. latum, compressum, labiis spinoso-dentatis; ala in plerisque deest; tamen in unico perianthio inter decem, quae dissecui, ejusdem stirpis inveniebatur, apice bidentato. Levior monstrositas saepius occurrit; alae accretae

dentatae interne prope marginem ventralem interdum conspicuntur; in uno exemplari duplex perianthium vidi; perianthium externum margine dorsali ad basin usque fissum; perianthium interius dorso aequo fissum fovebat torum pistillorum, et margine ventrali cum perianthio externo concretum erat. Planta mascula 6—8 inflorescentias in eodem ramo monstrabat; spicae ovales 12 paribus foliorum saccatorum apice dentato patulorum componuntur, quas 8—12 paria foliorum rite explanatorum sequuntur, quae altera inflorescentia 12 parium foliorum perigonialium excipit; itaque alternatione iterata mox contrahitur stirps, mox ad latitudinem 2 linearum et ultra dilatatur; in inflorescentia apicali antheridia viridia inveniebantur.

Proximae huic sunt: *Plag. serrata*, quae crista ventrali dentata et amphigastriis praesentibus, foliorum et perianthii forma diversa, *Plag. Guilleminiana*, cuius planta mascula tantum innotuit, foliis margine ventrali undulatis basique magis dilatatis, *Plag. hypnoides* et *plicata* amphigastriis praesentibus et perianthii forma differunt.

Tab. VIII. fg. 1. Perianthium $\frac{1}{4}$. auctum. fg. 2. folium involucrale. fg. 3. perianthium. fg. 4. folium florale. fg. 5. pars rami a dorso visa. fg. 6. folium rameum.

42. *Plagiochila flavesens* Gottsche.

Pl. caule intricato repente, ramis adscendentibus dichotome ramosis basi stoloniferis, foliis imbricatis late-ovatis vel (ut appareat) semicordatis-truncatis subtus in cristam interdum subdenticulatam conniventibus, margine ventrali e basi brevi decurrente inermi vel uno altero denticulo subdenticulata arcuatim adscendente dentibus 8—10 vel paucioribus serrato-dentatis, dorsali incurviusculo reflexo decurrente integerrimis, apice rotundiusculo subtruncatoe 3—6-dentatis, amphigastriis nullis, fructu . . .

Plag. Guilleminiana β *flavesens* Synops. Hep. p. 644. n. 54. β .

Liebmann fand^e denne Plante i Skovene, som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec, og i Districtet Chinantla (Hb. Liebm. n. 184 et 200 e. p.).

Rami e caule repente intricato adscendentibus altitudine $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ pollic. in ramulos dichotomos abeunt, qui iterata bifurcatione et uno altero ramo adjecto summitatem surculorum quasi fasciculatam efficiunt; basi stolones foliis minoribus vestitos radiculososque edunt, e quibus novi rami assurgunt, cum foliis $1\frac{3}{4}$ lin. lati, unde caespites tam intricati fiunt. Folia ovato-semicordata e basi paullum producta uno altero denticulo armata arcuatim adscendentia in marginem ventralem serrato-dentatum, interdum versus angulum basalem magis inermem transeuntia; margine dorsali sinu latiore incurviuscula, reflexa, basi longius in caulem decurrentia, apice et sub apice truncato vel subrotundato dentata; folia colore flava, in aquam immersa hanc valde tingunt. Folia cocta et tincta incrassationem cellu-

larum angularem fortiorem monstrant; materia interjecta mox fit incrassatio lateralis, poris tantum relictis. Folia involucralia (in gemma florifera) circumcirca dentato-spinosa, excepta parte inferiore marginis dorsalis; in foliis floralibus sequentibus denticulatio tertiam partem fere marginis dorsalis ab apice invadit.

Differt nostra a *Plag. Guilleminiana* foliorum forma et maxime defectu amphigastriorum, quae in planta originali a Montagneo mihi data in basi cuiusvis paris foliorum sat perspicua inveni. Lindenbergius nostram plantam a forma vulgari Raddiana foliis magis erectis, crista nonnumquam subdenticulata aliquantum recedere, sed vix specie differre, scripsit. E Monographia Plagiochilarum p. 152 non prorsus appetet, quibus exemplaribus in diagnosi Lindenbergius usus sit, et tabula eius 33, ubi in figura 3 folium basi ventrali nimis breviter decurrens depictum est, dubitationem auget; secundum locum priorem, quem tenet planta ex Hb. Raddiano a Savi data, forsan diagnosin ex hac desumsit, quamquam nomen Montagneanum retinuit; si autem *Candollea diffusa* Hb. Raddiani omnino congrua est cum *Plagiochila Guilleminiana* a Montagneo mihi communicata, Lindenbergius amphigastria in sua planta praetervidit. Montagne, qui plantam suam nominaverat nec dissecuerat, in Sylloge pag. 56. n. 152 diagnosin Lindenbergianam fideliter transscripsit; itaque sub hac specie forsan duae species diversae latent, quam dubitationem tamen solum Herbarium Lindenbergianum nunc Vindobonae asservatum solvere potest.

Tab. VII. fg. 1. Pars plantae naturali magnitudine. fg. 2. Pars rami a ventre visa $\frac{1}{4}$. aucta. fg. 3. folium caulinum a dorso visum.

43. *Plagiochila Schiedeana* *Gottsch.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis apice fasciculato-ramosis, foliis subimbricatis distiche patentibus retroversis utrinque longe decurrentibus oblongis basi ventrali reflexis subcristatis, apice bi—3—4-dentato, margine ventrali pauci-serrato-dentato, dorsali sub apice plus minus reflexo, amphigastriis elongatis plurifidis laciniis lanceolato-filiformibus flexuosis, perianthio campanulato compresso non alato, ore dentato, foliis involucralibus majoribus margine ventrali dentibus majoribus armato sinuato-reflexis, dorsali sub apice serratis.

Jungermannia renitens Hb. Reg. Berolin. — Lindenbg. Monogr. Plagioch. p. 156.

Mantissa Plag. Javanica ad obs. 1.

$\beta.$ *major.* Statura majore. Sterilis.

Dr. Schiede fandt denne Art med Perianthier ved Jalapa (4500'). Leibold fandt Hanplanten og den større Varietet β uden Frugt sandsynligvis paa Hacienda Zacuapan (2500—3000').

Rami novelli folia breviora habent, margine ventrali medio ramo fortius, basin versus minus serrata, basi ventrali subreflexa; in ramis majoribus folia magis decurva, retroversa, ita ut caulis nudus a latere videatur, margine ventrali toto dentata, basin versus sinuata, apice subtruncata, plerumque quadridentata, accendentibus nonnullis dentibus (3—4) sub ipso apice in margine dorsali, utrinque longe decurrentia basique ventrali sinuato-subreflexa, unde crista ventralis superne visa serpentino ductu crispata apparet; basis dorsalis folii fere in tubum longum angustumque convolvitur inque caulem descendit, folio alteri approximata, utrinque caulem fuscum visibilem relinquens. Amphigastria irregularia plurifida, marginibus plus minusve dentatis, laciniis longioribus elongato-lanceolatis, interdum filiformibus. Perianthium junius primo hinc fissum semicirculare, dein campanulatum compressum, medio ventricoso-sulcatum, non alatum, labiis spinoso-dentatis rotundis.

Folia involucralia margine dorsali latius reflexa, maxime apicem versus, ventrale marginem sinuato-crispatum dentibus longioribus plus minusve incurvis armatum basi plerumque reflexum habent. Spica mascula in medio ramo (tres spicas in nonnullis ramis inveni) brevis e 5—9 paribus foliorum perigonialium componitur.

Differt a *Plagiochila plicata* α statura majore, foliis longioribus minus dentatis et angustioribus, a *Plag. plicata* β perianthio non alato et foliis longioribus, a *Plag. sinuata* perianthii et foliorum forma. Lindenberg in Monogr. Plagioch. p. 156 hanc nostram ad *Plag. Javanicam* refert, a qua tamen foliorum et amphigastriorum minorum forma, perianthio non alato et foliis floralibus margine ventrali (nec toto ambitu) denticulatis differt.

Tab. IX. fg. 1. Ramus magnitudine naturali. fg. 2. pars rami a latere visa $\frac{1}{7}$. aucta. fg. 3. pars rami fructiferi a dorso visa. fg. 4. folia caulina a caule soluta, a facie ventrali visa. fg. 5. amphigastria. fg. 6. perianthium. fg. 7. folium involucrale. fg. 8. folium subinvolucrale primum.

44. *Plagiochila subcristata* *Gottsch.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus innovatione iterata geniculato-flexuosis, foliis basi imbricatis patenti-divergentibus subhorizontalibus elongato-subovatis utrinque longe decurrentibus, margine ventrali e basi nuda patente subcristata subsinuoso recto serrato-dentatis, dorsali reflexo leviter arcuato integerrimis, apice truncato pluridentatis, amphigastriis parvis bifidis laciniis lanceolatis basi dentatis, fructu terminali vel laterali vel in dichotomia, perianthio obovato compresso ore spinoso-dentato, foliis involucralibus majoribus conformibus margine ventrali reflexo-sinuato spinosis, dorsali reflexo sub apice integerrimis.

Liebmann fandt denne Art i Skovene paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000' Høide) i Departementet Vera Cruz med Perianthier i Marts.

E caule in ligno putrido repente rami adscendunt, iteratis innovationibus $1\frac{1}{2}$ pollices longi, ramulis novellis ipsis rectiusculis 4—5 lin. longis, cum foliis expansis $1\frac{1}{3}$ lin. latis. Folia ramea $\frac{5}{6}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{2}$ lin. et apice $\frac{1}{6}$ lin. lata, margine ventrali ab angulo vel rarius a medio 6—8 dentibus armata, apice 3—5-dentata, colore flavo-viridia. Incrassatio cellularum angularis fortior, versus basin et margines in lateralem transiens, relictis tamen poris lateralibus. Amphigastria minuta $\frac{1}{10}$ lin. lata, $\frac{1}{6}$ lin. longa. Innovatio extra perichaetium oboriens. Folia involucralia $1\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{2}{3}$ lin. basi lata, interdum toto apice ad medium folii oblique reflexa; folia subinvolucralia 1 lin. longa, basi $\frac{1}{2}$ lin. lata. Perianthium $\frac{2}{3}$ lin. longum, ore $\frac{1}{2}$ lin. latum, in duobus exemplaribus ala carebat; perianthium tertium $\frac{5}{6}$ lin. longum et $\frac{2}{3}$ lin. latum, alam apice denticulatam habebat; quartum denique perianthium $1\frac{1}{4}$ lin. longum et ore $\frac{2}{3}$ lin. latum, ala latiore apice denticulata, basin versus in tubulum cum perianthio concreta praeditum erat.

A *Plag. disticha* differt foliis margine ventrali subundulatis evidentius cristatis et amphigastriorum praesentia, a *Plag. serrata* basi foliorum nuda, a *Plag. Schiedeana* et *plicatae variet. a* differt foliis longioribus, planis (nec retroversis) apice magis dentatis, statu sicco aliter configuratis.

Tab. X. fig. 1. Perianthium auctum $1\frac{7}{10}$. fig. 2. Perianthium, cujus ala in tubulum basin versus concreta erat. fig. 3. labium perianthii. fig. 4. folium involucrale. fig. 5. folium subinvolucrale primum. fig. 6. pars caulis a ventre visa. fig. 7. 8. folia caulina a dorso visa. fig. 9. 10. folia caulina a ventre visa. fig. 11. amphigastrium.

45. *Plagiochila sinuata* *Gottsch.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus apice dichotome fasciculato-ramosis, foliis imbricatis subhorizontalibus patentи-divergentibus elongato-ovatis utrinque decurrentibus subtus subcristatis, margine ventrali e basi dentata reflexa vel sinuoso-patente subcristata adscendente sinuato aequa ac apice truncato serrato-dentatis, dorsali versus basin subarcuato reflexo integerrimis, amphigastriis nullis, fructu terminali lateralique, perianthio obovato campanulatoe compresso subalato, ala angustissima inermi, ore oblique rotundato ciliato-spinoso, foliis involucralibus paullo majoribus apice patentissimo-reflexis, margine ventrali aequa ac foliis floralibus insequentibus dentibus spinosis armatis, dorsali late reflexis.

Denne Art blev funden af Leibold, sandsynligviis i Nærheden af Plantagen Zazuapan (2500—3000') i Departementet Vera Cruz, 5 Leguas fra S. Antonio de Huatusco.

Unicum exemplar ramos adscendentes pollicares fuscos, apice dichotome divisos fasciculatim dispositos habet, cum foliis $1\frac{2}{3}$ lin. latos. Folia $1\frac{1}{6}$ lin. longa, prope basin, qua

latissima sunt, $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin. explet, dum basis ipsa, qua cauli adnata sunt, $\frac{1}{2}$ lin. explet, apice $\frac{1}{5}$ lin. lata, margine ventrali sinuata, ramea basi ventrali reflexa, ramulorum angulo ventrali et basi sinuoso-patentia; crista basibus alternantibus composita, parum elevata sed caulem obvelans. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta incrassationem cellularum angularem monstrant, quae versus basin et marginem transit in limbum parietalem superficialem, poris in medio pariete interjectis. Perianthium 1 lin. longum, basi contracta $\frac{1}{3}$ lin., ore oblique rotundato $\frac{2}{3}$ lin. latum; ala limbus est angustissimus, ut forsitan in aliis exemplaribus omnino deesse possit.

Planta mascula desideratur.

Differt a *Plag. hypnoide* amphigastriorum defectu et foliorum forma, a *Plag. Owaihiensi*, foliorum forma simillima, foliis longioribus, a *Plag. subcristata* foliis basi ventrali dentatis, a *Plag. Schiedeana* denique defectu amphigastriorum et foliorum basi dentata.

Tab. IX. fig. 1. Perianthium auctum $\frac{17}{1}$. fig. 2. folium involucrale. fig. 3. folium subinvolucrale primum. fig. 4. pars caulis a ventre visa. fig. 5. 6. 7. 8. folia caulina a ventre visa. fig. 9. 10. folia ramea a ventre visa.

46. *Plagiochila plicata* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus strictiusculis dichotomis, ramulis fasciculatis subflexuosis, foliis imbricatis patenti-divergentibus semiovatis margine dorsali reflexis integrerrimis basi plica valde convexa longe decurrentibus, ventrali basi integrerrimis subcrenatis (subundulatis in β) toto vel a medio ad apicem parce serrato-dentatis, apice angustatis acutis vel subtruncatis inaequaliter bi-tri-pluridentatis, amphigastriis parvis bi- vel plurifidis, laciniis lanceolato-ciliiformibus, fructu subterminali, perianthio obovato subtetragono margine ad apicem compresso, ore obliquo subrotundove inciso dentato.

Synops. Hepat. p. 644. n. 54. b.

β , foliis subundulatis, margine ventrali reflexis ad apicem tantum serrato-dentatis, perianthio ala denticulata praedito.

Liebm. fandt begge Varieteter paa Plantagen Hacienda de Mirador i Marts (Hb. Liebm. n. 163 et 302 e. p.).

Planta sesqui-bipollucaris et longior. Folia, quum sicca sunt, contracta, fuscescentia, 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, apice tantum $\frac{1}{6}$ lin. habent, in ramo primario basibus alternantibus in cristam conniventia nudam vel rarius dente uno alterove instructam, in varietate α toto margine ventrali, in varietate β a medio fere ad apicem dentata. Folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta vulgarem incrassationem angularem, subinde in parietalem transeuntem interjectis maculis albis in angulis monstrant. Amphigastria in utraque

varietate inter bases ventrales foliorum omnium apparent, et fere $\frac{1}{6}$ lineae partem, qua parte latissima, lata sunt; usque ad apices dentium fere $\frac{1}{3}$ lineae partem longa sunt. Fructus in ramulis terminalis vel innovatione utrinque accidente dichotomiae impositus. Folia involucralia conformia sed majora, margine ventrali sinuato-reflexa, longius dentato-ciliata, erecta, adpressa, apice patula. Perianthium in α non vel anguste alatum, in β ala denticulata praeditum, 1 lin. longum, ore $\frac{3}{5}$ lin. latum, sectione transversa propter basin ventricosam subquadrangulum. In uno exemplari (β) folium impar, quasi involucrale intimum, circumcirca dentatum aliterque formatum inveni.

Diffr. a *Plagiochila hypnoide* statura minore, crista minus distincta subintegerrima, et amphigastriis majoribus, a *Plag. Guilleminiana* foliorum forma et directione. *Plag. serrata*, quoad perianthium simillima, foliis paullo longioribus, crista ciliata et margine ventrali reliquo parce serrato distinguitur.

Tab. IX. Pl. plicata α . fg. 1. Perianthium $\frac{1}{4}$ l. auctum. fg. 2. 3. folia involucralia. fg. 4. fol. subinvolucrale primum. fg. 5. Ramus a latere visus auctus. fg. 6. pars caulis a dorso visa. fg. 7. folium caulinum a ventre visum. fg. 8. amphigastria.

Pl. plicata β . fg. 1. Perianthium folio accessorio acreto monstruosum $\frac{1}{4}$ l. auctum. fg. 2. Idem perianthium dissecatum; in fundo conspicitur torus pistillorum. fg. 3. Aliud perianthium. fg. 4. Aliud perianthium ala interna praeditum. fg. 5. folium accessorium perichaetiale intimum. fg. 6. folia involucralia. fg. 7. pars caulis a dorso visa. fg. 8. pars caulis a ventre visa. fg. 9. 10. 11. folia a caule soluta a ventre visa. fg. 12. amphigastria.

47. *Plagiochila punctalis* Gotsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus strictiusculis subsimplicibus, foliis arcte imbricatis elongato-ovatis utrinque decurrentibus subtus cristatis, margine ventrali e basi subintegerrima erecto-patula vel subreflexa adscendente subrecto aequa atque apice angustato subtruncatoque serrato-dentatis, dorsali ad medium reflexo subarcuato integerrimis, amphigastriis parvis bifidis lacinialis lanceolatis extus dentatis, fructu terminali in ramulo laterali, perianthio oblongo compresso alato (ala subintegerrima) ore spinuloso-denticulato, foliis involucralibus margine dorsali denticulatis, ventrali reflexo-sinuoso spinoso-dentatis.

Liebm. fandt denne Art i Departementet Vera Cruz imellem Totutla og Huatusco i Omegnen af Hacienda de Mirador ved Dos Puentes (4000') i August med Frugt. Hb. Liebm. n. 477 ex parte.

Rami $\frac{3}{4}$ pollicis partes longi, erecti, cum foliis 2 lin. lati, simplices, innovationem fructificantem protrudentes, e caule folioso subrecto repenteque adsurgententes. Folia ovata,

viridia, 1— $1\frac{1}{6}$ lin. longa, basi adnata $\frac{1}{2}$ lin., medio $\frac{1}{2}$ lin. et apice $\frac{1}{4}$ lin. lata; apice variabili 3—4—5-dentata, truncata, in sicco apicem versus subconvoluta, igitur apice distantia, humecta arcte imbricata. In foliis coctis et tinctis textura vulgaris; incrassatio cellularum angularis fortior, denique parietalis, poris tamen relictis; in cellulis marginalibus incrassatio fortior et prior. Amphigastria $\frac{1}{4}$ lin. longa, basi $\frac{1}{15}$ lin. lata. Perianthium adultum $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{3}$ lin. longum, ore subtruncato $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin. latum semiemersum; capsula ovalis, pedunculo sesquilineari insidens, vix e perianthio dirupto prominens. Folia involucralia $1\frac{1}{6}$ lin. longa, $\frac{2}{3}$ lin. lata, ad medium perianthium adscendentia, plerumque margine dorsali serrato-denticulata sunt, interdum tamen alterum jam hac parte integerrimum; folia subinvolucralia prima aequa ac paria insequentia rami fructiferi marginem dorsalem integerrimum habent.

Diffr. a *Plagiochila hypnoide* proxima foliis apice angustioribus minusque dentatis.

Tab. X. fg. 1. Perianthium $1\frac{7}{11}$. auctum. fg. 2. 3. folia involucralia. fg. 4. folium subinvolucrale primum. fg. 5. pars caulis a ventre visa. fg. 6. 7. 8. folia caulina. fg. 9. amphigastria.

48. *Plagiochila hypnoidea* Lindbg.

Pl. caule repente, ramis suberectis flexuosis dichotomis apice fasciculatis, foliis imbricatis patent-divergentibus semicordatis oblongo-lanceolatis obtusis retrorsum conniventibus, margine dorsali reflexis integerrimis longissime decurrentibus, ventrali (basi late reflexa) toto et apice dentato-serratis subundulatis subtus in cristam dentatam conniventibus, amphigastriis minutis bi-quadrifidis in quoque foliorum pari obviis, fructu mox laterali, perianthio subrotundo-obovato margine antico alato (ala apice denticulata) ore hinc fisco dentato-spinuloso.

Lindenbg. Monogr. Plagioch. p. 37. n. 19. t. 7. — Synops. Hepat. p. 45. n. 55.

Dr. Schiede fandt denne Plante i Nærheden af Jalapa (4500').

49. *Plagiochila affinis* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente, ramis erectis dichotomis ramulis fasciculatis, foliis imbricatis subovatis obtusis patentibus longe decurrentibus, margine dorsali reflexis integerrimis ad apicem planis subdenticulatis, ventrali e basi dentata cristata interdum reflexa apiceque dentato-spinosis (amphigastriis hinc inde rarissimis), fructu terminali, perianthio obovato-tetragono margine compresso anguste alato, ala subintegerrima, ore oblique truncato inciso-ciliato, foliis involucralibus erectis oblongo-linearibus margine dorsali latius reflexo-convolutis subdentatis, ventrali rectiusculo longius ciliatis.

Synops. Hepat. p. 645. n. 56. b.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Vera Cruz i Nærheden af Hacienda de Jovo (1800—2000') med Perianthier, og Hanplanten i Marts, sammenvoxende med andre Levermosser. (Hb. Liebm. n. 558 et 542 e. p.).

Caulis repens; rami erecti basi indivisi, tnm iterato-dichotomi, interdum subflexuosi, ramis fasciculatis. Folia subovata, decurrentia, $\frac{5}{6}$ — $1\frac{1}{3}$ lin. longa, basi $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{6}$ lin. et apice $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. lata, margine dorsali ad $\frac{2}{3}$ longitudinis reflexa, integrerrima, sub apice saepe uno altero dente armata, apice plana, rotundata, aequa ac margine ventrali spinuloso-dentata, basi subtus in cristam dentatam conniventia. Textura folii vulgaris; folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellulas monstrant angulorum incrassatione 5—6—7—8-punctatas, quae tamen incrassatio versus marginem folii interdum tenui limbo totam cellulam circumdat; nec dentes nec exterior cellularum marginalium paries incrassati sunt. Amphigastria hinc inde sparsa, rarissima, nec ad quodque foliorum par praesentia ut in *Plagiochila hypnoide*. Fructus in ramulis terminalis; perianthium junius campanulatum, compressum, 1 lin. longum, ore obliquo $\frac{5}{6}$ —1 lin. latum; perianthium magis adultum ovatum, medio inflatum, sectione transversa tetragonum angulis compressum, $1\frac{2}{3}$ lin. longum, ore $\frac{5}{6}$ —1 lin. latum; ore truncatum, interdum sinuatum, inaequaliter dentato-ciliatum. Ala aut nulla aut angusta, integrerrima vel subdentata. Folia involucralia erecta, sublinearia, $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. longa, basi $\frac{2}{3}$ lin., apice $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine dorsali praesertim ad apicem versus latius convoluta, subdentata, margine ventrali longius ciliata. Spicae masculae ovatae, caulem ex apice continuatum cingentes; folia perigonalia (8—12 paria) basi ventricosa caulem amplexantia, apice reflexa, spinoso-dentata, intima minora ovata acuta erecta integrerrima, in gremio duo antheridia pedicello aequilongo fulta foventia.

Pluribus speciebus valde affinis, sed ab omnibus tamen, ut videtur, distincta. Omnium proxima est *Plag. hypnoides*, etiam habitu satis accedens, sed differt amphigastriis quamquam parvis et hucusque semper praetervisis ubique praesentibus, foliorumque involucrarium forma magis ovata margineque ventrali minus longe dentato. *Plag. speciosa* et *Guilleminiana* foliis margine ventrali parce dentatis cristaque calva differunt; *Plag. serrata* foliis longioribus brevius et parce dentatis bene distinguitur; *Plagiochila Owaihiensis* denique ventrali margine foliorum subsinuoso, apice angustiore et denticulatione diversa videtur.

Tab. VIII. fg. 1. Perianthium $1\frac{7}{17}$ auctum. fg. 2. labium perianthii. fg. 3. folium involucrale: fg. 4. folium florale. fg. 5. pars rami a ventre visa. fg. 6. 7. folia soluta.

50. *Plagiochila connata* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente, ramis suberectis apice iterato-dichotomis subfasciculatis, foliis imbricatis sursum subadscendentibus elongato-ovatis patentibus utrinque longe decurrentibus, margine dorsali reflexis integerrimis, ventrali basi in cristam conniventibus dentato-spinosam (profundiusque caudatim descendente) reliquo margine subdentatis, apice emarginato-bi-tri-dentatis, amphigastriis parvis bi-plurifidis toto margine ciliato-dentatis, perianthio obovato compresso alato, ala angusta dentata, ore subcontracto, labiis sinuose reflexis ciliato-dentatis, foliis involucralibus magis ovatis fortius dentatis.

Synops. Hepat. p. 645. n. 58. b.

Plagiochila cristata Lindenbg. Monogr. Plag. p. 157. n. 17. (quoad exemplaria Mexicana leg. Dr. Miquel).

Var. β minor.

Liebmann samlede denne Plante i de dybe Skove i Omegnen af Plantagen Hacienda de Mirador (3000') med Perianthier og Antheridier (Hb. Liebm. n. 212 ♂, n. 178 et 128 e. p. ♀); den fandtes ligeledes ved Jalapa (4500') af Dr. Schiede, og sandsynligvis paa Plantagen Zacuapan af Leibold.

Caulis repens flexuosus; rami erecti vel adscendentes, 2—4-pollicares, basi indivisi, apice dichotomi, ramulis saepe fasciculatis. Folia imbricata, sursum adscendentia, quum sicca sunt, apice contracta, distiche patentia, elongato-ovata, margine dorsali reflexa integerrima basi sinu magno longe decurrentia, ventrali basi dilatata in cristam conniventia, quae profundius caudatim in caulem decurrit et hac parte aequa dentata reflexa esse solet nec nisi foliis a caule solutis appetet; crista ventralis dentata spinosa, dentibus subuncinatis, reliquo margine folia plus minusve dentata (rarius subintegerrima), apice truncato-emarginata vel inaequaliter bi-tridentata. Folia majora (var. α) $1\frac{5}{6}$ lin. longa, basi $1\frac{2}{3}$ lin. lata (pars cauli adnata 1 lin. paullo excedit), medio fere $\frac{1}{2}$ lin. lata, dum apice $\frac{1}{4}$ lin. explet; folia minora (var. β) 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. medio et $\frac{1}{6}$ lin. apice lata sunt. Textura vulgaris; in-crassatio cellularum initio angularis, denique parietalis; in foliis gemmae terminalis omnes gradus incrassationis cellulae splendide monstrant; in intimis incrassatio nulla; ne trigona intercalaria hyalina quidem in minimis conspicuntur.

Amphigastria parva, $\frac{1}{6}$ lin. lata, $\frac{1}{6}$ lin. longa, bifida (laciinis toto margine ciliatis) vel plurifida, semper praesentia. Fructus initio terminalis, sed innovationibus sub illo nascentibus denique vel lateralis appetet, vel dichotomiae impositus est. Folia involucralia majora, basi latiora, 2 lin. longa, $1\frac{1}{3}$ lin. basi et apice $\frac{1}{4}$ lin. lata in var. α ; ($1\frac{1}{2}$ lin. longa et $\frac{5}{6}$ lin. lata in β), arctius longiusque toto ambitu dentato-spinosa, dentibus marginis dorsalis vero rarioribus minoribusque; interdum, praesertim in var. α , margine dorsali longius concreta erant, unde nomen speciei hausi. Perianthium in α 2 lin. longum, ore $\frac{5}{6}$ lin. latum, dum

in medio $1\frac{1}{6}$ lin. efficit; in var. β $1\frac{1}{2}$ lin. longum, et ore sinuato $\frac{5}{6}$ latum; ovatum, vel obovatum, basi inflatum, ad apicem compressum, ore subtruncato ciliato-dentatum alatum, ala angusta dentata. Monstrositates interdum occurunt; lamina interna dentata perianthio accreta saepius inventa; in alio perianthio lamina (sive malis, folium involucrale intimum) dentata externa tota longitudine adnata erat. Spicae masculae caulem interrupte cingentes; folia perigonalia ovato-triangularia, basi inflata caulem amplectentia, erecta, apice patula, acuta, subintegerrima et serrato-denticulata apice vel indivisa vel emarginato-bidentata.

Affines huic sunt *Plag. serrata*, *cristata*, *arcuata* et *bicornis*, sed foliorum forma et denticulatione bene distingui possunt.

Tab. VIII. var. α *major*. fg. 1. Perianthium $1\frac{7}{1}$ auctum. fg. 2. labium perianthii. fg. 3. folium involucrale. fg. 4. amphigastrium involucrale. fg. 5. folium caulinum a ventre visum. fg. 6. folium caulinum a dorso visum cum amphigastrio. fg. 7. amphigastria.

Var. β *minor*. fg. 1. Perianthium $1\frac{7}{1}$ auctum cum foliolo externe accreto. fg. 2. perianthium cum lamina interne et altera externe accreta. fg. 3. perianthii pars ad alam monstrandum. fg. 4. perianthium adultum cum lamina interne accreta. fg. 5. lamina illa accreta interne soluta. fg. 6. folium involucrale. fg. 7. 8. 9. folia caulina basi ventrali varia. fg. 10. amphigastrium.

51. *Plagiochila porelloides* Lindbg.

Pl. caule diviso radicante, ramis adscendentibus parce divisis, foliis subimbricatis convexo-gibbis ovato-rotundis integerimis margine utroque reflexusculis (floralibus parce denticulatis majoribus), amphigastriis bifidis laciniis lanceolato-subulatis elongatis interdum obsoletis, fructu terminali, perianthio oblongo-ovato, ore compresso rotundiusculo denticulato.

Lindenb. Monogr. Plagiochil. p. 61. n. 36. tab. 12. — Synops. Hepat. p. 48 et 645. n. 64.

Liebmann fandt denne Plante paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 10,000 Fod i September med Perianthier. (Hb. Liebm. n. 491. e. p.)

Stirps 2-pollicaris. Folia floralia quatuor, margine ventrali parce denticulata; inferiora margine dorsali reflexo subintegerrima; superiora vel folia involucralia proprie sic dicta utroque margine parce denticulata. Sub hisce foliis altero vel utroque latere innovatio oritur. Folia caulina $\frac{5}{6}$ lin. longa et $\frac{4}{5}$ lin. lata margine integerrima; textura vulgaris, constat enim discus folii plerumque ex areolis 6-angularibus, quibus 5-, 7- et 8-angularares intermixtae sunt. Incrassatio angularis fortior, ita ut saccus primordialis 6-brachiatus fiat;

saepe interjecta massæ incrassatio tamen parietem invadit. Perianthium $1\frac{1}{4}$ lin. longum, $\frac{2}{3}$ lin. latum, basi obconicum, ore compresso denticulatum, ala nulla.

Observ. Amphigastria in Synopsi nostra Hepaticarum aeque atque in Lindenbergiæ Plag. Monographia praetervisa sunt, quamquam exemplaria illa, quibus beatus Lindenbergius usus est, e Novo Eboraco a Torrey missa et Neesii autographo inscripta, amphigastriis praedita sunt.

52. *Plagiochila asplenoides* *Montagn. et Nees.*

Pl. caule repente flagellifero, ramis erectis vel adscendentibus vage ramosis, foliis subimbricatis oblique patentibus decurvis obovato-rotundatis integerrimis denticulatisque margine dorsali reflexo, fructu terminali, perianthio oblongo apice dilatato compressoque curvo involucrum multo superante ore truncato dentato-ciliato.

Lindenbg. Monographia Plagioch. p. 110. n. 68. t. 23. — Synops. Hepat. p. 49. n. 67.

β , *confertior*, magis ramosa, foliis imbricatis ovato-oblongis deflexiusculis denticulatis subintegerrimisque.

γ , *minor*, foliis erecto-patulis arce imbricatis nonnullis marginè dorsali valde reflexis subsecundis, superioribus denticulatis inferioribus integerrimis, perianthio oblongo apice minus dilatato.

Iblandt mexikanske Mosser fandtes den af Hampe. (In Hb. Hampeano et Neesiano.) Foliorum discus componitur areolis sexangularibus, intermixtis quinangularibus, heptagonis et octangularibus; incrassatio angularis, rarius parietalis; cellulae a latere visae, si zinco bijodato tinctæ sunt, interstitia parietalia hyalina — scilicet poros — inter lora violacea descendantia monstrant.

53. *Plagiochila anomala* *Lindbg. et Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis flexuosis adscendentibus subsimplicibus, foliis ovatis vel ovato-lanceolatis distichis imbricatis integerrimis, apice oblique truncatis sinuoso-repandis, marginè dorsali oblique descendente longeque decurrente, ventrali rotundiusculo, perianthio . . . spica mascula in medio ramo; foliis perigonialibus saccatis ceteroquin conformibus, aeque magnis.

Synops. Hepat. p. 646. n. 65. b.

Liebmann fandt denne Plante i Skovene omkring St. Jago Amatlan (6000') i Depar-

tementet Oajaca og i de dybe Urskove, som bedække Siderne af Cerro de Sempaltepec i Juni og Juli uden Frugt. (Hb. Liebm. n. 155 et 287. e. p.)

Crescit in caespitibus sibi incumbentibus. Rami elongati, 2—4 pollices longi, simplices vel inordinate pauciramosi, radiculis sub foliorum basi orientibus sibi irrepentes. Folia ovata vel ovato-lanceolata, apice deflexo apiculata vel repanda vel oblique truncata, ut, sinuositate quadam accidente, interdum bidentata videantur; margo dorsalis oblique levi curvatura longe in caulem descendit et in nonnullis foliis sub apice denticulo instructus est, ventralis linea paullo curvata in dentem apicularem abit; bases foliorum in dorso et in ventre subcontiguae; sub foliis radiculae albidae rariores conspiciuntur. Color lurido-flavus, imo rubicundus, apicibus flavo-virescens. Textura foliorum fere ut in *Jg. porphyroleuca* et *Taylori*; cellulae angulis valide incrassatae observatori famosas illas cellulas intercalares auctorum depingunt, sed si folia cum liquore kali caustici coquuntur et, postquam tineta sunt zinco bijodato, ictu levi in cellulas singulas solvuntur, facile videas, unamquamque cellulam angulos conice protrudere subhyalinos, quibus ternae (vel rarius quaternae) inter se cohaereant, brachio sacculi primordialis in sinu interangulari sub prominente. In foliis junioribus incrassatio levior angularis punctiformis, sed jam adest macula alba triangularis minor; in foliis gemmae nascentibus nulla macula intercalaris conspicitur, et incrassatio tantum cognoscitur punctis sex angularibus.

Planta mascula spicis 3 lineas longis in medio ramo gaudet; folia perigonalia conformia, aequa magna, basi saccata, in axilla fovent torum antheriferum, binis ternisve antheridiis inter paraphyses minores (si ita nominare velis illas columellas tribus plerumque cellulis sibi impositis confectas, antheridiorum pedicello multo minores, quae saepissime in antheridiorum vicinia deprehenduntur) pedicello aequa longo suffultis ornatum.

Cum nulla Plagiochilarum specie cognita ex nostra sententia confundenda, sed foliorum forma, si apicem excipias, cum *Pl. amplexifolia* comparanda, cuius discus folii longe aliam texturam habet et cellulis parietibus leviter incrassatis nec stellatis componitur. *Plag. approximata* distinguitur foliis brevioribus subrotundis obtusis diverseque textis.

Tab. VII. fg. 1. Plantae pars magnitudine naturali. fg. 2. pars rami a dorso visa $\frac{1}{4}$ aucta. fg. 3. folia a caule soluta a ventre visa.

54. *Plagiochila alternans* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule divaricato ramoso, ramis patentibus strictis elongatis apice microphyllis interdum radicantibus, foliis ovalibus distantibus stricte alternantibus basi cuneata, margine ventrali arcuato toto apiceque ipso et sub apice spinuloso-dentato, dorsali leviter reflexo (hac parte integerrima) paullo decurrente, perianthio

Synops. Hepat. p. 648. n. 69. d.

Liebmann fandt denne Plante i de fugtige Bjergskove omkring Tonagua i Districtet Villa alta i det østlige Oajaca i en Høide af 4000—5000 Fod. (Hb. Liebm. n. 296).

Caulis pars foliati, ubi decumbebat, strato subjacenti affixa radicellis minutis protrusis, rhizomatis vice fungebatur. Rami geniculati vel flexuosi, vel saepius stricti, divaricati, ad 5 pollices longi, apice decrescentes, foliis minoribus vestiti, interdum radicantes et innovantes. Folia stricte alternantia, disticha, ovato-rotunda vel brevi-ovalia, $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{3}$ lin. longa, 1 lin. lata, ita distantia, ut ramus fere *Mnii cuspidati* flagello similis sit; basis cuneata folii altitudinem dimidiam fere aequat; margo ventralis arcuatus in apicem rotundum transit, margo dorsalis paululum reflexus, unde linea curvâ in caule descendit.

Folium toto circuitu dentatum, sed in parte reflexa integerrimum, a dorso gibbum, a ventre concavus est et madefactum lente siccescit; folia minora ramuli supremi longiora, obovato-cuneata sunt. Textura folii qualis in plerisque Plagiochilis; discus folii enim componitur cellulis 5-, 6-, 7- et 8-angularibus; incrassatio angularis fere nulla, dum in cellulis marginalibus ac in dentibus omnes parietes incrassati sunt. Inflorescentia mascula et feminea desideratur. Habitu a reliquis Plagiochilis foliis tam stricte alternantibus recedit; tamen ex longinquo comparari possit cum *Plag. Columbica* Gotsche, quae foliis longioribus apice rotundato tantum dentatis (nec toto margine ventrali) bene distinguitur.

Tab. VII. fg. 1. Plantae pars naturali magnitudine. fg. 2. pars rami a dorso visa, $\frac{1}{4}$ aucta.

55. *Plagiochila stolonifera* Lindbg. et Gotsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis dichotome divisis stoloni-feris, foliis confertis subverticalibus ovato-rotundis convexis obtusis patentibus, margine dorsali reflexis integerrimis, ventrali rotundatis aequo atque apice subrepando-dentatis (innovationum foliis ovatis obovato-cuneatisve bi-trispinosis), perianthio (juniori) campanulato compresso ore laciniato-dentato, foliis involucralibus majoribus subconformibns validius dentatis margineque dorsali latius reflexis et 2—5 dentibus armatis.

Synops. Hepat. p. 655. n. 83. d.

Liebmann fandt denne Plante i de tætte Bjergskove, som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec, i Juni. (Hb. Liebm. n. 184 et 195 e. p.)

Planta sesqui-bipollicularis. Rami adscendentes, flexuosi dichotome semel pluriesve divisi, ramuli utroque latere stolones emittentes multos initio breves nudos, deinde foliis vestitos pinnatim dispositos vel fasciculatos. Folia ramorum et ramulorum principalium

conferta (superiora magis distantia) subverticalia, ovato-rotunda, paullum obliqua, convexa, deflexiuscula, obtusa, patentia, margine dorsali late reflexa plica valde convexa, brevi spatio decurrentia, integerrima, ventrali arcuato aequa atque apice oblique truncato rotundatove repando-dentata. Folia $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{3}{5}$ — $\frac{2}{3}$ lin. lata, apice coarctato $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ lin. lata. Innovationum folia infima et juniora minuta, subovata, reflexa, bi-tri-plurispinosa, superiora et adulta ovata, obovata, basi saepe cuneata, margine dorsali recto angustius reflexa, saepe acuta, ventrali minus arcuata, nonnulla basi subreflexa.

Textura foliorum vulgaris; areolae minutae versus basin folii longiores, angulis incrassatis; folia cocta et zinco bijodato tincta marginem hyalinum et figuram crenulato-stellularem monstrant; in cellulis basalibus saccus primordialis elongatus brachio uno altero oblitterato. Flagella initio bilinearia nuda, postea foliis vestita, vel novos caules praebentia.

Fructificationis gemmam tantummodo vidi. Perianthium junius campanulatum compressum, labiis laciniato-dentatis, adhuc latebat in foliis involucralibus, quae fere eandem formam ac caulina habent, sed paullo majora, $\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{2}{3}$ lin. lata, validius dentata, et margine dorsali $\frac{1}{10}$ lin. latitudine reflexa parce dentata sunt.

Propinqua *Plagiochilae sarmentosae*, quae tamen statura est minore, et folia habet breviora subrotunda magis reflexa arctius grossiusque serrato-dentata, margine dorsali ad medium fere armata flagellaque longiora rariora e caule provenientia. *Plag. deltoidea* foliorum forma accedens, est multo major foliisque instructa arte imbricatis; *Plagiochila Bahiensis* denique est laxior, simplicior, foliisque differt magis rotundatis argute dentatis.

Tab. XI. fg. 1. Perianthium junius cum folio involucrali $\frac{1}{1}$ ⁷ auct. — fg. 2. aliud perianthium (junius). fg. 3. 4. folia involucralia. fg. 5. pars caulis a ventre visa. fg. 6. pars caulis a dorso visa. fg. 7. 8. 9. 10. folia caulina a ventre visa.

56. *Plagiochila supina* *Gottsc.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus brevibus, foliis adproximatis ovatis patentidivergentibus retroversis, margine ventrali e basi contracta dentata interdum reflexa toto aequa atque apice oblique truncato dentato-serratis, dorsali latius recurvo vel in novellis basin versus reflexo integerrimis (parte apicali interdum uno altero dente armata excepta), fructu . . .

b. *cirrhosa*, cirrhos nudos apice interdum foliosos edens.

Iblandt andre Hepaticae fandtes faa Exemplarer uden Fructification; de bleve samlede i Skoven omkring Hacienda de Mirador. (Hb. Liebm. n. 22 et 38. ex parte.)

Plantae unipollulares, parcius ramosae, sed cirrhos nudos hic inde e latere caulis ad foliorum axillas emitentes, (qui cirrhi interdum ex axilla cuiusvis folii utriusque lateris prorepunt et plantam fere capillatam efficiunt), apice quoque in cirrhos nudos fasciculatos terminatae. Cirrhi, radicularum expertes, apice conico nudo vel in gemmam foliosam terminantur. Folia caulina $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, brevi-ovata, retroversa, ut stirps a dorso visa nihil nisi minorem foliorum partem recurvam monstrat. Folia cum liquore kalico cocta et zinco bijodato tincta intra membranam secundariam incrassationem angularem fortiorem, sed tamen in parietalem totalem non transeuntem monstrant. Gemmula foliorum terminalis cellularum incrassationem a primo gradu usque ad perfectum statum sequi permittit.

A *Plag. Bahiensi*, cujus plantae exemplaria non habeo, foliorum forma, ut videtur, differt.

Tab. XII. fig. 1. Pars caulis a ventre visa, $\frac{1}{7}$ aucta. fig. 2. pars caulis a dorso visa. fig. 3—9. folia caulina.

57. *Plagiochila frausa Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus apice fasciculatis strictiusculis, foliis dissitiusculis vel subimbricatis ovatis retroversis, margine ventrali e basi subnuda (in α) adscendente arcuato denticulato, dorsali angustissime reflexo integrerrimo basin versus sinuato longius decurrente, apice truncato rotundatove 2—5-dentato, perianthio ovato elongato ala angusta fere invisibili, vel interdum latiore nuda, labiis rotundis dentatis, foliis involucralibus conformibus majoribus margine dorsali ad medium fere dentatis; spica mascula terminali e 10 paribus foliorum perigonialium apice 3—4-dentatorum composita.

$\beta.$ *arguta*, perianthii ore et foliis argutius spinosiusque dentatis.

Liebm. samlede faa Exemplarer af denne Art iblandt andre Hepaticae i de dybe Bjergskove, som beklæde Siderne af Cerro de Sempoaltepec (9000'). (Hb. Liebm. n. 196 et 203 ex parte.)

Rami bipollares et ultra, cum foliis $1\frac{1}{6}$ lin. lati; folia erecto-patentia, convexa, $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata; margo dorsalis $1\frac{1}{6}$ lin. longus, interdum versus apicem nonnullos dentes habens. Color foliorum viridi-flavescens; in cellulis incrassatio angularis adest, interdum totum parietem invadens; in areolis marginalibus incrassatio fere nulla vel alterius lateris; areolae foliorum minores quam in *Plagiochila heteromalla* legitima, quacum antea conjunximus. Perianthium $1\frac{1}{2}$ lin. longum, ore rotundato sinuoso $\frac{5}{6}$ lin. latum, alam nullam

vel inconspicuam habet; rarius et casu fortuito ala subintegerrima invenitur, qualem in tabula nostra depinximus. Folia involucralia 1 lin. longa et $\frac{5}{6}$ lin. lata sunt.

Varietas β folia subimbricata habet, serrato-dentata, et spinosiora quam var. α ; folia caulina 1 lin. longa, basi 1 lin. lata sunt, apice $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. Perianthium $1\frac{1}{6}$ lin. longum, ore 1 lin. latum; folia involucralia 1 lin. longa, parte latissima $\frac{2}{3}$ lin. explet.

Plagiochila heteromalla perianthio elongato cylindrico ore dentibus angustioribus armato differt; planta sterilis aegrius distinguitur; folia tamen latiora sunt et margo ventralis magis arcuatus est quam in *Plag. frausa*. A *Plag. renitente*, cuius folia fere aequat, margine dorsali nudo nec serrato-dentato differt.

Tab. XIII. *Plag. frausa* α . fg. 1. Perianthium (alatum) $1\frac{7}{4}$ auctum. fg. 2. folium involucrale. fg. 3. pars caulis a ventre visa. fg. 4. 5. 6. folia caulina.

Plag. frausa β . fg. 1. Perianthium $1\frac{7}{4}$ auctum. fg. 2. folium involucrale. fg. 3. folium involucrale alterum. fg. 4. pars caulis a dorso visa. fg. 5. 6. folia caulina.

58. *Plagiochila retrorsa* *Gottsch.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis, foliis imbricatis ovato-ellipticis retroversis, margine ventrali e basi subnuda adscendente arcuato spinoso-dentatis, dorsali a medio versus apicem subreflexo subintegerrimo rectiusculo (vel paulo sinuato) decurrente, apice angustato subtruncato rotundatove 4—6-dentato, perianthio campanulato compresso alato (ala inermi vel apice tantum dentata) ore rotundato dentibus inaequalibus (mediis prominulis) spinosis armato, foliis involucralibus longioribus conformibus margine dorsali 5—6-dentatis latius reflexis vel convoluto-reflexis.

β . *robustior*, ramosior, statura robustiore.

Frederik Müller samlede denne Plante med Perianthier og Hanplanter i Juli i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Aserradero de Santa Cruz iblandt *Sendtnera juniperina*; i Herbarium Berol. Reg. findes den medbragt af Regel, uden næitere Anførelse af Findestedet; Liebmann samlede paa Vulkanen Orizaba ogsaa nogle sterile Grene, som sandsynligvis henhøre til denne Art.

Planta Regeliana, cuius formae beatus Fr. Müller quoque exemplaria collegit, parcius ramosa, sesquipollicaris; rami cum foliis retroversis majoribus $1\frac{5}{6}$ lin. vel, ubi folia minora sunt, $1\frac{1}{6}$ lin. lata. Folia retroversa vel subsecunda cellulas angulis in-

crassatas habent; rarius incrassatio parietalis; cellulae marginales fortius incrassatae; foliorum longitudo majorum $\frac{5}{6}$ —1 lin., latitudo $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin.; minora folia $\frac{2}{3}$ — $\frac{4}{5}$ lin. longa et $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ lin. lata sunt. Folia involucralia majora $1\frac{1}{3}$ lin. longa, parte latissima $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin. lata. Perianthium (junius) campanulatum, altero labio altius prominente, 1— $1\frac{1}{6}$ lin. longum, ore $\frac{2}{3}$ —1 lin. latum; in uno perianthio monstruositas levior aderat, scilicet lacinia accessoria interna $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ lin. lata, utrinque dentata.

Varietas β , robustior, e caule repente stirpes ramosiores edit, 2—3-pollicares extra involucrum innovantes. Plantae masculinae ejusdem statura in apice ramorum spicam fusiformem e 12—15 perigoniorum paribus conflatam habent, in gremio unicum antheridium flavescentis continentium; folia perigonalia apice erecto-patentia, margine ventrali, apice et sub apice serrato-dentata. Perianthia adulta 2 lin. longa, ore 1 lin. lata; ala $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{6}$ lin. lata, apice dentata ad medium altitudinem (1 lin.) assurgens; in perianthio juniore longitudo $\frac{5}{6}$ lin., latitudo oris $\frac{5}{6}$ lin., latitudo alae $\frac{1}{5}$ lin. erat. Folia involucralia $1\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{5}{6}$ lin. lata sunt. Semina majora fusca, subgranulosa; in elateribus spiralis fibra duplex fusca latior in tubulo hyalino.

Quamquam foliorum forma et denticulatione magis ad *Plagiochilam frausam* β accedit, planta fructifera tuto perianthio late alato distinguitur; forma robustior aegre cum *Plag. frausa* commutari potest.

Tab. XI. fig. 1. (Planta Regeliana) Perianthium $1\frac{7}{10}$ auctum. fig. 2. perianthium dissecatum alam vel laciniam internam oblongam utrinque dentatam monstrans. fig. 3. 4. folia involucralia. fig. 5. pars caulis a dorso visa. fig. 6. folium caulinum a ventre visum.

59. *Plagiochila heteromalla* *Lehm. et Lindbg.*

Pl. caule repente ramisque adscendentibus simplicibus bifidisve arcuatis subdivaricatis, foliis subverticalibus divergenti-deflexis heteromallis semicordato-oblongis convexis margine reflexis, margine ventrali e basi contracta nuda toto apiceque serrato-denticulatis, dorsali rectiusculo subintegerrimis, fructu in ramulis terminali, perianthio elongato-pyriformi ore compresso truncato ciliato.

Lindenbg. Monogr. Plagiochil. p. 83. n. 49. tab. 18. — Synops. Hepat. p. 56 et 656. n. 86.

Fandtes af Ehrenberg i Alunhulerne ved Foden af Cerro de los Nebijos; Liebmann samlede den i Departementet Oajaca paa Cerro el Pelado (imellem 9—10,000 Fods Høide) uden Frugt i September.

Folia plantae Mexicanae texturā paullum a planta originali recedunt. Proximae margini series binae toto circuitu incrassatas habent cellulas, et reliquae, quamquam angularem incrassationem habent, tamen paries non tam incrassatos monstrant, quam species originalis, cuius margo foliorum contra minus incrassatas cellulas habet. Forsan igitur, si fructificatio innotuerit, diversam speciem habebimus; sed interea Lindenbergii auctoritatem sequimur.

60. *Plagiochila ovata* *Lindbg. et Gottsche.*

Pl. caule repente intricato, ramis primariis adscendentibus geniculatis interdum flagelliferis, apice fasciculato-innovantibus, foliis subverticalibus divergenti-deflexis heteromallis late ovatis circumcirca dentibus minutis acutissime armatis, margine dorsali reflexis, fructu terminali vel, subveniente innovatione, in dichotomia, perianthio elongato cylindrico-compresso apice bilabiato denticulato, foliis involucralibus minoribus inaequalibus.

Synops. Hepat. p. 656. n. 86. b.

Liebmann fandt denne Art paa Vulkanen Pico de Orizaba i Omegnen af Vaqueria del Jacal (10,000 Fod) i September med Perianthier. (Hb. Liebm. n. 150.)

Caules repentes, intricati, aphylli. Rami primarii 3 pollices longi et ultra, interdum flagelliferi, ramulos laterales ante apicem nonnullos emittentes, apice dupli innovatione subperichaetiali terminati. Flagella microphylla, dense fasciculato-radiculosa. Folia late ovata, 2 lin. longa et $1\frac{3}{4}$ lin. lata, circumcirca dentibus subtilissimis acutissimisque acutissime armata, heteromalla, margine dorsali reflexa, versus apicem fructiferum crescentia et crispata, aqua infusa lente resurgentia. Areolae marginales (plerumque 2 series) aequa dentes paries toto tractu valde incrassatos monstrant; reliquae disci cellulae incrassationem angularem vulgarem habent. Fructus terminalis propter innovationes in dichotomia; perianthia rara, quia plerumque flos abortivus fit; ubi adest perianthium, apice retroversum est, elongatum, $2\frac{1}{2}$ lin. longum, ore $1\frac{1}{8}$ lin. latum, cylindrico-compressum, ore bilabiato denticulato. Folia involucralia magnitudine inaequalia, foliis summis caulinis minora, margine dorsali magis convoluta, ventrali fortius dentata. Planta mascula desideratur.

Habitu proprius accedens ad *Plag. heteromallam*, statura triplo majore foliorumque forma atque denticulatione margineque dorsali dentato distinguitur; a *Plag. Hookeriana*, cui proxima, foliorum quoque forma et subtili denticulatione recedit.

Tab. XII. fig. 1. Perianthium cum folio involucrali $1\frac{7}{8}$ auctum. fig. 2. folium caulinum a ventre visum. fig. 3. folium caulinum a dorso visum.

61. *Plagiochila cucullata* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente, ramis flaccidis adscendentibus flexuosis subramosis, foliis imbricatis semiovato-triangularibus, margine ventrali rectiusculo basi cuneata longius soluta angulo convoluto-reflexo apiceque acutiusculo serratis, dorsali integerrimo reflexis, amphigastriis bi-trifidis laciniis subulatis, fructu laterali, perianthio (juniore) campanulato compresso, ore bilabiato ciliato-dentato.

Synops. Hepat. p. 642. n. 40. b.

Liebmman fandt denne Art iblandt andre Levermosser i Departementet Vera Cruz i Nærheden af Santa Maria Tlapacoya i Skovene omkring Plantagen Hacienda de Jovo (1800.—2000') i Mai. (Hb. Liebm. n. 561. e. p.)

Caulis repens, radiculosus, nudus. Rami adscendentes, flacci, iterato-dichotome ramosi, incurvi vel flexuosi. Folia semiovato-triangularia, imbricata, cristam ventrale formantia, apice distantia, margine ventrali subundulato rectiusculo serrato, versus basin cuneatam ab angulo in cucullum inter laminas vitreas non, nisi basi soluta, explicabilem convoluto, margine dorsali in foliis summis latius, in reliquis subreflexo integerrimo, oblique vel arcuata linea in caule decurrente, apice lanceolato bi-tri- (vel uni-) dentato. Incrasatio angularis vulgaris ubique in cellulis deprehenditur, in basi foliorum fortior, interdum parietalis. Cellulae solutae saepius apiculum hyalinum monstrant membranae primariae, qui olim ab illustr. Neesio macula intercalaris existimatus est. (cf. Hepat. Europ. I, p. 38.) Amphigastria latent (vel delitescunt), sed in ramorum apicibus et in basi dissectione bene cognoscuntur; sunt polymorpha, 3 vel irregulariter partita, laciniis subulatis flexuosis interdum lacinia externa adjecta praedita, et cum folio adjacente connata. Fructus in dichotomia aut lateralis; perianthium tantummodo junius visum; pistilla multa. Folia perichaetalia erecta, addressa, circumscriptione fere conformia, sed magis undulata; margo ventralis valide dentatus et, quia ex parte inflexus est, valde repandus videtur; margo dorsalis reflexus serrato-dentatus. Folia floralia, quae insequuntur, magis magisque caulinorum formam induunt.

Propius accedit ad *Plag. undatam* Sulliv. et *tortuosam* Ldbg. MSS.*), a quibus am-

*)

Plagiochila tortuosa Ldbg. MSS.

Pl. caule repente, ramis erectis flexuosis dichotome fastigiatim ramosis, foliis imbricatis patent-divergentibus semiovatis, margine dorsali breviter decurrentibus subreflexis integerrimis, ventrali apiceque argute serrato-dentatis, basi valde undulata in cristam dentatam reflexam subeonniventibus, dentibus apicis majoribus, perianthio cylindrico compresso alato, ala apice denticulata, ore truncato spinoso-ciliato, foliis involucralibus majoribus margine dorsali toto denticulatis, ventrali undulato-crispo spinoso-dentatis. (Ldbg. MSS.)

Habitat ad Caracas Venezuelae.

phigastriis et foliorum denticulatione diversa est; a formis nonnullis *Plag. ulophyllae* aegrius distinguitur; tamen margo ventralis in his plerumque undulato-crispus diagnosin faciliorem reddit.

Tab. XI. fig. 1. Perianthium junius $\frac{1}{1}$ ⁷ auctum. fig. 2. 3. folia involucralia. fig. 4. 5. folia floralia. fig. 6. pars caulis a latere visa. fig. 7—12. folia a caule soluta, a ventre visa. fig. 13. amphigastria.

62. *Plagiochila crispata* *Gottsche.*

Pl. caule repente, ramis adscendentibus subflexuosis inordinate dichotomeque ramosis basi stoloniferis, foliis imbricatis declinatis ovatis subintegerrimis e basi nuda reflexa decurrente in angulum ventrale dilatatum cristam undulato-crispam formantem adscendentibus, margine ventrali recto undulato-sinuatis (in toto sinibus 4—6 crispato), dorsali reflexo apice rotundato truncatoe angulato-subdenticulatis, amphigastriis conspicuis ubique obviis bifidis, laciniis elongato-lanceolatis basin versus extus dentatis, fructu terminali, laterali vel in dichotomia, perianthio obovato campanulato subalato, ore rotundato sinuoso spinoso-dentato, foliis involucralibus (aeque ac floralibus) dentatis margine dorsali latius convoluto-reflexis.

Frederik Müller fandt denne Plante i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Aserradero de Santa Cruz.

Planta, circiter $2\frac{1}{2}$ pollices alta, e caule vel potius e stolonibus basalibus prioribus profert ramos multos adscendentes, qui varium in modum dividuntur; stolones parce radicellati, foliis minoribus ovato-cordatis (apicem versus, si stolo in ramum transit, margine ventrali sinu solitario subundulatis) vestiti. Folia ovata, vix $\frac{5}{6}$ lin. longa, parte latisima ante basin $\frac{1}{2}$ lin. et apice $\frac{1}{6}$ lin. lata; e basi nuda reflexa (scil. e lacinia in caulem descendente) discus folii ampliatur in angulum ventrale crispum subverticalem erecto-patulum; in toto margine ventrali plerumque à sinus margine reflexi numerantur, quorum tres in surculis a ventre visis eminenter observationi se praebent, dum reliqui propter situm verticalem cristae magis latent. Color foliorum fuscescens, novellorum viridis, textura qualis in reliquis *Plagiochilis*. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta incrassationem cellularum parietalem, poris tamen relictis, exhibent; membrana primaria ictu levi a secundaria solvi potest, et nucleus cellulae ejicitur, interdum tamen relictis incrassationibus angularibus in angulis membranae primariae adhaerentibus; quoties hoc fiebat, nucleus haud laceratus erat, unde forsan plura incrassationis strata (sicut in cellulis *Pinus piceae*) adesse credendum est.

Amphigastria fere $\frac{1}{5}$ lin. longa, basi $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{6}$ lin. lata, bi-pluripartita, polymorpha, sed ubique obvia. Perianthium 1 lin. longum, ore rotundato $\frac{5}{6}$ lin. latum, interdum alam habet, interdum caret; in uno exemplari erat angustissima, carinam paulo prominentem exhibens, in alio major, in tertio apice unidentata; duo alia perianthia ala vulgari carebant, sed lacinia accessoria apice dentata monstrose margini ventrali ipsi vel prope eum perianthio accreta erat; labia spinoso-dentata, dentibus incurviusculis armata, subtruncata inter laminas vitreas, dum in situ os rotundatum sinuosum labiisque partim reflexis appetit. Folia involucralia (aeque ac duo paria floralia subsequentia) dentata sunt; margo dorsalis latius convoluto-reflexus dentatus, ventralis undulato-sinuatus spinoso-dentatus, apice toto reflexus; in uno exemplari basis marginis dorsalis perianthio longius accreta erat; in alio folio margo reflexus cum convexitate disci ventrali duobus locis connatus erat.

Diffrerit a *Plag. crispula* Nees (= *Plag. ulophylla* β Ldbg.), cui propter adspectum ventrale simillima est, foliis magis ovatis subintegerrimis; a *Plag. ornata* Wilson, quae etiam folia integerrima et ejusdem fere circumscriptio habet, statura duplo majore et foliis aliter crispatis diversa est; a *Plag. ulophylla* Mont. foliis integerrimis pluribusque sinibus (5, nec duobus) crispatis longius distat.

Tab. XV. fig. 1. Perianthium $\frac{1}{4}$ auctum (alatum). fig. 2. perianthium aliud cum crista accessoria ante marginem. fig. 3. folia involucralia a latere visa. fig. 4. pars caulis a ventre visa. fig. 5. folium involucrale. fig. 6. 7. folia caulina soluta cum amphigastriis. fig. 8. amphigastria.

63. *Plagiochila sancta Gottsche.*

Pl. caule repente intricato, ramis erectis apice dichotome fasciculatim ramosis basi stoloniferis, foliis imbricatis subovatis declinatis subtus in cristam undulatam denticulatam subconniventibus e basi nuda reflexa decurrente in angulum ventrale sinuoso-crispulum patentem ampliatis, margine ventrali subrecto toto serrato-dentatis paullum crispulis, dorsali reflexo integerrimis, apice subrotundo truncatoe serrato, amphigastriis ubique obviis 2-plurifidis, laciniis flexuosis dentatis, fructu terminali lateralive, perianthio campanulato ore sinuoso oblique truncato, labiis spinoso-dentatis, foliis involucralibus erecto-patentibus margine ventrali sinuato laciniato-dentatis, dorsali ad basin usque simplicius dentato.

Plagiochila ulophylla Synops. Hep. p. 657. n. 93.

Liebmman fandt denne Art imellem Mirador og Totutla i Departementet Vera Cruz ved Aguas santas i Juli med Frugt. (Hb. Liebm. n. 388. b.)

E caule repente intricato, quia olim stolones erant, adscendunt rami primarii erecti semipollicares apice di-trichotome ramosi, basi stoloniferi, ita ut tota planta 1 pollicem alta sit.

Folia arcte imbricata ovato-triquetra, utrinque decurrentia, margine ventrali undulato-repanda, margine sinuum rarius reflexo, dentata vel serrato-dentata; angulus ventralis dilatatus, dentatus, undulatus; pars descendens sinu contrahitur in laciniam nudam reflexam in caulem decurrentem, ad cuius basin amphigastria inveniuntur; apex folii subtruncatus vel rotundiusculus dentato-serratus; margo dorsalis levi sinu incurvus reflexus integerrimus. Color saturate viridis; textura vulgaris. Incrassatio cellularum angularis, in angulis lora latiora descendenta, relictis intersititiis hyalinis; in foliis cum liquore kali caustici coctis et zinco bijodato tinctis membrana primaria a secundaria solvi potest, et levi ictu nucleus totus hexagonus exit e cellula; in cellulis solutis apices trigonum hyalinum e materia membranae primariae confectum habent, itaque docent, trigona intercalaria Neesii, in operibus ejus ubique prolixe repetita, angulos externos cellularum esse neque quidquam alieni e materia intercellulari, quae liquore kali caustici solvatur, confectum continere.

Amphigastria ubique obvia, bene perspicua, polymorpha, 2-plurifida, laciinis latioribus subulatisve flexuosis, erectis decurvatis, iterum dentatis.

Folia stolonum minora, ovato-rotunda, integerrima. Folia involucralia erecto-patentia, perianthium arcte cingentia, apice oblique deflexa, margine ventrali undulato-sinuata, laciniato-dentata, dentibus interdum duplicatis et simplicioribus minoribusque interjectis; margo dorsalis ad basin fere dentatus. Duo paria sequentia, folia floralia sensim in conditiones foliorum caulinorum transeunt. Perianthium campanulatum ore obliquo truncato sinuoso labiis saepius partim reflexis, dentibus spinosis incurvis (interdum basi cum dente accessorio) armatis; semel alam internam dentatam in perianthio inveni. Capsula cinnamomea saepius in meis exemplaribus perianthium non superat; in alio pedicellus fere 1 lin. supra perianthii marginem prominebat. Elateres bispiri, sed saepissime inveniuntur elateres, qui ex parte quin etiam ex maxima parte unispiri sunt; tamen omnes monstrant fibram fuscam intra saccum, nec ut vult cl. Reinsch (*Linnaea* t. 29. p. 593—664 »Entwickelung der Sporen und Schleudern von Jung. pusilla) sacculum extus circum-dantem.

Semina flavo-fusca, majora, angulosa, granulata.

Planta mascula ignota est.

A *Plag. ulophylla* Mont. typica differt toto habitu, foliis aliter crispatis et aliter dentatis stolonumque foliis integerrimis (quum stolones *Plag. ulophyllae* Mont. semper folia dentata habeant.)

Tab. XIII. fig. 1. Perianthium ¹⁷₁ auctum. fig. 2. labium ejus. fig. 3. 4. folia floralia. fig. 5. pars caulis, facies interna. fig. 6. pars caulis, facies externa. fig. 7. 8. 9. folia a caule soluta. fig. 10. amphigastria.

64. *Plagiochila bifaria Lindbg.*

Pl. caule repente, ramis erectis simplicibus apice proliferis, foliis bifariam imbricatis erecto-patulis verticalibus longe decurrentibus oblique ovatis acuminatis margine dorsali reflexis integerrimis, ventrali apiceque dentato-spinulosis, fructu terminali, perianthio involucrum vix superante obovato, ore truncato ciliato.

Lindenberg. Monogr. Plagiochil. p. 127. n. 77. tab. 26. — Synops. Hepat. p. 54. n. 78.

Hampe fandt denne Art blandt Mosser fra Mexico.

65. *Plagiochila horrida Gottsche.*

Pl. caule repente intricato, ramis erectis rigidis dichotome ramosis flexuosis, foliis supremis arete bifariam imbricatis verticalibus subadpressis, inferioribus patulis sinuato-concaviusculis-oblique ovato-rotundis, margine dorsali basi reflexo integerrimis decurrentibus, ventrali inaequaliter spinoso-dentatis, apice oblique emarginato bispinosis (dentibus omnibus ad ventrem versus recurvis), fructu terminali lateralique, perianthio (juniori) campanulato compresso alato, ala apice dentata, ore rotundo longe ciliato-dentato, dentibus mediis longissimis, foliis involucralibus majoribus ovato-quadratis, margine dorsali latius reflexis, apicis dentibus longissimis ceteroquin conformibus.

Plagiochila bifaria Hb. Liebm. (n. 444. 530 et 425. ex parte.)

Liebmann fandt denne Plante i Districtet Chinantla, paa Plantagen Mirador og i Omegnen af Cerro de Sempaltepec i Juni med Perianthier.

Exemplaria omnia mutilata, ut fere nil nisi caulis rigidus cum foliorum rudimentis restet. Planta 1— $1\frac{1}{2}$ -pollicaris; surculi simpliciores flexuosi vel curvati apice subcircinati, steriles; plantae fertiles dichotome ramosi, longiores, stirps cum foliis patulis $\frac{5}{6}$ lin. lata. Folia caulina $\frac{1}{2}$ lin. longa et $\frac{1}{2}$ lin. lata, oblique ovato-rotunda dentibus recurvis armata, sinu profundiore apice emarginata; textura fere ut in *Jung. porphyroleuca*; in foliis junioribus coctis et tinctis incrassatio angularis cellularum, sed in proximis profundioribus incrassatio cellularum lateralis et angularis valida, figura stellularis violacea et sacculus pri-

mordialis plerumque 6-brachiatus (brachiis longioribus cum incrassatione stellari alternantibus flavis) optime videntur. In cellulis solutis anguli acuti hyalini membranae primariae prominent, et hisce particulis externis formantur illa triangula pellucida foliorum, quae illustrissimus Neesius in Opp. suis de Hepaticis Europaeis cellulas intercalares «Zwickelmaschen» nominavit; quae ab incrassationibus cellulae internis secundariis omnino diversa sunt. Color foliorum ochraceus. Folia involucralia majora, cum dentibus $1\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{5}{6}$ lin. lata; discus eorum magis quadratus, 1 lin. longus; folia subinvolucralia fere ejusdem magnitudinis et formae. Fructus terminalis et in dichotomia, vel lateralis; perianthium junius tantum inveni, cilia perianthii $\frac{1}{2}$ lin. longa. Reliqua desiderantur.

Proxima est *Plag. biserialis*, foliorum forma simillima, sed perianthii conditione et foliis involucralibus subconformibus dignoscenda; eodem modo differt *Plagiochila implexa*; *Plag. compressula* stirpibus nostris, praesertim illis, quae folia patula habent, valde similis est, sed caret fructificatione, quae ad comparationem maximi momenti est.

Tab. XIII. fg. 1. Perianthium $1\frac{7}{8}$ auctum. fg. 2. folium involucrale. fg. 3. pars caulis a facie interna visa. fg. 4. pars caulis a dorso visa. fg. 5. pars caulis a latere visa. fg. 6. 7. 8. folia caulina, a facie externa (fg. 6 et 8) et a facie interna (fg. 7.)

66. *Plagiochila compressula* Nees ab Es.

Pl. caule repente stolonifero, ramis erectis simplicibus, foliis per paria approximatis subverticalibus basi adpressis, apice patentibus ovato-rotundis inciso-dentatis longeque ciliatis, margine dorsali integerrimis, fructu

Lindenbg. Monogr. Plag. p. 128. n. 78. tab. 30. — N. ab E. Enumerat. Hep.

Jav. p. 75. in adnot. ad Jung. aspleniodem. Synops. Hep. p. 54. n. 79.

Fandtes paa raadden Træbark i Mexico (Hb. Neesian.).

Rami breves, vix semipollicares, ob folia, facie plana cauli contigua, subcompressi. Folia minuta, ovato-orbiculata, basi cordata amplectentia, longe dentato-ciliata, margine dorsali integerrima, cauli planum suum advertentia, in statu humido patula, in sicco adpressa. (N. ab Es. Enum. Hep. Jav. l. c.)

Pl. bifaria proxima differt caule longiore ramoso, foliis oblique ovatis acuminatis breviter denticulatis, nec longe ciliatis vel profunde inciso-dentatis. (Ldbg. Monogr. p. 129.)

Quamquam Lindenbergius l. c. dicit, Montagneum ex Herbario Lessertiano plantam fructiferam ad Rio de Janeiro lectam secum communicavisse, fructificatio non describitur; igitur non ausus sum hanc speciem cum *Plag. horrida*, cuius fructificatio innotuit, conjungere.

67. *Plagiochila implexa* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente flagellifero ramoso, ramis erectis simpliciusculis vel dichotomis apice subfasciculatis, foliis arcte imbricatis verticalibus subadpressis decurrentibus oblique vel quadrato-rotundis, margine dorsali reflexo-convoluto integerrimo decurrente, ventrali ciliato-dentato dentibus retrocurvatis, perianthio campanulato-compresso ore rotundiusculo ciliato-dentato.

- a. forma major, elongata, simplicior, altitudine 8000 ped. in Orizaba monte collecta.
- b. minor, ramosior, altitudine 12000 ped. in eodem monte habitans.

Synops. Hepat. p. 651. n. 73. d.

Liebmann fandt denne Art paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 8000, 10000 og 12000 Fod i September med Perianthier og Hanplanten. (Hb. Liebm. n. 160 et 461. e. p.)

Crescit in caespitibus flagellis valde implexis. Rami erecti sed paullum curvati, 1— $1\frac{1}{2}$ -pollicares, flagelliferi, apice sub fructificatione plerumque binos ramulos emittentes, qui interdum iterata innovatione habitum subfascicularem apici praebent. Folia caulina rotunda vel quadrato-rotunda, $\frac{1}{2}$ lin. longa et fere aequa lata, erecta, subadpressa, margine dorsali reflexo integerrimo subincrassato limbo convoluto paullum patente longe in caulem decurrente, margine ventrali toto et apice rotundo dentato-spinoso, dentibus retrorsum curvatis; in inferiore caulis parte folia interdum magis patula et minora; in flagellis, quae radiculosa sunt, folia minuta adpressa ciliato-dentata vel bifida margine ventrali uno alterove dente spinosa. Textura foliorum firmior propter areolas parvas, quae ad basin versus et in dentibus majores sunt. Incrassatio angularis valida, plerumque etiam parietalis intermedia vel totalis, poro tantummodo pro brachio sacculi primordialis relicto. Si cellulæ coctione cum liquore kali caustici inter se solvuntur, speciem stellularem accipiunt, angulis conicis obtusis hyalinis prominentibus, dum in sinu interangulari brachium sacculi primordialis flavescentes appetat, vel, si sacculus evanuit, lumen cellulæ vacuum, propter membranam secundariam violaceam, obscuriore tractu depingitur; cui similem fere conditionem monstrant *Plag. circinalis* et *retrospectans*. Folia involucralia conformia, sed majora, $\frac{5}{6}$ lin. longa et aequa lata, perianthium junius fere obvelantia. Perianthium campanulatum, compressum, ore oblique rotundatum spinoso-dentatum; ala nulla vel parva integerrima. Pistilla 25, apice omnia jam aperta et cavo pellucido in ventrali parte praedita, fovebat perianthium junius.

Plantæ masculæ alio loco in Monte Orizaba collectæ graciliores, foliis erecto-patulis distantibusque, sed aequa flagelliferae. Spiculæ masculæ conico-ovatae parvae, 1 lineam et quod excurrit longae, sursum in caulem regulariter foliatum transeunt, donec

iterum spicula formatur. Vidimus in uno eodemque ramulo tres inflorescentias masculas; sub spiculis plerumque bini ramuli protruduntur. Spicula plerumque componitur 7—8 paribus foliorum perigonialium, quae in modum foliorum caulinorum dentato-spinosa sunt, et in gremio baseos saccatae unicum antheram pedicello aequo longo suffultam habent.

A *Plagiochila biseriali* et *horrida* differt foliorum margine dorsali convoluto-reflexo et forma perianthique denticulatione; a *Plagiochila Valenciana* Gottsche MSS. foliorum forma rotundiore et denticulatione aequo ac perianthio diversa est, eodem modo a *Plag. retrospectante* et *pachylomate* distinguitur.

Tab. XIII. fg. 1. Perianthium $\frac{1}{1}^7$ auctum alam parvam exhibens. fg. 2. folium involucrale. fg. 3. Perianthium junius cum folio involucrali. fg. 4. folium involucrale. fg. 5. perianthium junius (non alatum). fg. 6. pars caulis a latere visa. fg. 7. perianthium adultum (non alatum). fg. 8. folium involucrale. fg. 9. apex folii involucralis inter laminas vitreas compressi.

68. *Plagiochila fastigiata* Lindbg. et Gottsche.

Pl. caule repente, ramis adscendentibus flexuosis dichotomo-fasciculatis, foliis arcte imbricatis subverticalibus retroversis semiovatis decurrentibus margine dorsali basi latius, ad apicem anguste reflexis integerrimis, ventrali subundulatis parceque denticulatis rarius integerrimis basi dilatata in cristam conniventibus crispata dentatam, apice subtruncatis bitempluridentatis integerrimis, amphigastriis parvis polymorphis plurifidis laciniis dentatis, foliis involucralibus adpressis arctius longiusque dentatis, perianthio subimmerso campanulato plicato, ore inciso-ciliato.

Synops. Hepat. p. 657. n. 94. b.

Liebmann fandt denne Art i Skovene omkring Sta Maria Tlapacoyo i Departementet Vera Cruz i en Høide mellem 2—3000 Fod, ogsaa ved Lobani i varm-tempereerte Skove i Departementet Oajacas østlige District Chinantla i samme Høide. (Hb. Liebm. n. 566. e. p.)

Planta fere $2\frac{1}{2}$ pollices alta, e caule protrudit ramos adscendentibus flexuosos, inferne rudimentis foliorum vestitos, nigros, tum in 2 vel 3 ramulos geniculatim iterum divisos abeuntes, et innovatione superveniente saepius incurva apice fasciculato-ramosa appetet. Folia $1-1\frac{1}{6}$ lin. longa, basi aequo ac parte latissima $\frac{2}{3}$ lin. lata, apice $\frac{1}{5}$ lin., heteromalla, sicca magis adpressa, sed eundem habitum servantia, viridia; e basi nuda reflexa longius in caulem decurrente in angulum ventralem sinuoso-crispum dilatatum parce denticulatum rotundatum transeuntia, margine ventrali sinuoso-crispulo parcus dentata fere

recta vel paullum incurva, apice subrotundato parce versus angulum ventrale dentata, margine dorsali integerrima, reflexa, longius decurrentia. Folia stolonum basarium minora, plerumque omnino inermia, margine ventrali basin versus subundulato-crispa. Folia floralia paullo majora, magis dentata, plerumque aequa ac involucralia toto apice oblique reflexa; folia involucralia basi 1 lin. lata, margine ventrali sinuoso-crispula, dentibus incurvis et interdum reflexis spinosa, dorsali plerumque integerima vel (alterius folii) levius dentata, reflexa. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellularum incrassationem angularem et lateralem fortiorem monstrant, poris solitis tamen relictis; membrana primaria et secundaria ictu levi inter se solvi possunt et ex relicita cellula primaria hyalino-rosea exit nucleus hexagonus violaceus membrana secundaria incrassata circumdatus. Puncta trigona intercellularia («intercalaria» Neesii) tamquam apiculi hyalini in angulis externis membranae primariae apparent. Amphigastria sat conspicua, ubique obvia, plurifida, lacinii lanceolatis elongatis incurvis, margine hic inde dentata, polymorpha. Perianthium $\frac{5}{6}$ lin. longum, ore $\frac{2}{3}$ lin.— $\frac{5}{6}$ lin. latum, sectione transversa subtriquetrum, apice subtruncato spinoso-dentatum. Bis monstrositatem leviorem inveni; lacinia latior (vel foliolum accessorium) apice emarginato-bidentata ad medium longitudinem libera prope marginem ventrale perianthio accreta erat. Pistilla circa 30 numeravi.

Planta mascula, ad Lobani crescens, spicam fusiformem in ramis terminalem solitariam habet, e 12—14 paribus compositam; folia perigonalia apice rotundo serrato patula, margine ventrali sinuoso-crispula, basi ventricosa antheridia bina pedicellata (pedicello aequa longo atque anthera ipsa est) foventia.

Tab. XIII. fig. 1. Perianthium adultum $\frac{1}{4}$ auctum. fig. 2. labium perianthii. fig. 3. perianthium cum foliolo accessorio. fig. 4. perianthium juvenile cum folio involucrali. fig. 5. folium involucrale. fig. 6. fol. florale. fig. 7. pars caulis a ventre visa. fig. 8. 9. 10. 11. folia caulina. fig. 12. amphigastria.

69. *Plagiochila decipiens* Nees et Montagn.

Pl. caule repente flagellifero, ramis erectis subsimplicibus, foliis subrotundis concavis margine dorsali inflexis, inferioribus integerrimis superioribus mucronatis vel truncato-bi-tridentatis, fructu

Jung. *decipiens* Hook. Brit. Jung. tab. 50. Nees ab Es. Hep. Europ. I. p. 159.
n. 2. — Synops. Hep. p. 24. n. 1.

Frederik Müller samlede af denne Art faa ufrugbare Planter iblandt *Mastigobryum Müllerianum* i Districtet Orizaba.

Omni modo planta Mexicana convenit cum exemplaribus Hibernicis et Cubensibus a cl. Wrightio nuperrime lectis. Fructificatio hucusque ignota. Proxima huic est *Plagiochila campylodonta* Hook. et Tayl. (Synops. Hep. p. 639. 32. d.), sed amphigastriis ubique in caule obviis (ab auctoribus praetervisis!) bene dignoscenda.

Folia cocta et tincta in disci cellulis incrassationem punctiformem angularem ostendunt, quae, si levi ictu nucleus membranae secundariae e cellula dirupta, nunc e membrana primaria remanente sola constituta, ejicitur, in angulis membranae primariae arctius haeret. Cellulae marginales crassiores processu chemico obscuriore colore violaceum induunt; anguli externi paullum prominent, quod colore violaceo membranae secundariae adhuc clarius elucet, quamvis membranā primariā hyalinā obducti sint.

IV. *Scapania Lindbg.* *Synops. Hep. p. 61.*

1. *Scapania undulata Montagn. et Nees.*

Sc. foliis denticulatis integerrimisve laxis patulis, lobis trapezoideo-rotundatis, ventrali convexo solo vel utroque patulis, dorsalem diametrum transversalem lobi inferioris aequante, foliorum superiorum lobis subaequalibus, perianthio duplo longiore.

B, foliis integerrimis vel obsoletissime denticulatis plerumque confertioribus magisque incumbentibus lobo superiori plerisque minore, caule saepe rigidiore.
 β, foliis magis incumbentibus viridibus vel roseis.

Synops. Hep. p. 67. n. 7. Nees ab E. Hep. Europ. I. p. 184—193.

Hampe opdagede denne Art iblandt Mosser fra Mexico.

Textura foliorum coctorum et tinctorum hanc imaginem observatori praebet. Cellulae marginales minores sunt, sed interstitium hyalinum majus apparet, unde membrana primaria hac parte crassior esse videtur; adversus medium folium cellulae majores fiunt, sed ad speciem nullā incrassatione angulari vel in nonnullis levissima punctiformi tantummodo obsessae sunt; basis folii cellulas longiores angulis obscurius violaceas monstrat. Si ictu levi inter se separantur, anguli hyalini acuti paullum protracti apparent; tota cellula membrana primaria hyalina circumdata apparet, ita ut lineae hyalinae inter cellulas etiam in hoc genere membranam primariam cum impositā cuticulā totum folium ambiente exhibeant, nec pro materia intercellulari haberi possint. Capsula, ut sectione transversali probatur, e quinque stratis compōsita est, sed nonnullis locis latitudine 6 cellulae numerantur. Stratum

extimum cellulis tabulatis hyalinis majoribus irregulariter quadratis conflatur; paries externus crassior, scilicet cuticula aucta; hae cellulae irregulari modo fibris validis fuscis, interdum semicircularibus convexitate introrsus conversis, fulciuntur, quarum fines tamquam puncta discreta fusca in pariete externo conspiciuntur. Strata duo insequentia hyalina sine incrassatione fusca vel incrassatione rarissima, in valvulis siccis praesertim contracta et aqua lente se extendentia: si 6 cellulae in sectione transversali capsulae conspiciuntur, plerumque haec strata ordinem vulgarem non servant, et pro 2 cellulis 3 monstrant. Stratum quartum jam complures fibras fuscas cellularum monstrat; in quinto denique vel intimo cellulae fibris illis notissimis semicircularibus convexitate introrsus conversis depictae apparent.

V. Jungermannia. *Synops. Hepat. p. 73.*

1. Jungermannia exsecta Schmid.

J. caule adscendente, foliis subcomplicatis integerrimis, lobo dorsali parvo dentiformi, ventrali acuto vel bidentato concavo, foliis involucralibus tri-quadrifidis, perianthio terminali oblongo obtuso plicato.

β , *sterilis, granulifera.*

Synops. Hep. p. 77. n. 5. Nees ab Es. Hep. Europ. I. p. 247—252.

Imellem andre Hepaticae samlede Liebmann nogle sterile Grene paa Piantagen Hacienda de Mirador (3000').

Plantae Europeae omnino congrua. Folia cocta et tincta eandem texturam et cellularum structuram quam in planta nostrate monstrant. In membrana primaria cellulae hyalina ubique nucleus violaceus angulis paullum productus, sc. membrana secundaria, sacculum primordiale (ex coctione semper solutum vel in discum parvum coagulatum) ambiens, observatur. Cellulae marginales angulos parietales externos tamquam cornua parva protrudunt, quia membrana primaria ad angulos latior e coctione cum liq. kalico intumuit. In angulis membrana secundaria obscurius violacea est. Capsula e quinque stratis conformatur, quorum extimum cellulas hyalinis tabulatas in parietibus columnas incrassatas fuscas monstrantes habet. Intimi strati cellulae fibras semicirculares convexitate introrsus conversas monstrant; reliqua strata cellularum parietes incrassatos habent.

2. Jungermannia conformis Lindbg. et Gottsche.

J. caule prostrato nudo geniculato-ramoso, foliis semiverticalibus plerumque distantibus rotundo-quadratis apice ad tertiam partem angulo acuto excisis, lobis ovato-lanceolato-apiculatis integerrimis, ventrali majore, perianthio oblongo cylindrico apice conico obtuse quadriplicato, ore laciniato, laciniis dentibus hyalinis incurvis (dissectione demum observandis) armatis, foliis involucralibus conformibus.

Synops. Hepatic. p. 665. n. 11. b.

Liebmann fandt denne Art paa Sukkerplantagen Trapiche de la Concepcion (3000') i Districtet Chuapam i Departementet Oajaca i Nærheden af Zapotekbyen Comaltepec; desuden i Talea (5000') og i Santiago Amatlan (henimod 6000') imellem Totontepec og Trapiche de la Concepcion, i August med Perianthier. (Hb. Liebm. n. 249. 240. 287 e. p.)

Caulis 6-linearis-pollicaris, nigro-fuscus, flexuosus, parte procumbente radicellis multis albidis repens, et basi nonnunquam stolones flagelliferos emittens, parte adscendente plerumque nudus, vel hic inde rarioibus fibrillis affixus, subramosus. Folia remotiuscula, media imprimis caulis principalis saepe imbricata, vel semiverticalia vel caulem basi amplectendo verticalia, $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, rotunda, ovata subquadratave, nonnulla subaequaliter ad tertiam partem bifida, planiuscula, patenti-reflexa vel in parte procumbente caulis sursum aliquantum conniventia, pleraque inaequaliter incisa sinu acuto (rarius obtuso) laciniis acutis, lacinia ventrali majore, margine ventrali rotundata, dorsali rectiuscula et inflexo-complicata lacinia incumbente, ut folia, a ventre visa, integra ovato-lanceolata appareant; interdum basis dorsalis dentem solitarium monstrat. Folia involucralia conformia, erecto-adpressa.

Color flavo-virescens. Textura porosa, ut dicunt, sed folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta elegantem imaginem praebent. Lineae hyalinae medio saepius inter se hiantes monstrant fines cellularum, in quibus figura irregularis violacea margine crenulata lumen cellulæ exhibit, in quo plerumque folliculus primordialis in discum parvum flavum coagulatus videtur in area clariore. Si levi ictu solvuntur cellulæ, conos hyalinos externe prominentes (»spatia intercalaria« auctorum componentes) cum cellularum vicinalium videas. Perianthium 1 lin. longum, cylindricum, apice in conum obtuse quadriplicatum, specie inerme, sed revera laciniatum et dentibus minoribus unicellularibus et majoribus hyalinis 2—5-articulatis incurvis armatum, quod tamen e dissectione demum patet, si apex perianthii inter laminas vitreas in planum expanditur. Reliqua desiderantur; planta mascula hucusque ignota.

Jungermannia incumbens, omnium hucusque descriptarum maxime aequalis, differt foliis profundius incisis, longius apiculatis, involucralibus saepe trifidis, perianthio ovato-

trigono. Aegrius distinguitur a duabus formis, quas cl. Trumpff in Monte Galipano Venezuela in altitudine 6000 pedum inter Cladonias collegit, quarum altera, *Jung. secunda* Hb. Hampe, foliis involucralibus anguloso-denticulatis et perianthii ore laciniis duplicato-dentatis foliisque paulo latioribus differt, altera, *Jung. lateriflora* Hb. Hpe, perianthio breviore et statura paulo robustiore diversa videtur.

Tab. XVII. fg. 1. Pars rami fructiferi $\frac{1}{7}$ aucta. fg. 2. alia fructificatio. fg. 3. pars ramuli a dorso visa. fg. 4. sectio transversalis perianthii. fg. 5. 6. folia involucralia. fg. 7. 8. folia caulina.

3. Jungermannia concreta Gottsche.

J. caule adscendente stricto fere nudo parce ramoso, foliis suboppositis contiguis distantibusve ovatis utrinque tenui limbo connatis integerrimis patentissimis (apicem versus erecto-patentibus) margine decurvis, amphigastriis in flore tantummodo obviis, perianthio (juniore) campanulato plicato, ore truncato denticulato, foliis involucralibus paulo majoribus cum amphigastrio intermedio bilobo, laciniis obtusioribus elongato-lanceolatisve connatis (— in secundo pari florali jam in laciniam singularem accessoriā transeunte, in sequentibus omnino obsoleto —) basi dorsali interdum lobo accessorio dentiformi armatis.

α , *Fendleri*, major, interdum pallide rosea, fructifera. Planta apud Valenciam Venezuelae a Fendler collecta.

β , *Liebmanniana*, minor, sterilis.

Blandt *Jung. conformis*, som Liebmann samlede paa Sukkerplantagen Trapiche de la Concepcion, fandt jeg nogle sterile Grene.

Rami semipollicares-pollicares, cum foliis 1 lin. lati. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellulas 5—6-angulares monstrant, quae angulis prominentibus spatium hyalinum componunt; sacculus primordialis in discum obscuriorem coagulatur; incrassatio in angulis fortior vel postremo parietalis, relictis tamen semper poris ad liberiorem cellularum communicationem.

Tab. XIX. fg. 1. Perianthium junius $\frac{1}{7}$ auctum. fg. 2. folia involucralia connata cum amphigastrio bifido, cuius altera lacinia truncata erat; folium alterum involucrale laciniis bidentata reflexa versus basin dorsalem auctum erat. (Planta Venezuelana). fg. 3. pars caulis plantae Mexicanae a ventre visa, bases foliorum ventrales connatas monstrans. fg. 4. alia pars caulis a dorso visa, conjunctas foliorum bases dorsales monstrans.

4. *Jungermannia subapicalis* Nees ab Es.

J. amphigastriis triangulari-subulatis in caule vetustiori obsoletis, caule procumbente subrepente divaricato-ramoso, foliis ovato-subrotundis integris retusisve aequo distantibus patentibus supra convexis arcte reticulatis, involucralibus binis suboppositis conformibus apice patulis, perianthio terminali, mox autem dorsali dichotomiaeve imposito et tum quidem ex involucro parum prominulo, sed ubi terminale est, oblongo laevi, ore acute plicato.

β, Leiboldiana, foliis involucralibus valde variantibus, saepius cum lacinia dentiformi dorsali, vel folio altero vel utroque palmato-lobato, mox cum amphigastro connatis, mox discretis.

Synops. Hepat. p. 84. n. 18.

Liebmann samlede denne Plante paa Plantagen Mirador, Leibold sandsynligviis ved Zazuapan, og Frederik Müller fandt den voxende iblandt *Jung. catenulata* i Omegnen af Vulkanen Orizaba.

Est quasi forma intermedia inter *Jungermanniam subapicalem*, cuius habitum potissimum refert, et *Jungermanniam Schraderi*, quae involucro plurifido huic similior est. Adsunt tamen in Hb. Neesiano exemplaria Badensia, quae folia involucralia arcte adpressa minora multifide incisa habent, omnino fere, ut haec planta; exemplaria originalia autem, quae diagnosi inserviebant, e Sudetis allata, aequo atque exemplaria e Monte pinifero, folia involucralia subopposita conformia apice patula monstrant. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta angulos leviter incrassatos et poros intermedios habent; spatia trigona pellucida intercalaria auctorum in cellulis, levi ictu inter se solutis, prominentes anguli hyalini ipsius cellulae sunt; sacculus primordialis coctione solvitur aut tamquam discus minimus flavus in cellula restat. Fortuna favente interdum nucleus totus violaceus e cellula ejicitur, qui tabulam hexagonalem angulis fortius tintet format; membrana cellularis secundaria hoc modo a membrana primaria soluta est, quae tamquam cellula dirupta hyalina formam omnino servans remanet. Capsula e tribus vel quaternis stratis componitur, quorum extimum cellulis hyalinis tabulatis duplo majoribus constat, quarum parietes columnis fuscis fulciuntur; stratum intimum fibras semicirculares hyalino-flavas in cellulis monstrat; reliqua strata duo intermedia in valvis siccatis aqua lentius extenduntur, sed incrassationes parietales quoque habent. In sectione transversali invenimus valvulam tria strata monstrantem, cuius pars media 4 strata habebat.

5. *Jungermannia succulenta* *Lehm. et Lindbg.*

J. caule repente stuppaceo-radiculoso ramosiusculo, foliis verticalibus ovato-orbiculatis apice reflexis leviter emarginatis, amphigastriis triangularibus basi caulem amplectentibus apice patentibus, perianthio obovato parvo apice truncato oris margine laevi, capsula sphaerica parva.

Var. γ , *metallica*. Caule adscendente strictiusculo, radiculis fere destituto, foliis erecto-patentibus, amphigastriis majoribus.

γ^* , *laxior*, aquatica, foliis distantibus, caulibus elongatis fluitantibus odore Sphagni.

Synops. Hepat. p. 84. et 668. n. 19.

Liebmann fandt denne Art ved Gruben i »Mina de St. Gertrudis» i Omegnen af Talea (5000') i Departementet Oajaca, i dets østlige District Chinantla ved Lobani (3000') og i Cumbre de San Juan del Estado, i August med fuldkommen Frugt.

Caules adscendentes, flexuosi, plerumque innovationes e caulibus vetustis defossis sub apice provenientes sistentes, fragiles, succulent, pallide virides superne interdum dichotomi, radicellas parcas emittentes. Folia erecto-patentia, oblique cauli adnata, apicem versus in surculis sterilibus ovato-rotunda, versus basin magis quadrato-rotunda margine subrepanda apice emarginata, versus fructificationes undulata; involucralia multo majora, subcomplicata, patentia, margine undulato-sinuata; hyalina, pallide viridia, apice fuscescentia. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta incrassationem angularem monstrant et angulos externe conice prominentes habent; si cellulae solvuntur, circumscriptio earum solito more rotunda vel ovalis, interne polygono (5, 7, 8 vel plerumque sexangulari) violaceo angulis saturatius tincto ornata est. Sacculus primordialis coctione in discum flavum coagulatur, vel in partes majores et minores ovales vel irregulares solvitur. Amphigastria magna, triangularia, altero margine plerumque unidentata, ejusdem texturae ac folia. Perianthium plus minus immersum, obovatum, obtuse tri-quadruplicatum, ore subcontracto aperto labiis interdum margine fusco coloratis lacinulisque 1-3 cellulis compositis sub lente magis augente ($\frac{1}{1}^{00}$) parce denticulatis. Oris configuratio medium tenet inter *Jungermanniam nanam* et *subapicalem* et in perianthio juniore, ubi apex obtuse triplicatus videtur, os mox foramen rotundum limbatum, mox rimam labiis subinflexis crenulato-denticulatis imitatur. Capsula parva, nigra, rotunda; sectione transversali e duobus stratis confectam esse appetet; stratum exterius cellulis duplo majoribus hyalinis tabulatis consistit, quae columnis fuscis angulosis irregulariter distenduntur fulciunturque; stratum interius cellulas longiores fibris semicircularibus introrsus convexis depictas habet. Semina flavo-fusca subgranulata, elateres fibram fuscum latam in tubulo hyalino monstrant. Plantam masculam non vidi.

6. *Jungermannia Orizabensis Gottsche.*

J. caule flexuoso simpliciusculo rarius stolonifero repente, foliis subsemiverticalibus planis suborbiculatis vel quadrato-orbiculatis apice retusis integerrimis, fructu terminali (ad speciem dorsali, innovatione ex apice superveniente), foliis floralibus et involucralibus emarginato-bifidis, perianthio ore laciniato-dentato. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Frederik Müller samlede denne Plante iblandt *Frullania cylindrica* i Districtet Orizaba.

Caules 1— $1\frac{1}{2}$ -pollicares, simplices vel parcis ramis simpliciusculi, fibris suctoriis sparsis vestiti, rarius stolonem unum alterumve foliis minoribus vestitum apiceque interdum nudum edentes, basi attenuati et foliis distantibus praediti. Folia suborbiculata vel quadrato-orbiculata, contigua, rarius subimbricata, caulem oblique semiamplexantia, apice retuso (emarginatove vel rotundo) deflexa; folia ad basin ramorum interdum biloba. Textura vulgaris; incrassatio punctiformis angulorum. Amphigastria nusquam in caule obvia praeterquam ad basin ramorum nec ibi semper; interdum unicum, interdum in tribus foliorum paribus subsequentibus amphigastrium inveni lingulatum, vel lanceolato-subulatum, vel bitti-partitum, laciniis subulatis. Folia floralia profundius emarginata, basi una alterave lacinia angusta longiore praedita; involucralia magis partita, elongata, laciniis angustioribus; perianthium (junius tantummodo visum) ore laciniato-dentatum pauca pistilla, apice jam aperta tamen nondum foecundata, fovebat. Reliqua desunt.

Jungermanniae orbiculari e Nepalia, quod ad foliorum formam attinet, similis.

7. *Jungermannia colorata Lehm. et Lindbg.*

J. caule repente flexuoso subramoso laxe radiculoso flagellifero, foliis arcte imbricatis subverticalibus orbiculatis antrorsum conniventibus, fructu terminali, involucri foliis incisis, perianthio ovato octo-decemplicato, ore contracto hyalino inermi.

Synops. Hepat. p. 86 et 673. n. 23.

Liebmann fandt denne Art paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 8—10,000 Fod og ved Sølvværket Yavesia (6—8000') i Districtet Ixtlan i Departementet Oajaca uden Frugt.

Caespites atro-fusci, apice flavo-fusci, pollicares-sesquipollicares. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta incrassatos angulos monstrant porosque alternantes, qui, cum incrassatio magis in cellulam prominet, longiores sunt et figuramstellularem (radiis truncatis) luminis cellulæ exhibent. Levi ictu cellulæ inter se solvuntur, membrana primaria saepius rumpitur et nucleus totus, qui membranâ secundariâ continetur

et definitur, ejicitur. Membrana primaria hyalino-rosea in angulis paulo obscurior sub microscopio fit, quia in hisce locis quasi conduplicata est. Nucleus incrassatos angulos et a latere visus lora descendantia, poris magnis pro sacculi primordialis brachiis relictis, monstrat.

8. Jungermannia amoena Lindbg. et Gottsche.

J. caule adscendente radiculoso, foliis subverticalibus imbricatis orbiculatis integerim roseo-marginatis, involucralibus conformibus majoribus, perianthio semiexerto obovato apice obtuse 4-plicato roseo ore aperto crenulato, capsula sphaerica.

Synops. Hep. p. 674. n. 35. b. (diagnosis minus bona).

Liebmamn fandt denne Art i Departementet Oajaca ved Talea (5000') med fuldkommen Frugt.

Caules 3 lin. longi, subsimplices, e latere ramulum interdum protrudentes; folia orbiculata, a latere visa, imbricata, subverticalia, versus basin decrescentia. Perianthium obovatum apice truncatum, 4—5 plicis obtusis angulatum, ore contracto apertum, limbo sub lente fortius augente ($\frac{100}{1}$) crenulato. Capsula sphaerica (in perianthio adhuc inclusa) valvulis quatuor ovalibus dehiscens; pedicellus capsulae 2—3 lin. longus. Elateres bispiri, fibra dupli latiore flavo-fusca percorsi; semina flavo-fusca.

Diagnosis in Synopsi Hepaticorum l. c. minus bona; in caespite enim nostro parvo simul *Sphagnoecetis communis* surculi crescebant, qui haud rite cogniti «stolones et ramos gemmiparos trifariam foliatos» in diagnosin intulerunt.

Jungermanniae rotundifoliae minores hucusque cognitae perianthii apicem in mucronem perforatum coarctatum habent, nec os coarctatum apertum, unde cum nulla earum commutari haec potest.

Tab. XVIII. fg. 1. Pars rami fructificantis paullum a latere visa $\frac{1}{1}$ aucta. fg. 2. Pars plantae fertilis a dorso visa. fg. 3. eadem planta a ventre visa. fg. 4. pars rami novelli a dorso visa. fg. 5. sectio transversa perianthii. fg. 6. 7. folia involucralia. fg. 8. folium caulimum. fg. 9. folia ramulorum.

9. Jungermannia linguifolia Gottsche.

J. caule repente stuppeo-radiculoso, radiculis fusco-luteis, apice adscendente pauciramoso parceque stolonifero, foliis imbricatis semiverticalibus oblongo-ovatis integerim concavis apice decurvis, involueri foliis integris erectis apice patulo subrepandis

perianthium basi arcte cingentibus, perianthio immerso subcylindrico apice conico 4-plicato ore angustissimo subrostrato, capsula parva ovali cinnamomea.

Frederik Müller fandt denne Plante i Omegnen af Vulkanen Orizaba.

Caules densissime radicellis fusco-rubellis longissimis sibi irrepentes, ut totus caespes subtus rutilo-stupposus videatur, 1— $1\frac{1}{2}$ pollic. longi, fragiles, rara flagella foliis parvis triquetris, sub quibus tori radicularum oriuntur, vestita, sub perichaetio innovantes vel e latere caulis ex axilla folii ramum promentes. Folia 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, patula, canaliculata, apice decurva, margine dorsali rectiuscula, ventrali rotundiuscula, flavescentia. Textura foliorum qualis in *Jung. Taylori*; folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta angulos incrassatos et lora descendantia, relictis poris pro sacculi primordialis brachiis, monstrant, et si ictu levi inter se solvuntur, in angulis conos externe prominentes habent, qui terni (vel rarissime quaterni) spatium hyalinum in folio componunt, quod auctores «maculas intercalares circum cellulam» nominant. Sacculus primordialis coctione in discum flavum coagulatur. Planta mascula in eodem caespite; perigonia in apice vel in medio ramo interdum iterata vice, plerumque 4 paria basi saccata inveniuntur. Perianthium immersum ut in *Jung. obovata*, sed liberum, vel rarissime in parte ventrali, ubi margines foliorum involucralium convenient, leviter accretum, 1 lin. longum, parte latissima $\frac{5}{12}$ lin. latum; apicem versus in conum quadriplicatum contrahitur; interdum hi sulci longius basin versus descendunt, et saepius sectio transversa perianthii illis sulcis externis respondentes cristas prominentes monstrat, quae interdum tamquam ala interna e duplice cellularum serie mox in unicam transeunte e perianthii pariete prodeunt. Os perianthii contractum, subrostratum ut in *Jung. tera*, cellulis apicis elongatis crenulatum. Calyptra basi 10—13 pistillis abortivis stipata, circum quae interdum pili primordiales bi-3-articulati florales adhuc videntur. Capsula pro planta parva, cinnamomea, ovalis, valvulis ovali-lanceolatis dehiscens; elateres parvi, fibra dupli lata flavo-fusca percursi.

Cum nulla, ut videtur, commutanda; proxima est *Jung. Junghuhniana*, quae tamen multo minor; a *Liochlaena lanceolata* perianthii conditione omnino diversa est.

Tab. XIX. fig. 1. Apex stirpis fructiferae $\frac{1}{1}$ auctae. fig. 2. Pars caulis sterilis a dorso visa. fig. 3. Perianthium $\frac{1}{1}$ auctum. fig. 4. Ejus sectio transversalis. fig. 5. Capsula.

10. *Jungermannia nuda* Lindbg. et Gottsche.

J. amphigastriis late subulatis (in caule vetustiore nullis), caule repente flexuoso, foliis remotiusculis rotundo-oblongis flacidulis explanatis subadscendentibus laxius reticu-

latis, involucralibus multo majoribus patulis, perianthio terminali longe exerto clavato-piriformi ore contracto mucronulato.

Synops. Hep. p. 668. n. 18. b.

Liebmann fandt denne Plante i Cuesta de San Juan del Estado i Mai med Perianthier.

Caulis repens, flexuosus, fibrillis longioribus terrae affixus, tenuis, simplex vel innovando parce ramosus, sex lineas vix excedens. Folia inferiora et ramulorum dissita, minora, superiora approximata, rotunda vel oblonga, rarius ovata, integerrima, semiverticalia, patentia, flaccidula; longitudo foliorum variat a $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{3}$ lineae partem eorumque latitudo aequalis vel paullo minor est. Textura laxiuscula, retis maculae majusculae. Amphigastria in caulis fructiferi apice et in innovationibus solummodo obvia, lanceolato-subulata. Folia involucralia multo majora, subrepanda, initio perianthium basi obvallantia, postremo ab illo distantia. Perianthium junius piriforme apice depresso mucronulatum, adultum elongatum, basi attenuatum et post fructus egressum ore dirupto subquadrifidum, in ramis ramulisve terminale vel ob supervenientem innovationem laterale vel dorsale.

Jungermannia subapicalis est major et sterilis quoque differt foliis magis conniventibus densioribus rigidioribus amphigastriisque majoribus saepius obviis.

Tab. XVIII. fg. 1. pars plantae innovantis cum perianthio juniore apice depresso $\frac{17}{1}$ aucta. fg. 2. perianthium adiutum clavatum. fg. 3. pars plantae sterilis a dorso visa. fg. 4. folia involucralia.

11. *Jungermania callithrix* Lindbg. et Gottsche.

J. caule radiculis densis fasciculatis purpureis longissimis repente subsimplici (rarius flagellifero), foliis semiverticalibus contiguis imbricatisve ovato-orbiculatis integerrimis, perianthio parvo cylindrico immerso, ore conico contracto obtuse 3—4-plicato, foliis involucralibus majoribus cum perianthii basi connatis.

α , forma laxior, foliis contiguis.

β , forma confertior, foliis imbricatis.

Synops. Hepat. p. 673. n. 26. b.

Liebmann fandt denne Art omkring San Antonio de Huatusco i en Høide af 4500' i Departementet Vera Cruz iblandt andre Hepaticae i Februar med Perianthier, men ikkun faa Planter og i en daarlig Tilstand.

Caules a semipollicaribus ad pollicares arctissime radiculis longissimis et densis amoene

purpureis saepe fasciculatis, ut flagella mentiantur, sibi et aliis Hepaticis irrepunt; flagella rara adsunt ut anxius demum inquirenti occurant. Folia semiverticalia in nonnullis stirpibus repentinibus plana, in adscendentibus erecto-patentia, folia orbicularia integerrima, hic illuc levissime repanda, margine dorsali saepe leviter inflexa, ut sacculum prope basin efficiant. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta angularem incrassationem et, si levi ictu cellulae separantur, conos externe prominentes in ipsis angulis monstrant. Perianthium basi cum foliis involucralibus connatum in plantis minoribus fere totum immersum est, sectione transversa sinibus tribus impressis obtuse subtriquetrum, ore contractum cellulis prominentibus, si $\frac{100}{1}$ augetur, crenulatum.

In Synopsi nostra Hepaticarum (p. 674) propter radiculos longas rubras comparatur cum *Jung. Junghuhniana* et aliis, a quibus tamen longius recedit; a *Jung. hyalina* Mexicana, quae ipsa quoque radicellas purpureas habet, perianthio basi tantum connato minusque plicato differt.

Tab. XVII. fig. 1. Pars rami fructiferi $\frac{17}{1}$ aucta. fig. 2. 3. facies prona et posterior perianthii abscissi. fig. 4. sectio transversa perianthii. fig. 5. folium involucrale. fig. 6. 7. folia caulina. fig. 8. pars rami formae laxioris a.

12. *Jungermannia hyalina* Lyell.

J. caule repente valde radiculoso (radiculis rubicundis) infra apicem ramoso et denique dichotomo-fastigiato adscendente, foliis semiverticalibus subrotundis undatusque immarginatis divergenti-adscendentibus, ramorum involucralibusque conformibus, his perianthio adpressis basique connatis, perianthio parum exerto ovato acuto apice plicato ore subrotundo valde contracto, capsula globosa.

Synops. Hepat. p. 92. n. 37. Nees ab Es. Hep. Europ. I. p. 322—326.

α , major, crassior, foliis latioribus subimbricatis vel patulis magis undulatis.

β , minor, foliis magis obliquis minus undulatis pallidioribus.

Frederik Müller fandt denne Plante i Omegnen af Orizaba, paa nogen Jord, med Perianthier; Var. β voxende paa Trækul.

Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta elegantem praebent imaginem. Linea hyalina cellulas singulas separat; incrassatio punctiformis in angulis tantum appetit, sed si levi ictu cellulae inter se solvuntur, cellula in angulis embolum prominentem monstrat lorumque violaceum descendens; a latere visa cellula inter angulos hyalinam membranam primariam monstrat. Saccus primordialis ex coctione coagulatur in discum irregularis, linea facile praetervis circumscripsum. Cellulae marginales

crassiores, transversae, plerumque quadratae, in parietibus lateralibus in apiculum vel embolum terminantur, ita ut 4 embolos prominentes habeant. Omnia autem cuticula folii obducuntur. Capsula e duobus stratis tantummodo composita est. Stratum externum cellulis majoribus hyalinis, columnis parietalibus fuscis irregulariter fultis, constat; stratum internum flavo-fuscum cellulas fibras semicirculari subfuscā percursas monstrat. Semina flavo-fusca, laevia. Elateres spiram duplicem latiorem flavo-fuscum in tubulo hyalino monstrant.

13. *Jungermannia congesta* Lehm. et Lindbg.

J. caule prostrato apice adscendente capitato repente subbisido flagellifero, flagellis validis subterraneis, foliis subverticalibus imbricatis oblongis obtusis apice truncatis repandisve.

α , *laxa*, amphigastriata, foliis oblongis saepius (praesertim superioribus) truncato-repandis. Fructifera. Species Africana e silvis Outeniquensis a Krauss reportata.

β , *subsimplex*, foliis densis brevioribus subintegerrimis, sterilis, exampigastriata. Species Capensis ab Ecklon collecta.

Jung. *congesta* Synops. Hep. p. 88. n. 27.

γ , *conferta*, apice furcata, foliis repando-angulatis; in planta sterili amphigastria nulla. Species Mexicana a Liebmanno collecta. n. 439.

Liebmann samlede Varieteten γ iblandt *Aneura palmata* i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca uden Frugt.

Has plantas (n. 439) ad *Jungermanniam congestam* referre diutius dubitavi, sed cum eas in enumeratione Hepaticarum Mexicanarum, etsi steriles sunt, silentio opprimere non possim, quod in Synopsi nostra licebat, auctoritatem beati Lindenbergii secutus sum.

Caules inter *Aneuram palmatam* arctissime repentes, 2—3-lineares, cum foliis 1 lineam lati. Folia majora $\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{3}{5}$ lin. lata, ovalia, erecto-patula, concaviuscula, arctissime imbricata, margine subrepanda, apicalia angulato-repanda vel truncata vel imo (rarius) emarginata, basalia minora apice ovali-rotunda; omnia submarginata. Caulis apex adscendens, arrhizus, color foliorum flavo-virescens. Textura fere qualis in *Jung. hyalina*. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta ostendunt cellulas majores angulis incrassationem punctiformem — sc. embolum subprominentem — habentes; in mediis basalibus maculam notissimam obscuriorem violaceam videoas, dum cellulae anterioris partis folii fere aequaliter tinctae sunt. Sacculus primordialis coctione solvitur. Cellulae marginales intensius violaceae marginem latum externum hyalinum monstrant, qui e cuticula folii oritur; eandem cuticulam observare licet in dorso folii conduplicati.

14. *Jungermannia porphyroleuca* Nees ab Es.

J. amphigastriis prope nullis, caule radiculoso serpentino alternatim ramoso rigido, foliis semiverticalibus patentibus vel patulo-adscendentibus planiusculis rariusve concavis ovali-subquadratis integerrimis, inferioribus lunatim, superioribus profunde obtuseque emarginatis bi-tridentatis laciinis inaequalibus obtusiusculis, involucralibus basi cuneiformibus convolutis et plerumque connatis apice patulis planis palmato-trifidis laciinis subbifidis, inferiore magis interiore profundioreque amphigastrium simulante, amphigastriis in quibusdam obviis parvis linearisubulatis bi-trifidisve, perianthio ovali superne plicato ore denticulato.

Synops. Hepat. p. 109. n. 74. Nees ab Es. Hep. Eur. II. p. 78—95.

Liebmann fandt Hanplanten af denne Art paa Pico de Orizaba i en Høide af 12000 Fod paa raadtent Træ med fuldkommen uddannede Antheridier i September, og Frederik Müller samlede den voxende iblandt *Jungerm. catenulata* i Omegnen af Vulkanen Orizaba.

Folia oblique patentia recurva, superiora adscendentia, intima in dentibus globulifera, eandem texturam insignem quam exemplaria Europaea, monstrant. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta in cellulis areolas flavescentes irregulares granulosas monstrant, modo totam cellulam explentes, modo minores; hae areolae granulosae sistunt saccum primordiale plus minus contractum et coctione mutatum. Circum hanc areolam videre licet membranam hyalino-roseam vel subviolaceam, angulis semicirculo umbroso repandam. Cellula tota a vicinis linea hyalina separatur, quae certissimis finibus unamquamque cellulam ab adjacentibus distinguit. Haec linea hyalina sistit membranam primariam et cellulas inter se separatas circumdat. Membrana secundaria processu artificiali subviolacea facta est, et ubi ad speciem repanda apparet, pars umbrosa circuli quadrantem aemulans incrassationem hujus membranae sistit, quam in paginis praecedentibus embolum prominentem nominavimus. In tribus cellulis adjacentibus hac incrassatione circulus fere formatur, quem tamen linea hyalina dilucide in tres partes discindit; vel si quatuor cellulæ adjacentes coeunt, quadrangulum interstitium videoas, sed linea hyalinâ aequo modo in partes quatuor disjunctum. Hic embolus prominens conicus est; itaque cellula in quovis angulo declivis fit, quod bene conspicitur in margine complicato, ubi medium cellulæ elevatum, margines declives, omnia autem cuticulâ folii vestita videmus. Embolus conicus basi magis tinctus in apicem hyalinum (sc. membranâ primaria obductum) transit; inde fit, ut linearum hyalinorum decussationis punctum minus dilucide videri possit, quam ubi partes adjacentes colore obscuriore violaceo differentiam majorem praebent. Inter embolos angulares in medio pariete brachia parva sacculi primordialis in cellulis altera ab altera solutis tamquam gibbositates conspiciuntur, dum cellula soluta ipsa imaginem substellatam praebet. Omnia, quae modo de structura plantae Mexicanæ diximus, in planta Europaea simili modo observantur; ill. tamen Neesius haec alio modo explicavit (Nees ab Es. Hep. Europ. II. p. 87).

Capsula componitur 4 stratis cellularum, fibris vel columnis fuscis parietalibus irregulariter incrassatarum, unde omnes cellulae flavescent. Strati extimi cellulae duplo maiores et externe cuticulâ obductae sunt.

15. *Jungermannia incisa Schrad.*

J. examphigastriata, caule arcte repente aut adscendente radiculoso latere apiceve diviso compresso-dilatato, foliis semiverticalibus complicatis plicatisve subquadratis dense inaequaliter reticulatis mollibus bi-sexfidis, laciniis variis acutis magis minusve spinulosodentatis, involucralibus conformibus magis plicatis dentatisque liberis, perianthio terminali brevi ovato plicato ore denticulato.

α , *compactior*, arctissime repens, dense contexta, ramis abbreviatis, foliis arcte imbricatis latioribus magis plicatis et spinulosis.

β , *granulifera*, dentibus foliorum propaguliferis saepe valde inaequalibus angulosis penitusve derasis.

Synops. Hep. p. 118. n. 89. Nees ab Es. Hep. Eur. II. p. 136—142.

Imellem andre Hepaticae samlede Liebmann denne Art, dog kun i faa Brudstykker, paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') uden Fructification.

Folia cum kali caustici liquore cocta et zinco bijodato tincta eandem texturam et cellularum structuram monstrant, quam exemplaria Europaea praebent. Cellularum incrassatio punctiformis angularis magis violacea, quae a latere visa lorum descendens in angulo prodit et, si cellulae inter se separantur anguli prominentiam sive embolum sistit. Cellulae disci folii sunt cellulae tabulatae biconvexae plerumque sexangulares, angulis prominentibus; saccus primordialis coctione solvit vel in discum levem granulosum defiguratur. Capsula e quatuor stratis consistit, quae omnia cellulas columnis fuscis crassis irregulariter fultas monstrant. Sectione transversali cellulae strati extimi haud multo maiores quam reliquorum stratorum apparent. Semina granulosa, diametro majora quam latitudo elaterum. Elateres monstrant spiram duplificem fuscam in tubulo hyalino, qui eundem colorem roseo-violaceum accipere potest, si pari modo ac folia coquuntur et tinguntur. Tubulum hyalinum e membrana primaria tantum confectum credimus, vel levissimo strato membranae secundariae cunctum, nisi omnem secundariae membranae massam in spiram duplificem consumtam esse malis.

16. *Jungermannia minuta Crantz.*

J. amphigastriis nullis, foliis complicato-concavis pectinato-patulis ab $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{2}$ bifidis, lobis subaequalibus ovatis acutis obtusisve integerrimis (gemmaferis eroso-dentatis), involucro intimo trifido, perianthio ovali-oblongo (subcylindrico) ore plicato, caule arrhizo.

2, *protracta*, caule plerumque laxius ramoso, ramis apice nonnihil latioribus.

3, *gemma para*, ramis magis minusve corniculiformibus adscendentibus, foliis in plerisque imbricatis bifidis bilobisve, laciinis magis minusve eroso-denticulatis granulisve in margine efflorescentibus praeditis.

Synops. Hep. p. 120. n. 93. Nees ab Es. Hep. Europ. I. p. 254—262.

Liebmamn fandt denne Art iblandt Mosser, voxende paa Plantagen Hacienda de Mirador, uden Frugt i August; Planterne ligne aldeles de europæiske Individer af Arten.

Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta in cellulis hyalino-marginatis maculam fusco-violaceam ostendunt, quae cavum vel lumen cellulae sistit, in quo versus basin praecipue sacculum primordiale brachia flavescentia plerumque quatuor edentem bene distinguere possis; in cellulis partis superioris folii plerumque saccus in discum parvum coagulatus est. Ambit hanc cavitatem obscuriorem zona clarior violacea latior — membrana secundaria —, quam denique membrana primaria hyalina latius circumvestit, quod præsertim in cellulis ictu solutis et paullum depressis optime observatur. Perianthii cellulae eandem structuram et triangula vel spatia quadrangula interstitia hyalina ostendunt, quae tamen in cellulis inter se separatis in angulos hyalinos solvuntur, quales jam saepius descripsimus. — Capsulam videre nobis non contigit.

17. *Jungermannia intricata Lindbg. et Gottsche.*

J. caule procumbente flexuoso arrhizo, foliis complicato-concavis semiamplexicaulis pectinato-patulis ovato-quadratis apice exsecto-bilobis angulo acuto, lobis subaequalibus ovato-lanceolatis, foliis involucri bilobis majoribus conformibus, perianthio cylindrico ore truncato plicato.

Synops. Hep. p. 679. n. 93. b.

Liebmamn samlede denne Plante i Districtet Ixtlan i Departementet Oajaca ved Bjergværkstedet Yavesia i en Høide af 7—8000' iblandt *Jung. colorata*, i Juni.

Caules pollicares et ultra, flexuosi, nigri, et cum *Jung. coloratae* caulis intertexti sunt; folia inferiora plus minusve detrita inveniuntur; color foliorum fusco-ater, summorum novellorum viridi-flavus. Textura foliorum porosa, ut dicunt auctores, quia non limites

cellularum, sed lumen coloratum earum parietibus incrassatis pellucidis circumscriptum videas. In foliis cum liquore kali caustici coctis et zinco bijodato tinctis evidenter cellulae limitibus tenuibus in linea alba decurrentibus finiuntur, et si inter se levi ictu solvuntur, margo hyalinus (id est membrana primaria) circumdat nucleum violaceum quadrangulum sexangularemve, id quod in folio haud cocto cellulae speciem habet. Capsula, elateres et semina nihil, quod notatu dignum sit, monstrant. Planta mascula ignota.

Differt a *Jung. divaricata* statura majore, colore fusco-nigro et involuci foliis; a *Jung. Starekii* iisdem notis, a *Jungerm. minuta*, cujus varietatem minorem putares, caule flexuoso et involucro. A? *Sarcoscypho aurito* differt foliis brevioribus magis erectis, praesertim vero fructificatione, si revera *Jung. aurita* L. L. *Sarcoscyphi* generis est.

Tab. XVIII. fg. 1. Perianthium cum foliis involucralibus $\frac{3}{4}$ auctum. fg. 2. Pars caulis a dorso et fg. 3. pars caulis a ventre visa $\frac{3}{4}$ aucta.

18. Jungermannia parca Gottsche.

J. caule repente flexuoso parce ramoso, foliis distantibus patulis oblique cauli adnatis ovato-quadratis concavis bifidis integerrimis laciniis ovato-lanceolatis divaricatis vel dorsali apice incurvis, sinu profundo ($\frac{1}{3}$ folii longitudinem superante) obtuso, amphigastriis distantibus erecto-patentibus ovatis bifidis, fructu . . .

Liebmam samlede ikkun faa Planter af denne Art uden Frugt iblandt andre Hepaticae paa Plantagen Hacienda de Mirador i August 1841.

Plantae flaccidae, inter alias Hepaticas repentes, semipollicares, rarae. Folia $\frac{1}{5}$ lin. lata, ad sinum $\frac{1}{6}$ lin., ad laciniarum apicem $\frac{1}{4}$ lin. longa sunt; sinus $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ lin. profundus apice $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ lin. latus est. Amphigastria fere $\frac{1}{6}$ lin. longa, fere $\frac{1}{10}$ lin. lata. Textura regularis; folia cocta et tincta incrassationes non monstrabant, sed grumos chlorophylli violaceos. Reliqua desiderantur.

Tab. XIX. fg. 1. Pars caulis a ventre visa $\frac{3}{4}$ aucta. fg. 2. Pars caulis a dorso visa $\frac{1}{7}$ aucta. fg. 3. folium trifidum $\frac{3}{4}$ auctum.

19. Jungermannia catenulata Hüben.

J. amphigastriis nullis, trunco fructifero abbreviato, caule rigidulo ramoso contexto ramis sterilibus flexuosis adscendentibus, foliis diametro caulis vix latioribus imbricatis semiverticalibus adscendentibus concavis crassiusculis usque ad medium fere bifidis sinu obtusiusculo laciniis incurvis, involuci foliis adpressis plurifariis bi-trifidis subintegerrimis,

perianthio subchartaceo cylindrico sursum complicato ore ciliolato, capsula ovali cinnamonomea.

Synops. Hep. p. 138. n. 121. Nees ab Es. Hep. Europ. II. p. 248—251.

a, foliis involucralibus dentatis.

b, foliis involucralibus integerrimis.

Denne Art fandt Frederik Müller i stor Mængde voxende paa raadden Træbark i Omegnen af Vulkanen Orizaba med Frugt; enkelte Exemplarer med Perianthier samlede Liebmann blandt andre Hepaticae paa Plantagen Hacienda de Mirador. Den ligner aldeles Planterne fra Vogeserne i Hb. Nees., men er lidet finere.

Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellularum speciosam edunt imaginem; lumen cellulæ, in quo grumuli nonnulli sacci primordialis plerumque inveniuntur, obscurius coloratum est et bene a diversis zonis membranae secundariae distinguitur; plerumque autem una tantummodo zona violacea crassa conspicitur. Restat usque ad fines cellulæ altera zona roseo-hyalina, quae etiam membranae secundariae adnumeranda est, dum membrana primaria tenerrima lineam hyalinam efficit. In cellulæ solutis angulos prominentes declives interdum subalatos video, quod tamen magis in cellulæ perianthii observatur. Cellulæ pedicelli capsulae nondum evolutæ amylo omnino refertæ membrana primaria hyalina tantummodo(?) circumdantur, et bene ad reliquarum cellularum indolem comparandam inservire possunt. Capsula e duobus stratis componitur; cellulæ exterioris strati hyalinae cum incrassationibus alterius parietis interdum seriem submoniliformem fingere possunt; alterum stratum interius cellulæ constat, fibris semicircularibus (medio fere hyalinis cruribusque fuscellis) depictis. Elateres breviores, fere $\frac{1}{18}$ lin. longi, monstrant duplēm fibram spiralem fuscām validam in tubulo hyalino, qui etiam colorem violaceum processu notissimo induit. Semina fusco-flava, diametro latiora quam elateres, subgranulosa.

20. Jungermannia bicuspidata Linn.

J. amphigastriis nullis, ramo florifero brevi aut longiusculo, caule procumbente plerumque laxiusculo, ramis sterilibus procumbentibus repentinibusque aut adscendentibus subarrhizis, foliis diametro caulis plerumque latioribus distantibus aut imbricatis semiverticilibus ovato-orbiculatis magis minusve concavis adscendentibusque usque ad medium fere bifidis sinu obtuso laciniis acutis magis minusve conniventibus, foliis involucralibus plurifariis apice plerumque patulis bi-quinquefidis repandis serrulatisve laciniis lanceolatis, perianthio tenui linearī apicem versus complicato-triangulari ore denticulato, capsula oblonga rufo-fusca.

Synops. Hepatic. p. 138. n. 122. Nees ab Es. Hep. Eur. II. p. 251—277.

Liebmann fandt denne Plante paa Træstammer omkring San Antonio de Huatusco (4500') i Marts med Perianthier. (Hb. Liebm. n. 270).

Foliorum textura et cellularum structura eadem quae in planta Europaea. Folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta egregiam imaginem nobis praebent, ut melius cellularum constructionem cognoscamus, quae haud congruenter ab illustr. Neesio l. c. p. 263 describuntur. Apices foliorum una serie cellularum, mox in series binas abeunte, conformantur. In his lumen cellulæ ovatum apice et basi paullum repando-contractum et in eo sacculus primordialis grumulis plus minus repletus paullumque contractus observari potest. Zona latior ovata violacea parietem cellulæ sistit, sed in quatuor angulis videoas embolos depressoſ apice hyalinos leviter curvatos et argulos cornutos cellulæ superioris et inferioris contiguos, dum geniculum intermedium spatium lineare monstrat. Si cellulæ disci folii levi ictu solvuntur, quadrangularem formam propter angulorum embolum monstrant, et interdum paries lateralis subalatus appetet; sed microscopio superficiem superiorem ab inferiore linea diversam esse facile videoas. Illi emboli angulares interdum applanati et paries lateralis in alam paullum protractus cellulis adjacentibus ita substernuntur, ut hoc modo contignatio cellularum inter se fortior fiat. Omnia autem folia cuticulâ obducta sunt. Si lentibus $\frac{400}{1}$ augmentibus (Plösselii n. 5. 6. 7, et oculari n. 1) cocti folii discum contemplor, unamquamque cellulam margine hyalino circumscriptam et hiatu linearis ab adjacentibus omnibus separatam video; anguli declivi hyalini convenient, ubi interstitium trigonum auctorum quaeras, sed hiatus linearis etiam hunc locum in tres partes dissecat. Interdum autem, ut supra dixi, trigonum non appetet, quia embolus unus cellulis binis reliquis substratus est. Materiem intercellularem, quam cl. Schacht etiam in novissimis scriptis defendit, non vidi, vel potius materiam hyalinam, quam semper in cellularum marginalium pariete externo deprehendimus, pro cuticulâ folium ambiente habeo; attamen philosophi botanici videant, quo modo rixam de materia intercellulari solvant.

Capsula e duobus stratis composita est, quae insectione transversali cellulas quadratas fere aequali magnitudine monstrant. Stratum interius cellulas fibris sic dictis semicircularris incrassatas monstrat; fibrae autem pontis imaginem praebent, quia utrinque incrassatae sunt et tricorni figuram edunt, dum in medio arcu angustiores sunt. Stratum externum ostendit cellulas hyalinas, altero pariete tantum incrassatione undulata fusca submoniliformi ornatas, vel si uterque paries incrassationes monstrat, alter tamen fortior est et obscuriorum colorem habet. Hae cellulæ strati externi autem hoc modo conjunguntur, ut paries incrassatus alterius cellulæ alteri parieti incrassato adjaceat; ita in cellularum serie binos parietes incrassatos alternantes videoas cum binis parietibus haud incrassatis. Connubium inter parietes incrassatos interdum tam arctum est, ut si valvulae externam faciem contem-

plaris cellulas duplo maiores medio columnâ cochleatâ fuscâ percursas videre te credas. Elateres longitudine variantes; longissimi $\frac{1}{6}$ lin. explet; interdum furcati, duplucem fibram fuscam in tubulo hyalino monstrant, fere latitudinis dimidiae atque diametru sporarum. Semina fusco-flava, subgranulosa, $\frac{1}{50}$ millim. diametro lata.

21. *Jungermannia crassifolia* Lindbg. et Gottsche.

J. caule arcte repente flexuoso, foliis distantibus subhorizontalibus planis basi lata sessilibus ad $\frac{1}{3}$ bifidis sinu obtuso laciniis subconniventibus, fructu in ramulo brevi e caulis ventre oriente terminali, foliis involucralibus bipartitis margine externo unidentatis, perianthio oblongo triquetro ore ciliato.

Synops. Hep. p. 685. n. 124. b.

?Jung. sandvicensis Mont. Synops. Hep. p. 142. n. 125.

Liebmann fandt denne Art i de fugtige Bjergskove omkring S. Pedro Tepinapa (2000—2500') i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca, iblandt andre Hepaticae i Juni med Perianthier.

Caulis fibrillis multis arcte repens et stolonibus crassiusculis radicans, flexuosus, ramosus; rami apice attenuati vel procumbentes et apice radicantes vel erectiusculi. Folia remotiuscula, rarius contigua, fere horizontalia et basi dorsali decurrentia, plana, oblique rotundo-quadrata, integerrima, ad tertiam partem bifida, margine dorsali magis minusve arcuata, ventrali recta vel curviuscula, sinu obtuso semilunari, laciniis acutis subconniventibus. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tineta nullam monstrant in crassationem in angulis secundariam, sed membrana primaria crassior est, et in angulis in cornua acuminata, ut ita dicam, abit, quod in cellulis marginalibus optime videri potest. Fructus in ramulo brevissimo ventrali terminalis. Folia involucralia ovata, perianthii basi adpressa, bipartita; lacinia lanceolatae acutae basi extrorsum unidentatae. Perianthium pro planta magnum, $1\frac{1}{2}$ lin. longum, oblongum, apice trigonum, ore ciliatum.

Differt a *Jung. connivente*, maxime affini, foliis magis quadratis et involucro, a *Jung. pachyrrhiza* amphigastriorum defectu, foliis non ovatis sed quadrato-orbiculatis crassis decurrentibus sinu obtuso incisis. *Jungermanniae Sandvicensis* Mont. exemplaria originalia non possideo, sed ex imagine a Montagneo data nostrae proxima est, si non eadem. Provenit enim nostra etiam in tota India occidentali, ut videtur, cum exemplaria e Guadalupe, Porto-rico, Jamaica et ex Trinitatis insula mihi praesto sint.

52. *Jungermannia curvifolia* *Dickson.*

J. amphigastriis nullis, ramo fructifero brevi, caule ramisque sterilibus per intervalla repentinibus flexuosis, foliis patulo-imbricatis adscendentibus subverticalibus orbiculato-subtransversalibus basi ventrali inflatis lunatim bifidis laciniis longis linearis-angustis inflexis, involucri foliis imbricatis erectis oblongis bi-trifidis serratis, perianthio angusto plicato-trianguli ore denticulato, capsula ovali.

β. Baueri, laxius ramosa, foliis paullo minoribus magis patulis basique ventrali inflatis obscurioribus, superioribus saepe rufescens, dentibus angustioribus, saepe etiam longioribus.

Synops. Hep. p. 142. n. 126. Nees ab Es. Hep. Europ. II. p. 277—282.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Vera Cruz imellem Totutla og Huatusco ved dos Puentes (4000') i August med Perianthier; Frederik Müller samlede den i Omegnen af Vulkanen Orizaba; i Bjergskove i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca ved Chinantek-Landsbyen Teotalcingo i omrent 5000' Høide blev den funden af Liebmann i Juni.

Exemplaria Liebmanni perianthium ore dentatum sed folia involucralia subintegerrima habent, qualia etiam in speciminibus Europaeis in Silva nigra ab illustr. Braun collectis Herbarii Neesiani inveniuntur; exemplaria Orizabensis perianthium et folia involucralia denticulis minoribus instructa monstrant. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta areolas albo-marginatas monstrant; ubi cellulae conjunguntur, areolae angulis convexiusculis sub prominulis coarctantur, ita ut cellulae non eandem altitudinem ubique habeant, sed angulorum declivitatem hoc loco minus altae videantur. Maximi momenti autem sunt cellulae majores caulis, quae interdum 6 zonas plus minus violaceas monstrant, quarum basis subalata in cornua angularia producitur. Lumen harum cellularum minus est et obscurius violaceum tingitur, saccus primordialis omnino solitus vel pauca residua ejus tantummodo in cavitate cellulae natant. Cellulae membrana secundaria crassa, complures zonas monstrans, praesertim a latere visa; circumdatur a membrana hyalina primaria, altero latere interdum in alam hyalinam latiorem abeunte. Folia axillaria non bifida, sed cordato-lanceolata.

Capsula e duobus stratis composita; exterius cellulis tabulatis hyalinis majoribus constat, quae processu noto subviolaceae flunt, et hinc inde parietes alternatim incrassatos fuscos submoniliformes monstrant; stratum interius flavescens fibris semicircularibus depictum est. Elateres longitudine variant (longiores $\frac{1}{15}$ lin. longi) et in tubo hyalino (vel hyalino-violaceo, si tinctus est) duplum fibram spiralem validam monstrant. Semina diametro paullo latiora quam elateres, fusca, subgranulosa.

23. Jungermannia subtilis Lindbg. et Gottsche.

J. caule tenerrimo flaccido adscendente nudiusculo subramoso, foliis distantibus erecto-patentibus quadratis ad basin fere bifidis lobis lanceolatis basi uni- (bi-) dentatis, fructu in ramulis lateralibus, perianthio , foliis involucralibus duplicato-serrato-dentatis, foliis perigonialibus caulinis conformibus unum antheridium in axilla continentibus.

Synops. Hep. p. 685. n. 129. b.

Liebmann fandt denne Plante med ♂- og ♀-Blomster i Juni i de dybe Urskove, som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec, og paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 12000 Fod.

Caulis filiformis, pollicaris et ultra, adscendens, flacidus, pauciramosus, radiculis fere destitutus. Folia distantia, erecto-patentia, subcomplicata, longe ultra medium biloba, lobis subrepandis vel subintegerrimis, versus basin uni-bidentatis, viridia apice hyalina; maculae porosae, ut dicunt, seriatim dispositae. Folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta cancellos albos monstrant media linea tenuissima divisos, id est, membranam primariam cellulæ hyalinam externam; sequitur nucleus violaceus cum disco flavescente minore in medio; discus flavesiens est saccus primordialis coctione coagulatus; nucleus violaceus sistit incrassationem cellulæ cavum vel lumen finientem. Radiculae subnullae. Inflorescentia feminea in ramis brevibus lateralibus capitatis, foliis floralibus et perichaetalibus majoribus, lobis cordato-lanceolatis marginibus duplicato-serrato-dentatis, apice dente elongato spiniferis. Pistilla pauca. Ulteriora non visa.

A *Jung. Turneri*, cui proxima, statura longiore, foliis magis distantibus et lobis paucidentatis, a *Jung. dentata* iisdem characteribus differt; *Jung. tenuissima*, omnium maxime affinis, est brevior, magis ramosa et fibrillis multis longis radicans, foliis quoque instructa paullo brevioribus plerisque integerrimis et textura laxioribus.

Tab. XVIII. fg. 1. Capitulum floriferum ($\frac{150}{1}$) auctum. fg. 2. 3. folia involucralia. fg. 4. folium caulinum ramuli fructiferi. fg. 5. pars caulis a dorso visa.

24. Jungermannia setacea Weber.

J. foliis amphigastriisque conformibus profunde bi-trifidis tripartitisve incurvis, laciniis subulatis e cellularum serie subduplici, ramo fructifero abbreviato, perianthii ore ciliato, radice flagellari.

α caule subsimpliciter pinnatim ramoso furcatove.

Synops. Hepat. p. 144 et 686 n. 131. Nees ab Es. Hep. Eur. II. p. 296—301.

Liebmann samlede denne Plante iblandt *Aneura palmata* i de fugtige skyggefylde Skove ved San Pedro Tepinapa (2000—2500') i Districtet Chinantla i Departem. Oajaca.

De samlede Exemplarer falde imellem α et β *tamariscina*, men ligne aldeles de europæiske Former.

25. *Jungermannia trichophylla* Linn.

J. caule flaccidulo ramoso, foliis amphigastriisque conformibus ad basin usque triquadripartitis, laciniis setaceis stricte patulis e cellularum serie simplici, ramo fructifero longusculo, perianthio subcylindrico, ore contracto dentato.

Synops. Hep. p. 145. n. 132. Nees ab Es. Hep. Europ. II. p. 301—305.

β . *Americana*, laxior, foliis bi-tripartitis.

Liebmann samlede denne Plante paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') voxende sammen med *Lophocolea Martiana* og *Calypogeia Peruviana*, i Marts med enkelte Perianthier.

Habitu laxiore primo obtutu paullum aliena videtur, sed praeter folia bipartita, quorum laciniae setaceae e simplici serie quinque cellularum constant, foliis tripartitis admixta differre non videtur. Perianthium subcylindricum, ore ciliatum, aequa ac folia involucralia formis Europaeis simillima. Folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta articulos pariete valde incrassatos monstrant, cum lumen cellulae fere dimidium tantum totius latitudinis expletat. Saccus primordialis, in his articulis ebrachiatus, tubulum clausum in parte superiore et inferiore rotundatum sistit, interdum materiam grumosam continentem. Membrana secundaria hunc saccum includens interdum zonas complures ostendit, quarum intima obscurius tincta est. Margo hyalinus cellulae sistit membranam primariam, in qua extus plerumque cuticulae folii particulas hyalinas adhaerentes videas. Cuticula folii praeterea optime in ipsis articulis observari potest. Inter cellulas perianthii elongatas quadrangulares linea hyalina latior membranam primariam sistit, et in cellulis solutis angulus prominens productus hyalinus conspici potest. Membrana secundaria stratum violaceum est, quod in cellulis dentium basalibus angulum cornutum intra membranam primariam monstrat. Ubi cellulae tegmen cum parietibus lateralibus conjungitur, stria violacea obscurior est, nec tamen in angulis lora descendentia obscuriora videntur.

VI. *Sphagnoecetis* N. ab E. *Synops. Hep.* p. 148. et p. 688.

1. *Sphagnoecetis variabilis* Ldbg. et Gottsche.

Sph. caule procumbente ramoso ramisque flagellifero-radiculosis, foliis oblongo-rotundis ovatisve semi-subverticalibus planis margineve ventrali inflexo concaviusculis submarginatis integerrimis retusis emarginato-bi-tridentatisve, amphigastriis in ramulis attenuatis ovato-lanceolatis integris bifidisve rudimentariis.

Synops. Hepat. p. 688. n. 2.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Oajacas østlige District Chinantla paa Træbark i fugtige skyggefulde Skove ved S. Pedro Tepinapa (2000—2500'), i Juni, med ♂- og ♀-Blomster. (Hb. Liebmann n. 315. e. p.)

Plantae parvae, semipollicares, intricatae, quibus Lejeunia quaedam arctissime irrepit, ut stirpem integrum separare fere nequeas. Caulis fibrillis et flagellis repens, adscendens, ramosus, cellulosus; rami procumbentes et e ventre radicantes, flexuosi, apice adscendentes et in flagellum longum abeunt vel saepe apice attenuato microphylo gemmipari. Folia variae formae, infima parva, subrotunda, media subimbricata semiverticalia, superiora subverticalia magis distantia, oblonga vel ovata, subadscendentia aut patenti-reflexa, margine dorsali rectiuscula et nonnunquam inflexa, ventrali rotundata, pleraque integerrima, nonnulla retusa, rarius emarginato-bi-tridentata; folia in apice ramorum attenuato parva, remota, subrotunda vel ovata. Amphigastria in hac parte tantum obvia, rudimentaria, lanceolata integerrima, rarius ovata subbifida; rarissime amphigastrium unum alterumve sporadicum in ramis principalibus invenitur. Foliorum compages crassa; textura, ut dicunt, porosa, propter cellularum lumen pellucidum, dum limites earum videri nequeunt. In foliis cum liquore kali caustici coctis et zinco bijodato tinctis cellulae singulae nucleo violaceo subrotundo ovalive notatae apparent, cujus in medio secundum coctionis gradum discum minorem flavescentem — rudimentum sacculi primordialis — invenias, nisi coctione solutus est. Hi nuclei levi ictu e cellula ejici possunt, quod etiam in aliis Hepaticis saepius observatur; ex mea sententia haec membrana secundaria est; cellulae pars reliqua componitur incrassationibus validis in angulis dispositis et membrana primaria hyalina circumclusa est; cellularum anguli minus prominent. Florem tantum masculinum et femineum videre contigit, perianthium nondum formatum erat. Ramuli masculini microphylli, juliformes; folia perigonalia apice incisa, margine repando-dentata, complura antheridia fovebant. Folia involucralia ovata, bifida, hyalina, margine repando-crenulata.

2. Sphagnoecetis stolonifera Lindbg. et Gottsche.

Sph. caule stolonibus e rhizomate multicauli vel e basi ramorum vel ipso apice radicante prolifero, foliis semi-verticalibus imbricatis (apicalibus decrescentibus remotisque) oblongis rotundatis margine incrassatis integerrimis, amphigastriis ovato-lanceolatis bifidisve rudimentariis tantum in ramulis attenuatis microphyllis obviis.

Synops. Hepat. p. 688. n. 3.

Liebmann fandt denne Plante i Bjergskove ved Chinantek-Landsbyen Teotalcingo (5000') i Oajacas østlige District Chinantla. (Hb. Liebm. n. 266 b.)

Rhizoma multiceps basique multipartitum, fibrillis tenuissimis brevibus repens. Caules aggregati, adscendentes, basi saepe stoloniferi, incurvi, apice attenuati et haud raro radicantes, teretes, crassi, tenaces, cellulosi, 4lineares—1pollicares, simplices et ramosi, basi foliis vestiti parvis rotundis subverticalibus patulis. Reliqua folia semiverticalia, imbri-cata (apicalia decrescentia remota) oblonga, rotundata, in dorso caulis oblique decurrentia concaviuscula, margine dorsali incrassata et saepe inflexa, integerrima, suprema nonnulla retusa. Textura crassiuscula porosa; retis maculae variae formae, marginales minores. In foliis cum liquore caustico coctis et tinctis areola violacea subrotunda in quavis cellula membranam secundariam monstrat; membrana externa hyalina crassior angulos cellulae format et in cellulis solutis triangula parva hyalina, quae intercalaria dicuntur, tamquam solidi cellularum anguli videntur. In serie marginali cellularum paries externus crassior est, ibique membrana primaria latior esse debet, nisi forte folii epidermis hac parte magis incrassatur, quod tamen coctione distingui non potest. Membrana secundaria in angulis cellularum incrassata. Flores masculi amentacei, in ramulis curvatis microphyllis albidis versus caulum bases pendulis. Antheridium unicum in axilla cujusvis folii perigonialis, quod basi lobulo dorsali complicatum est. Fructus basalis in ramulo brevi e dorso caulum insidens; perianthium incurviusculum, teretusculum, oblongum, versus apicem triquetrum, ore plurifido, laciniis oblongis in conum convolutis. Calyptra hyalina, parva, apice rumpens; capsula oviformis quadrivalvis; sectio transversalis duo strata monstrat, internum fibris semicircularibus depictum, et externum cellulis duplo majoribus fusco-tunicatis constitutum.

Elateres bispiri fibram spiralem latiorem fuscum intra tubulum hyalinum monstrant, cuius diametrus fere sporae diametrum aequat. Sporae fuscae vel luce transeunte flavo-fuscescentia, clara, laevia, rotundo-triquetra.

3. Sphagnoecetis prostrata Nees ab Es.

Sph. caule prostrato simplici ramoso nudo flagellifero-radiculoso, foliis distichopatulis ovalibus obtusis integerrimis marginatis margine dense striato, amphigastriis nullis.

β. Brasiliensis, foliorum margine incrassato magis obsoleto.

Synops. Hep. p. 149. n. 2.

Hampe fandt denne Art blandt mexikanske Mosser.

Perianthia e ventre caulis orta, tribus foliorum et amphigastriorum bifidorum paribus basi vestita, subteretia, apice obtuse triquetra, ore dentata ut in *Sphagnoeceti communis*. Capsula ovalis; calyptre apice rumpens basi pistillis abortivis 15 stipata. Capsula e duobus stratis confecta, quorum exterius cellulis duplo majoribus quadratis et parietibus incrassatis, alterum interius cellulis duplo minoribus fibris semicircularibus depictis constat. Elateres bispiri fibram spiralem validam fuscum in tubulo hyalino circumdante monstrant. Sporae rotundo-triquetrae, subgranulosae, paullo majores quam elaterum diametrus.

4. *Sphagnoecetis communis* Nees. ab Es.

Sph. caule serpentino, foliis elliptico-orbiculatis adscendentibus amphigastriis caulis vegetioris sterilisque nullis, fructiferi gemmiparique ovatis integris bifidisve.

β. macrion, caule adscendente apicem versus microphylo et amphigastriato, globulo gemmarum terminato.

Synops. Hep. p. 148. sq. n. 1. Nees ab Es. Hep. Europ. I. p. 294—298.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Oajaca ved Talea (5000') uden Frugt.

Surculi juniores foliis fuscescentibus vestiti tantummodo inveniebantur sed flagellis albidis carnosis et caulis adscendentibus trifariam foliatis bene cognoscendi. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellulas angulis incrassatas monstrant, et si ictu levi inter se solvuntur, anguli externi conice prominent ante circumferentiam cellulae; interdum autem e dirupta cellula exit nucleus, relictis in angulis membranae primariae incrassationibus, ubi tum cellula hyalino-rosea in continuitate folii appareat, cuius tegmentum demptum est, quare color aequo pallidus omnium partium adest exceptis angulis incrassatis, ubi color obscurior est (— in cellula enim intacta color tegimenti, quia color baseos cellulæ luce transgrediente priori quasi additur, duplum vigorem habere debet —); interdum autem exit totus nucleus cum angulorum incrassationibus, in quo discus flavus — residua sacculi primordialis — conspicitur; in hisce cellulis vacuis, nunc membrana primaria sola formatis, video angulum hyalinum conicum externum pallidiorem, qui cum sociis spatium trigonum »intercalare auctorum» componit, quod igitur ex eadem membrana primaria confectum est. Cellulae elongatae caulis quasi prosenchymatice inter se conjunctae sunt, angulus prominens saepe in apiculum producitur; sacculus primordialis brachiis caret, quia parietes poris parent; hae cellulae tubulis laevibus similes sunt.

Capsula e duobus stratis composita est, quorum externum cellulas tabulatas quadratas et parietes fuscos incrassatos habet, alterum interius e cellulis duplo minoribus notissimis illis fibris semicircularibus depictis constat.

VII. *Isotachis Mitten (reformat.) Hook. Antarct. Voy. II. 2. p. 148.*

Perianthium terminale crassius (e 3—5—7 cellularum stratis compositum) cylindrico-conicum, apice plerumque dealbato dentato squamulis dentatis purpurascentibus vel decoloribus obvelatum. Involuci folia (ad speciem) intima minutissina 3 quasi abortiva, perianthio adulto disperse accreta eique arcta adpressa. Calyptra inclusa libera, membranacea, pistillis abortivis basi et altius stipata. Capsula oblonga, firma, ad basin usque quadivalvis, valvulis aut rectis aut tortilibus dehiscens, interne fibris semicircularibus picta. Elateres valvulis ubique insidentes, caduci, bispiri. Semina fusca, laevia. Inflorescentia mascula in planta diversa; perigoniorum spica vel in apice vel in medio ramo foliis majoribus composita, vel amentacea in ramis microphyllis, in axillis unicum antheridium continentibus.

Caules erecti, arrhizi; folia conduplicata cuticula tam laxe vestita, ut cellulae rugulosae ($\frac{3}{1}$ auctae) apparent; amphigastria magna foliis subconformia.

Plantae mediocres aut grandiusculae, saepe roseae vel purpureae, in caespitibus densis crescentes.

In flore multae squamulae involucrales torum pistillorum adhuc nudum circumstant, quae post perianthii formationem et incrementum eodem modo in calycem attolluntur, quo pistilla sterilia in calyptram. Quarum extimae sistunt illa 3 folia et amphigastrium involucralia interna minutissima Mittentii, quae facile non animadvertuntur et perianthio adulto adpressa eique disperse accreta sunt; squamulae intimae altius in perianthium attolluntur et ex parte apicem perianthii obvelant, quia eum superant; in perianthiis juvenilibus haec squamae purpurascentes sunt, postea magis decolores fiunt.

Nees ab E. in Martii Flora Brasiliensi I. p. 320 *Jungermanniam serrulatam* inter Jungermannias succubo-imbricatas enumerat; sed si legem ab eo in Hep. Europ. I. p. 23. datam stricte sequaris, folium caulinum mox dextrum, mox sinistrum primum, ab amphigastrio incipiens et versus apicem adscendens invenias, unde stirpes nonnullas folia incuba, nonnullas folia succuba habere dicas. Mittenius folia «incuba» dicit et revera punctum affixionis dorsale paullo altius situm est, quam punctum accretionis ventrale, quamquam differentia vix conspicua est.

Propter majorem propinquitatem cum Jungermanniis, inter quas plantae in Synopsi nostra receptae sunt, hoc genus in vicinia earum posuimus.

1. *Isotachis multiceps* *Gottsche.*

I. dioeca, caule prostrato apice adscendente radiculoso stolonifero, foliis imbricatis subverticalibus addescendentibus vel complicato-concavis pectinato-patulis rotundo-quadratis emarginato-bilobis (lobo ventrali majore) integerrimis, amphigastriis magnis ovato-quadratis emarginato-bifidis integerrimis margine externo interdum unidentatis, fructu in ramulo e ventre orto, perianthio conico leviter incurvo apice decolorato plicato, ore denticulato sed squamulis parvis dentatis obvelato, capsula elliptica elongata, valvulis linearibus tortilibus dehiscente.

♂, Spica mascula amentacea microphylla ex axilla amphigastrii vel e latere caulis ortum trahens; folia perigonalia conduplicato-convoluta biloba (lobulis externe plerumque unidentatis) in axilla unicum antheridium habent; amphigastria perigonalia angustiora, bifida, lobis longioribus angustioribusque.

β. laxior.

Jungermannia multiceps Lindb. et Gottsche. *Synops. Hepat.* p. 687 n. 137. c.

Liebmann fandt denne Art i Skovene paa Siderne af Cerro de Sempaltepec, og i Departementet Oajaca ved Santiago Amatlan (6000') og ved Talea (5000') i fugtige Bjergskove; Varieteten *β* fandtes ved Tepitongo (4—5000') frugtbærende i August.

Crescit in latis caespitibus colore fuscis, e quibus plantae singulae propter flagella valida et radiculas fere inextricabiles difficulter evelluntur. Rami 3—6 lin. longi, radiculosi, flagella longa interdum bifida, flexuosa, rudimentis microphyllis vestita et radiculosa, colore rubro-fusca apice viridia e ventre emitunt; ramuli novelli erectiusculi paucas radicellas monstrant. Folia ovato-quadrata, concava, plus minusve complicata, apice ad $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ partem emarginato-biloba sinu semilunari, lobis apiculatis ventrali majore, toto margine integerrimis. Cellularum incrassatio valida lateralis intervalla inter lumina vel cavitates earum lata format, sed acido sulphurico concentrato vel si folia cum liquore kali caustici coquuntur et zinco bijodato tinguntur, statim cellulæ verus ambitus et membrana primitiva hyalina cognosci potest. Amphigastria $\frac{1}{4}$ partem foliorum aequant (sub apice magnitudine crescentia) ambituque iis fere respondent; sunt enim ovato-quadrata ad $\frac{1}{3}$ partem et ultra biloba, lobis ovato-lanceolatis plus minusve acutis, margine externo interdum unidentata. Folia floralia externa magnitudine versus perianthium crescentia, ambitu rotundiora, sinu acutiore ceteroquin conformia, amphigastrium subinvolucrale majus ad $\frac{1}{3}$ partem bifidum, laciniis acutioribus, margine exteriore hic illic minute dentato. Verticillus interior foliorum involucralium foliis

minutis bilobis lobis acutioribus externe hinc unidentatis et amphigastrio minore apice subquadrilobo componitur, nec tamen semper sibi constat. Color foliorum fuscus. Fructus in ramulo nudo longiore minoreve e ventre orto insidet, rarius terminalis in ramulo solito more foliato deprehenditur. Perianthium cylindro-conicum, $1\frac{1}{2}$ lin. longum, incurviusculum roseo-fuscum, apice decolorato squamulis vestitum, ore denticulatum, sectione transversali 3—4 strata cellularum monstrans. Calyptra ad basin usque libera, stylo longo coronata, pistillis abortivis parvo numero dispersim obsessa. Pedicellus capsulae basi involucello margine libero fimbriato et in apiculum deorsum terminato circumdatur, in cuius medio infixus est. Capsula elongata cylindrica, valvis linearibus post dehiscentiam ad modum *Calypogeiae Trichomanis* tortilibus, extra cellulis tabulatis nudis, intus fibris latis semicircularibus depictis compositis. Elateres bispiri, spira fusca; semina laevia, fusca. Inflorescentia mascula dioeca amentacea (in planta Venezuelana prope Valenciam a cl. Fendler collecta) occurrit in ramulis lateralibus microphyllis; folia perigonalia biloba extus unidentata saccatim convoluta, in axilla unicum antheridium habent; amphigastria ramulorum masculorum angustiora, lobis longioribus extra uni-bidentatis.

Obs. Fortasse propius huic accedit *Jungermannia serrulata* δ *subintegerrima* (Synos. Hepat. p. 128. n. 98), quae paullum aliena inter reliquas *J. serrulatae* formas nobis appetat.

Tab. XIV. fig. 1. Jg. multiceps β ; pars rami cum fructificatione $\frac{1}{1}^7$ aucta. fig. 2. pars rami a ventre visa. fig. 3. pars perichaetii exterioris; a, folium involucrale exterius, b, amphigastrium involucrale exterius. fig. 4. folium involucrale externum alterum. fig. 5. par foliorum caulinorum cum amphigastrio. fig. 6. folium caulinum inter laminas vitreas compressum. fig. 7. capsula. fig. 8. calyptra abscissa cum fructu juniore, cujus pedicellus involucello ciliato circumdatur.

VIII. *Lophocolea*. Nees ab Es. Synops. Hepat. p. 151 et 689.

1. *Lophocolea Martiana* Nees ab Es.

L. caule repente vage ramoso, foliis distichis horizontalibus ovato-quadratis emarginato-bidentatis per paria cum amphigastriis bi-quadrati- (etiam sex-) fidis coalitis, perianthio prismatico angulis anguste alato ore serrato-dentato, foliis involucralibus margine ventrali 3—4 dentibus majoribus munitis, amphigastrio calycino subquadrato pluridentato altius coalito.

Synops. Hepat. p. 152 et 689. n. 1.

β *Mexicana*, perianthio breviore latius alato, ala uni-bi-quadridentata, foliis involucralibus margine ventrali aequae ac dorsali plerumque 3-dentatis, foliis caulinis paullo longioribus. (Hb. Liebm. n. 129.)

β^* *Miradorensis*, minor; perianthio minore anguste alato, foliis involucralibus margine dorsali plerumque unidentatis magnitudine caulinis magis aequalibus, foliis caulinis longioribus angustioribusque. (Hb. Liebm. n. 467.)

Liebmann samlede begge Former i Omegnen af Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Marts med Perianthier og tillige Hanplanten. (Hb. Liebm. n. 63, 78, 82, 129, 181, 316, 467, 529.)

Exemplaria originalia Martiana omnium fere partium variationem habent, quare mensuram ad meliorem comparationem hic addemus. In exemplari Herb. Neesii α , a nobis delineato, perianthium fere 2 lineas longum, $\frac{1}{2}$ lin. latum, folia involucralia 1 lin. longa, margine dorsali $1\frac{1}{3}$ lin., parte latissima $\frac{2}{3}$ lin. et apice $\frac{1}{3}$ lata sunt; amphigastrium coalitum $\frac{5}{6}$ lin. longum, parte angustissima $\frac{2}{5}$ lin., apice magis expanso $\frac{2}{3}$ lin. latum; folia caulina majora $\frac{2}{3}-\frac{5}{6}$ lin. longa, parte latissima $\frac{5}{6}$ lin. et apice $\frac{1}{3}$ lin. lata sunt; folia minora $\frac{2}{5}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{2}$ lin. et apice vix $\frac{1}{6}$ lin. lata sunt.

Exemplar Mexicanum sub n. 129 a Liebmanno collectum perianthium habet $1\frac{1}{3}$ lin. longum, $\frac{2}{3}$ lin. latum et, si dissecatum expanditur, $1\frac{1}{2}$ lin. latum est; alae latitudo $1\frac{1}{5}-\frac{1}{10}$ lin. est. Folia involucralia 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, amphigastrium involucrale $\frac{2}{3}$ lin. longum, medio $\frac{1}{3}$ lin. et apice magis expanso $\frac{1}{2}$ lin. latum. Folia caulina $\frac{2}{3}$ lin. longa, basi $\frac{2}{5}$ lin., et apice $\frac{1}{6}$ lin. lata sunt.

Exemplar sub n. 467 in Hacienda de Mirador collectum perianthium habet vix 1 lin. longum, $\frac{1}{3}-\frac{1}{2}$ lin. latum, et, si dissecatum expanditur, latitudinem 1 lin. habet. Folia involucralia $\frac{5}{6}$ lin. longa, medio $\frac{1}{2}$ lin. et apice $\frac{1}{5}$ lin. lata; amphigastrium involucrale $\frac{3}{5}$ lin. longum et $\frac{1}{3}$ lin. latum. Folia caulina $\frac{3}{5}$ lin. longa, basi $\frac{2}{5}$ lin., et apice $\frac{1}{6}$ lin. lata sunt.

Mascula inflorescentia in eadem planta quam feminea, sed terminalis in ramis propriis; folia perigonalia hujus speciei lunato-emarginata. Capsula e quinque stratis composita est, quorum intimum fibris semicircularibus depictum, extimum cellulis duplo majoribus margine laterali incrassatis confectum est; strata tria intermedia cellulis magnitudine fere strati intimi aequalibus lateraliter incrassatis conformantur; stratum extimum cellulas tabulatas margine laterali punctis 3—5—6 fuscis incrassatis depictas monstrat. Foliorum cellulae angulorum incrassationem punctiformem monstrant.

N. 529. Hb. Liebmanniani ex sententia beati Lindenbergii transitum ad *Loph.*

connatam β ex insula St. Vincentii parat. Accuratiore autem examinatione in foliis involucralibus tres dentes majores in margine ventrali, unus alterve minor in margine dorsali reperiuntur. Plantae Mexicanae foliis floralibus cum hisce et cum Jamaicensibus a rev. Wullschlaegel sub n. 1229 collectis congruunt, sed perianthii ciliis brevioribus latioribusque a planta ex insula St. Vincentii recedunt.

2. *Lophocolea connata* *Nees ab Es.*

L. caule repente irregulariter ramoso, foliis ovato-oblongis strictiusculis apice retusis bidentatis integerrimis per paria cum amphigastriis bidentatis (superioribus subquadridentatis) coalitis, perianthio prismatico angulis late alato apice angulisque serrato-dentato, foliis involucralibus margine ventrali integerrimis, amphigastrio calycino oblongo-ovato bidentato subcoalito.

Synops. Hepat. p. 153 et 690. n. 2.

β . *Mexicana*; perianthiis anguste alatis (ala apice uni- (vel rarius bi-) dentata), foliis involucralibus falcatis margine ventrali uni- (rarius bi-) dentatis, foliis caulinis brevioribus latioribusque (Hb. Liebm. n. 371).

Liebmann samlede denne Art paa gamle Træer og paa den blotte Jord voxende sammen med *Lophocolea Martiana* paa Hacienda de irador. (Hb. Liebm. n. 82, 131, 314, 371, 409. e. p.)

Folia caulina cocta et tincta eandem imaginem praebent atque in *Lophocolea Martiana*, scilicet cellulas angulis nullam vel punctiformem incrassationem levem monstrantes. Cum multa exemplaria hujus speciei nunc dissectione accuratiore observare nobis licuerit, folia involucralia rarius integerrima videri, qualia in Synopsi descripta sunt, nobis dicendum est. Inveniuntur saepius in speciminiibus Mexicanis (ut in Guadalupensisibus) in altero vel in utroque folio involucrali unus vel duo dentes; omnibus tamen margo ventralis falcatus communis est. Amphigastrium variat longitudine, forma et dentium numero; invenitur oblongum vel cuneiforme, bifidum, laciniis tridentatis vel brevius quasi quadratum et quadridentatum vel apice lanceolato pluridentato. Perianthia in plantis Mexicanis aliam angustum uni- (vel rarius bi-) dentatam monstrant.

N. 371 has mensuras praebet: Perianthium $1\frac{1}{3}$ lin. longum, $\frac{1}{3}$ lin. latum, dissecatum et expansum $\frac{5}{6}$ lin. latum est. Folia involucralia 1 lin. longa, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. lata; amphigastrium involucrale $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longum, $\frac{1}{5}$ lin. in medio et apice magis expanso $\frac{1}{3}$ lin. latum; folia caulina $\frac{2}{3}$ lin. longa, basi $\frac{1}{2}$ lin., apice fere $\frac{1}{4}$ lin. lata sunt.

Capsula (secundum exemplaria Guadalupensia) aeque atque in *Loph. Martiana* e quin-

que stratis componitur, quorum extimum cellulis tabulatis duplo majoribus margine laterali incrassatis compositum est; intermedia tria minora sectione transversali parietes laterales fuscos incrassatos monstrant; intimum stratum e cellulis longioribus fibris notissimis circularibus depictis constat.

3. *Lophocolea granulosa* *Gottsche.*

L. caule procumbente flexuoso simpliciusculo, foliis subimbricatis approximatisque subhorizontalibus convexiusculis ovato-quadratis 5—6 spinis dentatis pulverulentis, amphigastriis coalitis distantibus bipartitis, laciinis linearis-angustis integerrimis margine externo basi uni (-bi) dentatis, fructu

Frederik Müller samlede denne Plante iblandt *Lejeunia cerina* i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Aserradero de Santa Cruz. (Unicum.)

Stirps sesquipollaris sterilis, foliis fuscis versus apicem flavo-viridibus vestita. Folia ovato-quadrata colore fusco, margine dorsali rotundiusculo integerrima vel rarius unidentata, ventrali 2—3 et apice 3—4 dentibus majoribus spinosa; areolae pulverulentae vel granulosae, minus pellucidae, quia granulis minutissimis (si trecenties vel quadringenties augentur) conspersae sunt. Haec granula etiam folii ambitum crenulatum faciunt; in angulis tamen cellularum desunt, ita ut tantum cellulae discum, qui cavitati respondet, granulatum efficiant. Ceteroquin textura qualis e. gr. in *Jg. porphyroleuca* sc. angulis cellulorum incrassatis. Cellulae tres ultimae dentium vel ciliorum in foliis aequa atque in amphigastriis sine granulis sunt. Amphigastria plerumque utrinque vel rarius ab uno latere cum foliis subjacentibus loro tenui coalita fere ejusdem formae atque in *Lophocolea bidentata*, cellulis aequa granulose conspersis ac foliis. Radicellae tenues et rarae sub basi amphigastriorum.

Proxima huic est *Lophocolea Sandvicensis* G., cuius plantae exemplar unicum in plantis Remyanis in insula Sandvicensi Hawaii collectis inveni. Neglecta illa granulatione, quae tantum lentibus validissimis ($\frac{400}{1}$) emergit, simillima est, sed folia parcus dentata sunt. In illa folia rarissime plures quam 4 dentes habent, et multa ejusdem magnitudinis tribus dentibus tantum armata sunt, dum in *L. granulosa* ad minimum 4, plerumque 6, interdum 7 et 8 dentes inveniuntur.

4. *Lophocolea bidentata* *Nees ab Es.*

L. caule elongato parce ramoso, foliis ovato-triangularibus explanatis laxis pallidis sinu sublunato dentibus subobliquis acutis, amphigastriis multo minoribus liberis distantibus

bipartitis laciniis profunde bifidis linearis angustis integerrimis aut inciso-dentatis, perianthio terminali vel deinde lateral i subsessili angulis ala nulla (vel tenui in γ) ore laciniato-dentato, involucri foliis subconformibus acute bifidis subdentatis.

Synops. Hepat. p. 159. n. 15.

γ^* *alata minor*.

Synops. Hepat. p. 691. n. 15.

Hovedformen α samlede Liebmann i en Høide af 10,000 Fod i Omegnen af Vaqueira del Jacal paa Vulkanen Pico de Orizaba i September (n. 525 et 165. e. p.), den vingede Form $\gamma^* alata$ fandtes i Skovene omkring Mirador, Huatusco og Colipa i Departementet Vera Cruz. (Hb. Liebm. 13, 65, 78 c. per. 141 et 395 c. per.)

Perianthia uno altero margine alata inter *Lophocoleam bidentatam* α ex Hercynia ut et in plantis apud catarrhactam «Kochefall» in Sudetis collectis ex Hb. Neesiano saepius observavimus, sed quam *formam rariorem* Europaeam in Synops. Hepat. p. 159. n. 15. γ . declaravimus, in America *constantem varietatem* fieri videmus, non solum in terris Mexicanis indigenam, sed etiam in insula Cuba et in Venezuela. Perianthia hujus formae ex Orizaba $1\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{2}{3}$ lin. lata, dissecta et expansa $1\frac{1}{3}$ lin. lata sunt; majores dentes medii labiorum fere $\frac{1}{4}$ lin. longi. Folia involucralia fere ovalia, 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin. parte latissima lata; amphigastrium involucrale 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. et quod excurrit latum; folia caulina minora $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata.

Monstrositatem leviorem, qualem in Synopsi Hepat. p. 159 sub ε indicavimus etiam in exemplari Mexicane deprehendimus.

Forma γ^* multo magis a forma communi recedit et, si sterilis invenitur, cum *Lophocolea coadunata* Sw. propter foliorum formam commutari potest, perianthium autem valde diversum. Folia caulina nostrae $\frac{1}{2}$ lin. longa, paullo ante basin $\frac{2}{5}$ lin. lata, dum apice ad $\frac{1}{6}$ lin. attenuantur, subimbricata, omnino ejus texturae, cuius *L. bidentatae* Europaeae, nec, si coquuntur et tinguntur, ullam differentiam perhibentia. Folia involucralia $\frac{2}{3}$ — $\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{2}{3}$ lin. lata, amphigastrium aequo longum, $\frac{1}{2}$ lin. latum. Perianthium $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. longum, $\frac{2}{3}$ lin. fere latum propter alam $\frac{1}{10}$ lin. latam in utroque angulo obviam, dissectum et expansum $1\frac{1}{3}$ lin. explet. Dentes labiorum latissimi $\frac{1}{3}$ lin. longi; pars perianthii superior major quam in aliis formis, labia libera fere $\frac{2}{3}$ lin. longa in perianthio sesquilineari, et semilinearia in perianthio $1\frac{1}{6}$ lin. longo. Alae validae dentatae, $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{6}$ lin. latae, totam anguli longitudinem ornant.

Forsitan haec varietas $\gamma^* alata minor$ propriam speciem sistit aequo ac forma ex insulis Sandvicensibus in Synopsi nostra p. 159 in calce ad varietatem γ *alata* adducta; sed farrago stirpium exoticarum ad hanc speciem relata rarius fructificationem perfectam et perigonia ad tutam diagnosin necessaria monstrat.

5. *Lophocolea terminalis* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente fasciculato-ramoso (ramis omnibus in spicam masculam longam terminatis), foliis caulinis contiguis quadratis vel ovato-quadratis subsecundis bifidis, laciniis longe cuspidatis sinu lunato, amphigastriis bipartitis laciniis subulatis integerimis vel extrinsecus unidentatis, (perigonialibus bipartitis laciniis subulatis integris patentि-curvatis, fructu terminali, perianthio prismatico-triquetro alato (ala 3-pluridentata), oris labiis profunde bifidis laciniis longe ciliato-dentatis, involuci foliis subconformibus acute bifidis margine ventrali uni-bidentatis.

Synops. Hepat. p. 691. n. 15. b.

Liebmann fandt denne Art i de varm-tempererte Skove (2—3000') i Departementet Oajacas østlige District Chinantla omkring Lobani i Juni, voxende paa Tørvegrund sammen med *Aneura multifida* (♂ Hb. Liebm. n. 193); Hunplanten fandtes i Mai ved Tlaltengo.

Plantae caespitose crescentes, adscendentes, pollicares, florescentes apice saepius nigrescentes, fasciculato-ramosae in stirpibus masculis et sterilibus, sub perianthio innovantes parcius ramos edentes. Folia caulina stirpis sterilis $\frac{1}{2}$ lin. longa, medio $\frac{1}{3}$ lin., apice $\frac{1}{6}$ lata, adscendentib-conniventia, subimbricata, ovato-quadrata, profunde bifida, in stirpibus femineis versus fructificationem magnitudine increscentia. Folia involucralia $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa (dentibus fere $\frac{1}{3}$ lin. longis), $\frac{1}{2}$ lin. lata, margine ventrali uno vel binis dentibus armata, saepius etiam in margine dorsali dentem monstrantia; amphigastrium involucrale liberum, $\frac{5}{6}$ lin. longum, $\frac{1}{2}$ lin. latum, apice bifidum, laciniis lanceolatis margine uni- (rarius bi-) dentatis et basi validiore dente incurvo armatis. Folia floralia vel subinvolutoria prima plerumque eundem typum sequuntur. Perianthium $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{5}{6}$ lin. longum, $\frac{2}{3}$ lin. latum, perianthium ($1\frac{1}{6}$ lin. longum) dissecatum et expansum $1\frac{1}{3}$ lin. metitur; ala $\frac{1}{10}$ — $\frac{2}{15}$ lin. lata dentibus longioribus incurvis compluribus armata. Labia profundius fissa, dimidiata fere perianthii longitudinem habentia, margine dentibus longioribus angustioribus incurviusculis armata. Inflorescentia mascula terminalis, totum ramum occupans; folia perigonalia caulinis omnino similia, adjecto sacculo parvo dorsali unidentato, in quo plerumque antheridium unicum, ut videtur, pedicello parvo fultum latet. Amphigastria patula vel subreflexa elongata, pleraque recta vel incurviuscula, nonnihil divergentia. Textura foliorum, etiam si coquuntur et tinguntur, eadem atque in *L. bidentata* vulgaris.

Fructificationibus magis ad *Lophocoleam latifoliam* β *cuspidatam* nostrae florae accedit, sed statura foliorumque brevitate recedit. Folia longius cuspidata quam in *L. bicuspidatae* var. *cuspidata*, fere ut in *L. minoris* varietate β, a qua differt statura majore, foliis secundis, amphigastriis longioribus, compage laxa et tenera.

6. *Lophocolea aberrans* Lindbg. et Gottsche.

L. caule caespitoso ramoso, ramis semipollicaribus rectis subsimplicibus, foliis imbricatis subhorizontalibus ovato-quadratis non decurrentibus apice repandis vel truncatis (in novellis tenuioribus bidentatis), amphigastriis distantibus erecto-patulis cuneato-quadratis bifidis, margine externo unidentatis hinc inde coalitis, fructu terminali vel ad speciem (innovatione superveniente) laterali et in dichotomia, perianthio triquetro-campanulato, angulis in alam saepius uni- (rarius tri-) dentatam prominentibus, ore laciniato-dentato.

Synops. Hep. p. 696. n. 28. h.

Fandtes ved Mirador iblandt *Aneura palmata*, og blev samlet i Marts med Perianthier. (Hb. Liebm. n. 74.)

Caulis ramosus, repens, ramos semipollicares emittens basi interdum foliis minoribus et distantibus vestitos, cum foliis lineam dimidiata latos. Folia subhorizontalia, margine ventrali et dorsali rotunda, apice plus minus repanda vel integra, diaphana, convexiuscula, versus apicem ramorum magis repanda et in ramulis microphyllis elongato-quadrata et bifida. Textura pellucida, fere ut in *Lophocolea bidentata*; cellularum incrassatio angularis nulla. Amphigastria distantia, versus ramorum apicem majora, approximata, erecto-patula, cuneato-quadrata, margine laterali caulis latitudinem excedentia, bipartita, laciniis lanceolato-acutatis, sinu lato, margine vel utroque vel externo solo unidentata, in ramis primariis nonnunquam integerrima, hinc inde, praesertim versus ramorum apicem, altero latere tenui limbo cum folio suo coalita; in ramulis tenerioribus amphigastria bifida, sine dente marginali, nunquam coalita. Perianthium semi-lineare, semi-immersum, campanulato-triquetrum, angulis in alam plus minusve dentatam protractum, ore laciniato-dentatum, angulis profundi fissum. Pistilla adsunt 30—40. Folia involucralia conformia, perianthio paullo appressa (in flore) plus minus repanda; amphigastrium ovatum, magnum, bifidum, marginibus repandum sed nullo dente laterali instructum. Quatuor dissectiones similem harum partium conformatiōem nobis monstrarunt. Amphigastrium subperichaetiale etiam bifidum margine non dentatum.

Obs. Proximae huic sunt *Lophocolea heterophylla* et *aequifolia*; sed ab utraque perianthii ala aequa ac perichaetii conformatiōe recedit, ab *aequifolia* foliis quoque brevioribus; a *Lophocolea heterophylloide* statura minore aequa ac perichaetii forma differt et cum minoribus hujus speciei formis tantum comparari possit, e. g. cum forma Capensi, quae tamen folia longiora ovali-truncata habet.

Tab. XVIII. fig. 1. Pars caulis fructiferi $\frac{1}{2}$ aucta a ventre visa. fig. 2. 3. perianthia diversa. fig. 4. involucrum. fig. 5. folium et amphigastrium subinvolucralia. fig. 6. perianthium dissectum inter laminas vitreas compressum. fig. 7 et 9. folia involucralia. fig. 8. amphigastrium involucrale.

7. *Lophocolea Liebmanniana Gottsche.*

L. caule repente subramoso, foliis subimbricatis subhorizontalibus oblongo-quadratis emarginato-bidentatis spinuloso-ciliatis laevibus, amphigastriis liberis bifidis margine subundentatis, fructu terminali, perianthio prismatico-triquetro ciliis parvis parce muriculato, ore laciniato-dentato.

Gottsche Uebersicht p. 22 in: Mohl et Schlechtend. Bot. Zeitung 1858.

Liebmann samlede nogle Grene af denne Plante paa Plantagen Hacienda de Mirador.

Rami 1—2-lineares. Folia $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ lin. lata, marginibus ventrali et dorsali a medio spinoso-dentata, apice bifida, laciniis spinuloso-dentatis, laevissima. Folia involucralia paullo longiora usque ad basin fere circumcirca spinuloso-dentata. Perianthium $\frac{5}{6}$ lin. longum, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ lin. latum, media parte parce muriculatum, ore trilabiato, labiis bifidis, laciniis subciliato-spinosis.

A *Lophocolea muricata* differt foliis omnino laevibus. A *Lophocolea spinosa*, foliis laevibus simillima, foliorum forma et dentibus minoribus diversa videtur; praeterea illa tantum sterilis nota est. Forma major sterilis in Surinamo a cl. Wullschlaegelio reperta nostrae similis est, nec nisi foliis paullo longioribus minusque dentatis recedere videtur.

Tab. XVIII. fg. 1. Pars caulis fructiferi a dorso visa $\frac{3}{1}$ ⁵ aucta. fg. 2. pars ramuli a ventre visa. fg. 3. folium involucrale. fg. 4. 5. duo labia oris perianthii.

8. *Lophocolea muricata Lehm. et Lindbg.*

L. caule procumbente ramoso, foliis adproximatis subhorizontalibus amphigastriisque liberis ovato-subquadratis acute emarginato-bidentatis spinuloso-ciliatis in pagina dorsali muricatis, fructu terminali, perianthio subtriquetro ciliis parvis muricato ore laciniato-dentato.

β , *laxior*, foliorum laciniis longioribus magis regulari modo ciliato-dentatis, pagina foliorum dorsali versus apicem folii pilis (e 2—3 articulis constantibus) hirtella.

Synops. Hep. p. 169 et 703. n. 39.

Liebmann samlede denne Art blandt andre Hepaticae paa Plantagen Mirador i Februar (1843) med Perianthier; der fandtes kun faa Brudstykker. (Hb. Liebm. n. 326 ex parte.)

Lophocoleam muricatam speciem cosmopoliticam esse, dixit clar. Mitten (Voyage of the Herald p. 245. n. 1182), qui exemplaria hujus speciei ex isthmo Panamae, e Vene-

zuela et e Rio Janeiro vidit. Specimina omnino conformia e Java insula (Lophocoleam horridulam v. d. Sande Lacoste Synops. Hep. Javan. p. 30), e Brasilia in collectione cl. Didrichsenii, e Chili a cl. Gay collecta, et e Cuba in collectione cl. Wrightii vidi. Attamen possideo in herbario meo nonnulla frustula sterilia, semipollucaria et ultra, e promont. B. S. (Buschmannsland) foliis in pagina dorsali adhuc laevioribus praedita quam nostra var. β , ita ut nonnulli pili versus apicem folii tantum appareant et facile praetervideantur; sane haec forma transitum ad speciem praecedentem parat; sed cum de fructificatione nihil addere possim, de hac re monuisse satis est.

IX. *Chiloscyphus Cord. Dum. Nees ab Es. Synops. Hep. p. 171 et 703.*

1. *Chiloscyphus amphibolius Nees ab Es.*

Ch. caule repente vage ramoso, foliis flaccidis horizontalibus ovatis integerrimis apice subretusis vel utrinque vel alternatim cum amphigastriis parvis rotundatis sexfidis coalitis, involuci foliis duobus exiguis, perianthio obconico laevi ore trilobo.

β , *major*, amphigastriis plerisque utrinque coalitis.

Synops. Hepat. p. 178 et 705. n. 11.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Oajaca ved Talea (5000') i August med mandlig Blomsterstand. (Hb. Liebm. n. 258). Iblandt andre Hepaticae fra Cerro de Sempoaltepec fandt jeg en Plante med Perianthier.

Exemplaria Martiana, quae illustr. Neesius descripsit, minora sunt et sterilia, unde plantam Mexicanam pro varietate majore habuimus; nec tamen tacendum est, exemplaria Brasiliensia, quae cl. Lindberg nuper collegit, omnium partium aequam staturam ac plantas Mexicanas habere.

Rami in statu madido incurvi, flexuosi, $2\frac{1}{2}$ pollices longi, cum foliis $1\frac{1}{2}$ lin. lati. Folia apice decurva interdum reflexa, dorso convexa, 1 lin. longa, fere $\frac{2}{3}$ lin. lata; cum liquore kalico cocta et tineta imaginem fere qualem folia *Calypogeiae Trichomanis*, praebent; cellulae maiores incrassationibus membranae secundariae haud obsessae, angulis triangulum hyalinum intercalare monstrant; sed cellulis inter se solutis, hoc triangulum nihil aliud est quam apex anguli externus hyalinus. In flore femineo folia involucralia et insequentia floralia cum amphigastriis utrinque coalita invenimus; folii involucralis utriusque margo ventralis basin versus laciniam bidentulam habebat; amphigastrium majus sexpartitum, lacinias majoribus interdum uno altero dente margine armatis. Perianthium basi contractum

apice triquetrum labium repando-dentatum monstrabat; viginti pistilla numeravimus. Inflorescentia mascula spicata in ramis propriis microphyllis sub foliis caulinis latentibus. Folia perigonalia dorsalem lobum saccatum unidentatum habent; amphigastria oblonga bipartita laciniis elongato-lanceolatis.

Tab. XIX. fig. 1. Perianthium junius $\frac{1}{1}$ auctum. fig. 2. idem inter laminas vitreas expansum. fig. 3. folia involucralia cum amphigastrio coalita. fig. 4. folium subinvolucrale primum cum amphigastrio. fig. 5. amphigastrium subinvolucrale secundum jam in formam caulinorum vulgarem transiens.

2. *Chiloscyphus combinatus* Nees ab Es.

Ch. caule repente subramoso, foliis horizontalibus ovato-cuneiformibus planis apice emarginato-tridentatis, amphigastriis in folii marginem anguste decurrentibus bifidis, laciniis incisis plerumque tridentatis, perianthio campanulato compresso ab altero latere ad tertiam partem fisso, ore irregulariter inciso-laciniato.

α , *communis*, foliis basi dorsali subcoalitis. Synops. Hepat. p. 182 n. 20.

β , *spinosior*, foliis margine ventrali undulatis, dorsali basi plerumque coalitis vel subcoalitis, dentibus longioribus subulatis, amphigastriis magis profundiusque incisis, perianthii laciniis longioribus angustioribus.

Synops. Hep. p. 706. n. 20.

Begge Former fandtes i Skovene paa Plantagen Mirador; af Formen α samlede Liebmann under n. 49, 57' og 323 Han- og Hunplanten, og en lidet større Form i Districtet Chinantla under n. 420. Varieteten β blev samlet ved Mirador i Februar (n. 70 og n. 232), Marts (n. 304 og n. 314) og April (n. 19) med fuldkommen Frugt og med Antheridier.

Forma Miradorensis α et Chinantlana α sola magnitudine diversae sunt; folia tridentata in novellis ramis bidentata apparent. Haec forma α plantae originali Brasiliensi omni modo simillima est; tacere tamen nolumus, texturam plantae Mexicanae flaccidiorem esse quam plantae Brasiliensis cellulas parietibus crassioribus circumscriptas habentis. Varietatem β *spinosiorem*, quae propius ad *Chiloscyphum fissistipum* accedit, certissime bonam speciem et a *Chil. combinato* omnino diversam crederes, si perfectas et plantas vetustiores tantum vidisses. Adsunt tamen surculi imperfectiores, qui transitum ad *Chil. combinatum* parant et nostram formam huic connectunt. *Chiloscyphus fissistipus* statura majore, foliis confertioribus, amphigastriis latioribus convexis margine tantum incisis et perianthio breviori laciniisque simplicioribus ornato differt.

Rami varietatis α subpollicares cum foliis expansis $1\frac{1}{2}$ lin. lati. Folia $\frac{2}{3}$ lin. longa,

basi $\frac{1}{2}$ lin., apice $\frac{1}{3}$ lin. lata, flavo-viridescentia, tridentata, dente medio latiore plerumque prominente; cum liquore kalico cocta et tincta aut nullam incrassationem aut punctiformem angularem cellularum monstrant et, si cellulae inter se solvuntur, trigonum intercalare hyalinum apicem externum cellulæ anguli se praebet. Amphigastria circiter $\frac{1}{2}$ lin. lata, caule triplo latiora, 6 vel 8 dentibus lanceolato-subulatis armata, utrinque in folia subjecta descendens. Inflorescentia mascula in ramulis propriis teretibus microphyllis sub foliis caulinis latentibus floribusque femineis proximis; folia perigonalia tridentata vel trifida, subcompli-cata, imbricata, gremio unum antheridium continentia; amphigastria perigonalia oblongo-ovata, bifida. Fructus in ramulo brevissimo ($\frac{1}{2}$ linearis) lateralis. Perianthium $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{3}$ lin. longum, ore $\frac{5}{6}$ lin. latum, (oris laciniae fere semilineares sunt), campanulatum subcompressum, ore irregulariter inciso-laciniatum laciniis margine spinoso-dentatis incurvis flexuiscusque. Folia involucralia 1 lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, forma variabilia, plerumque 3-fida laciniis elongatis utrinque spinoso-dentatis; amphigastrium $\frac{1}{2}$ lin. longum, $\frac{1}{3}$ lin. latum, 3—4-fidum laciniis utrinque dentatis. Folia inferiora rami fructiferi caulinis similia. Capsula, ut in congeneribus, purpurascens-fusca, valvulae ovato-lanceolatae.

Rami varietatis β longiores, bipollicares, robustiores et ramosiores, cum foliis expansis 2 lineas lati. Folia 1 lin. longa, basi $\frac{5}{6}$ lin., apice $\frac{1}{3}$ lin. lata, margine ventrali undulata, repando-spinosa, apice trispinosa, basi ventrali in amphigastrium $\frac{2}{3}$ lin. latum multispinosum (ad viginti dentes numeravi) transeuntia, ejusdem texturae ac var. α , sed cellulis paullo majoribus praedita sine membranae secundariae incrassatione. Flores masculi amentacei ut in var. α . Perianthium $1\frac{1}{3}$ lin. longum, ore $\frac{5}{6}$ lin. latum, laciniato-dentatum, dentibus angustioribus. Folia involucralia $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata, trifida vel quadrifida, lobis utrinque dentatis; amphigastrium involucrale bifidum, laciniis utrinque dentatis. Capsula rotunda fusca, quadrivalvis; sectio transversalis monstrat 4 cellularum strata, quorum extimum cellulis tabulatis hyalinis constat (unde color pallidus valvularum faciei externae humectarum pendet); stratum intimum vulgatissimis fibris semicircularibus depictum; strata intermedia cellulis minoribus incrassationes monstrantibus conflantur. Sporae sphaericotetraëdrae, laeves, flavo-fuscae; elateres bispiri, fibram spiralem fuscam in tubo hyalino monstrantes.

Formae intermediae inter α et β transitum parantes, statura magis ad formam β spinosorem accedunt, folia minus imbricata habent, margine ventrali laeviore nullum vel unicum dentem monstrantia; amphigastria minus dentata sunt; inveniuntur hae stirpes in Hb. Liebmanniano inter plantas sub n. 283 collectas.

Tab. XX. Variet. α . fig. 1. Pars ramuli a ventre visa $\frac{1}{7}$ aucta. fig. 2. perianthium ramulo parvo insidens. fig. 3. folium involucrale. fig. 4. amphigastrium involucrale. fig. 5. laciniae duae oris perianthii. fig. 6—8. amphigastria foliis subjectis coa-

lita. fg. 9. Inflorescentia mascula juliformis. fg. 10. folia perigonalia a dorso visa,
 $\frac{6}{1}$ ⁰ aucta. fg. 11. amphigastrium perigoniale.

Variet. β spinosior. fg. 1. Par foliorum caulinorum cum amphigastrio coalito $\frac{1}{7}$ ⁷
 auctum. fg. 2. amphigastrium cum radicellis in patellas suctorias abeuntibus. fg. 3.
 Perianthium cum parte ramuli fructiferi. fg. 4. 5. folia involucralia. fg. 6. amphi-
 gastrium involucrale.

3. Chiloscyphus Orizabensis *Gott sche.*

Ch. caule arcte repente ramoso, foliis imbricatis ovato-semicircularibus patulis
 convexiusculis apice decurvis integerrimis, amphigastriis distantibus erecto-patentibus ovatis
 bifidis margine unidentatis ab altero latere vel utrinque cum foliis subjacentibus coalitis, fructu ter-
 minali in ramulo laterali longiore, perianthio ovato versus apicem triquetro, ore undulato-
 sinuoso, labiis conniventibus angulato-dentatis, foliis involucralibus ovatis apice repandis.

I Omegnen af Vulkanen Orizaba fandt Frederik Müller denne Plante med Frugt.

Denso strato plantae valde intricatae, inordinate ramosae, in muscis et in *Junger-*
mannia catenulata crescunt; radicularum toris sub amphigastriis ortis arctissime huic et
 sibi invicem adhaerentes, caespites semipedales formant. Rami $\frac{1}{2}$ —1-pollicares propter
 folia patula convexiuscula canaliculati, quem adspectum etiam in planta sicca servant. Folia
 $\frac{3}{5}$ — $\frac{2}{3}$ lin. longa, latissima parte $\frac{2}{3}$ lin. lata, caulis lateri oblique adfixa, dorso convexa,
 apice decurva, margine ventrali arcuato, dorsali rectiusculo oblique descendente formam ovi
 transverse dimidiati habent, rigidiuscula, colore flavo-fusca. Areolae hexagonae, 5-, 8-, 7-gonis
 et rarius quadrangularibus intermixtis; folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato
 tineta incrassationem cellularum angularem et parietalem, poris pro brachiis sacculi primor-
 dialis versus limbum superiorem parietis relictis, monstrant. In his foliis linea terminalis
 inter cellularum membranam primariam hyalinam bene conspicitur et interdum spatio lenticulari
 interrupta est, quia kali causticum materiam, qua cellulae conjunguntur, solvit(?), et paries
 inde leviter contrahitur. Trigona hyalina intercalaria auctorum etiam in his foliis cellularum
 angulis externis acutis ideoque materiam, quae membranam cellulae primariam sistit, for-
 mantur. Amphigastria distantia, bifida sinu latiore interjecto, laciniis lanceolato-subulatis
 incurvis, margine unidentata, altero vel utroque latere coalita, subtus toro radicularum
 vestita, quae apice in patellas suctorias eleganter crenulatas dilatatae sunt. Innovationes e
 ventre prodeunt; ramulus fructifer multo longior, quam in *Chiloscyphis* solet esse. Perian-
 thium $1\frac{1}{6}$ lin. longum, parte ventricosa diametrum $\frac{3}{5}$ lin. habet, infra oviforme, supra in
 apicem triquetrum plicatum, labiis sinuatis angulato-dentatis. Pedunculus $\frac{3}{4}$ pollic. longus;
 capsulae valvulis ovali-lanceolatis. Folia involucralia majora, $\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{2}{3}$ lin. lata, ovata,

erecto-patula, ad medium fere perianthium circumdant; margine patent-recurvo subundata, apice repanda, et interdum margine ventrali una alterave lacinia dentiformi basin versus armata, quod et in foliis floralibus subsequentibus interdum deprehenditur. Amphigastrium involucrale cum folio altero tenui limbo coalitum, majus, bifidum-quadrifidum, laciniis elongato-lanceolatis in apicem subulatum curvatum abeuntibus, margine extus bilaciniatum. Planta mascula desideratur.

Tab. XIX. fig. 1. Pars caulis a dorso visa $\frac{1}{7}$ aucta. fig. 2. pars caulis a ventre visa cum amphigastriis altero latere concretis. fig. 3. perianthium apice triquetrum basi ventricosum. fig. 4. labium perianthii inter laminas vitreas expansum. fig. 5. folium involucrale alterum margine ventrali bidentatum et amphigastrium altero latere liberum. fig. 6. amphigastrium subinvolucrale (liberum) cum folii subinvolucralis parte.

X. *Trichocolea Dumort. (reformat.)*

Fructificatio feminea vel terminalis vel in dichotomia. Perianthium nullum. Calyptra fructigera et matura vel

- 1) tota libera, nuda, nec incrassata, basi tantummodo (et altius) pistillis abortivis obsita, foliis involucralibus et floralibus (minoribus et majoribus) circumdata et tota obvelata —

(*Jungermannia tomentosa* Sw. = *Trichocolea tomentella* β *tomentosa* Synops.
Hepat. p. 237.)

vel 2) metamorphosi completa (sc. cum toro pistillorum, foliis involucralibus nec non cum capitulo fructificationis hirtello omnino confusa) in involucrum teres coriacum hirsutum, apice pistilla abortiva ferens, mutata.

(*Jungermannia tomentella* Ehrh. = *Trichocolea tomentella* α et formae e Java et Nova Zeelandia, *Trichocolea mollissima* Tayl. et *Trichocolea lanata* Hook.)

Folia succuba, cauli oblique accreta. (Contra sententiam vulgarem omnium auctorum.)

Sectio I. laeviflora. Calyptra libera, vulgari.

1. *Trichocolea tomentosa* (*Sw.*) *Gott sche*.

Tr. caule procumbente, inter folia et amphigastria fere nudo, simpliciter pinnato, foliis succubis(!) semiamplexicaulibus cauli oblique aderetis pluri- (4—5-) partitis, laciniis bis terve tripartitis ad extremum capillaribus articulatis, amphigastriis bis bipartitis, laciniis bis terve tripartitis ad extremum articulato-capillaribus, fructu in ramulis lateralibus brevioribus terminali, calyptra globosa nuda (vel rarissime paucissimis ciliis adspersa) basi pistillis abortivis stipata, involucro obvelata, foliis involucralibus majoribus externe hirtiusculis.

Gott sche in Rabenhorst Hep. Europ. exsiccat. n. 272 cum icone calyptram nudam et aliam ciliis paucis involucralibus (?) consitam sistente.

Liebmann fandt denne Plante ved Yalali-Yagochi i Juni Maaned 1842 uden Frugt. (Hb. Liebmann. n. 264).

In exemplaribus fructiferis Peruvianis et Novo-Granatensibus aliis modus fructificationis, quam Neesius, cui sterilis planta tantum innotuerat, opinatus est. Plerumque in calyptra laevissima et nuda nihil nisi pistilla abortiva inveni; sed in exemplari, quod sub oculis habeo, 3 cilia articulis 4—6 composita praeterea video. Num haec cilia torum fructificationis prius circumsteterunt et quasi analogon rudimentarium sistunt ejus conditionis, quae in *Trichocolea tomentella europaea* observatur? Circum calyptram maturam nonnulla foliola minora (involucralia intima, in diagnosi nostra neglecta) semper inveniuntur; sequuntur involucralia majora et floralia, basi in annulum concreta. Calyptra, ut fieri solet, 2—3 stratis cellularum componitur, dum capsula 6 stratis constat, quorum extimum cellulas majores clariores, strata 4 sequentia cellulas minores parietibus hinc inde fuscis incrassatis notatas monstrant; stratum intimum fibris semicircularibus fuscis rite depictum est. Sporae subtetraëdrae, fuscae, externe granulosae; elateres bispiri, fibra fusca pellucida in tubulo hyalino.

Foliorum cuticula granuloso-aspera est; in cellulis disci hae asperitates lineares sunt, nec coctione cum liquore kali caustici laevigantur; incrassatio angularis nulla; tamen membrana secundaria colore violaceo facile a primaria, margine hyalino cellularum notata, dignoscitur, si folia cum zinco bijodato tinxeris. Saccus primordialis coctione in discum parvum contrahitur.

XI. Lindigia Gottsche.

Inflorescentia feminea epigena in apice caulis. Perianthium nullum. Perigynium carnosum, pendulum, radiculosum, pistillum perfectum cum pistillis abortivis intus fovens; calyptora tota libera (nec incrassata), basi vel altius pistillis abortivis cincta, fundo perigynii accreta; perigynii apex pilis parvis bi-triarticulatis hirtus; etiam canalis, qui ad cavitatem perigynii dicit, cellulis prominentibus angustatus est. Folia involucralia inclusa, floralibus minora.

Inflorescentia mascula?

Amphigastria nulla.

Adnot. In *Gymnanthis veris* Taylori, e. gr. *Gymn. Wilsonii*, *tenella* et *saccata* fructificationis conditio alia est. Inter folia summa vel involucralia torus genitalis nudus in caulis dorso reperitur; post foecundationem pistillum fructiferum cum portione caulis in sacculum oblongum carnosum pendentem commutatur, in cuius apice reliqua pistilla abortiva inveniuntur. Si e. gr. sacculum fructiferum *Gymnanthes tenellae*, 2 lineas longum, secundum longitudinem novacula discideris, antrum semilineare fructu immaturo (e capsula et pedicello cum involucello proprio constante) repletum videoas, calyptram autem non invenias, quia tota cum sacculo confusa est, unde patet, illud antrum calyptrae cavitatem sistere; iteratis experimentis etiam apicem pistilli fructiferi commutati antroque respondentis inter reliqua pistilla abortiva tori genitalis invenias. Hunc sacculum in *Synopsi nostra* apud *Gymnanthas* «perigynium» nominare noluimus, quia hac voce sacculos fructiferos reliquarum Geocalycearum et Calypogeiae, calyptram (totam vel ex parte) liberam basi vel altius pistillis abortivis obsitam intus foventes appellavimus.

1. Lindigia Liebmanniana Gottsche.

L. caule flexuoso dense caespitoso apice dichotomo, foliis adscendentibus obovatis cauli oblique adcretis integerrimis subintegerrimis, foliis floralibus undulatis apice incisodentatis, involucralibus minoribus interioribus apice denticulatis, calyptora libera (basi pistillis abortivis 8—12 circumdata) in perigynio carnoso apice ciliis parvis aspero.

Liebmann fandt denne Plante paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 10,000 Fod ved La Parada og omkring San Antonio de Huatusco (4500') i Departementet Vera Cruz i September. (Hb. Liebm. n. 64, 501 et 489 e. p.)

Plantae minutae 2—3-lineares, arcte caespitoseque intricatae. Rhizoma crassiusculum, flexuosum, repens, interrupte radicellatum et in plantis e La Parada flagella valida emittens. Rami adscendentes e basi et nonnunquam toto fere ventre fibrillas breviores longioresque

emittentes, simplices vel apice dichotomi, rarius iterato-furcati, basi foliis vel eorum vestigiis parcus vestiti, ad apicem saepe incrassati. Folia arctissime imbricata, adscendentia erecta, basi paullum oblique cauli adcreta, ovato-rotunda obovatave, concava, integerrima rarius apice repando subcrenata vel denticulo instructa, hyalino-viridia, interdum apicem versus purpurascentia. Sub lente fortiore ($\frac{400}{1}$) dentes folii e cellulis solitariis vel binis elevatis rotundatisque conformantur. Folia cocta cum liquore kalico et tincta cellulas stellari-angulatas violaceas cum circuitu hyalino monstrant, quae inter se solutae embolos angulares violaceos prominentes circa areolam violaceam intra membranam primariam habent. Stria hyalina inter cellulas latior, medio linea cellularum terminali optime conspicua percursa. Versus folii apicem cellulae hexagonales magis regulares, basin versus magis elongatae. Perigynium carnosum, 1 lin. longum, descendens, superne pilis brevibus ostium claudens. Calyptra in fundo perigynii tantummodo adcreta, ceteroquin undique libera. Capsula parva, ovalis, cinnamomea, intus fibris semicircularibus depicta; elateres bispiri, tenues; fibra spiralis angusta flavo-fusca. Semina flavo-fusca, laevia. Folia involucralia undulata, majora, interdum zona marginali hyalina (morbosa) circumdata, aequae ac floralia cellulis prominentibus rotundatis apice crenulato-denticulata.

Differt a *Gymnanthe Bustillosii* toto habitu, minore statura et foliorum figura apice magis truncata.

Tab. XX. fig. 1. Planta cum innovationibus duabus et fructificatione a latere visa $\frac{35}{1}$ aucta. fig. 2. sectio longitudinalis perigynii. fig. 3. pars caulis a latere visa inter laminas vitreas compressa. fig. 4. 5. folia hujus surculi apicalia. fig. 6. folia inferiora.

2.? Lindigia Mülleri Gottsche.

L. dense caespitosa, caule radicellis multis arctissime repente, foliis arctissime imbricatis semiverticali-patentibus concavis integerrimis ovato-lanceolatis, apice obtuso rotundatis, basi dorsali utrinque in medio caule contiguis, inflorescentia feminea epigena, foliis floralibus externis longioribus margine dorsali ciliato-dentatis, interioribus vel involucralibus minoribus ciliato-laciiniatis, fructu

α , foliis angustioribus linguaeformibus (fere omnibus in nostris exemplaribus erosis laesisve). Cum flore ♀.

β , foliis brevioribus apice obtusiore rotundatis; ejusdem texturae atque in α . Cum flore ♀.

Afdøde Frederik Müller fandt denne Plante ved Rio de Orizaba i Serra de Borrejo blomstrende i Juli (α) og Varieteten β iblandt *Fimbriaria elegans* i Nærheden af Vulkanen Orizaba.

Plantae caespitose crescentes radicellis ita arcte sibi et aliis Hepaticis affixae, ut plerumque caulis frangatur, si evellere eum studeas. Caules 3-lineares, cum foliis expansis $\frac{5}{6}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. lati. Folia arctissime imbricata, apice adscendentia, basin versus patentia, ovato-triquetra, $\frac{1}{2}$ lin. longa, parte latissima $\frac{2}{3}$ lin., apice $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{10}$ lin. lata, margine ventrali rotunda declivia, dorsali oblique sinuata vel repanda, apice contracto rotundata vel repanda vel subcrenata. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta eximiam imaginem praebent, cuius nullum praeterea exemplum cognovi. Dimidium folii posterius cellulas aliter incrassatas monstrat, quam dimidium anterius vel dorsale; series cellularum prope marginem ventralem 8 vel plures toto pariete incrassatae sunt et colorem obscuriorem habent; series cellularum prope marginem dorsalem incrassationem tantummodo in duobus parietibus oppositis (apicali et basali secundum folii longitudinem) habent, quod, cum parietes incrassati duarum cellularum contigui sint, singularem adspectum praebet, praesertim quia parietes laterales (secundum latitudinem folii) punctum tantum angulare obscurius tinctum monstrant. Anguli in cellulis solutis acuti et producti omnino triangula hyalina interstitialia auctorum explet.

XIII. *Leioscyphus Mitten.*

in Hook. Antarct. Voyage II. P. 2. p. 134. *Leptoscyphus* Mitten in Hooker Journal of Botany III. p. 358. n. 138. Gottsche Uebersicht p. 34 et 35 in Mohl et Schlechtendal Botan. Zeitschrift 1858. Beiblatt.

Leioscyphus Liebmannianus *Gottsche.*

L. caule elongato repente flexuoso ramosiusculo, foliis ovatis imbricatis (vel in ramulis gracilioribus microphyllis distantibus) cum amphigastriis ovatis bifidis (sinu lunulari interjecto) margine unidentatis tenui limbo coalitis, fructu terminali, perianthio oblongo inflato, ore compresso truncato bilabiato labiis undulatis integerimis.

Jungermannia Liebmanniana Lindb. et Gottsche in Syn. Hep. p. 668. n. 16. c.

Leptoscyphus Liebmannianus Mitten Hook. Journ. of bot. l. c.

Chiloscyphus fragilifolius Tayl. Hook. London Journ. of bot. 1848. p. 284.

Liebmann fandt denne Plante i de dybe Skove, som bedække Siderne af Cerro de Semopaltepec og i Chinantla (♀ og ♂); Frederik Müller samlede den i Omegnen af Vulkanen ved Aserradero de Santa Cruz; ogsaa iblandt Regelske Planter fandt jeg nogle Exemplarer.

Caules pollicares et ultra, parce ramosi, flavo-fusci, aliis Hepaticis irrepentes, e ventre innovantes, interdum ramos graciliores et microphylos foliis distantibus protrudentes. Folia ovata, horizontalia versus apicem adscendentio-conniventia, in planta fructifera erecto-patentia apice reflexa, integerrima vel margine subrepanda propter cellulas interdum paullum inflatas prominentes, margine ventrali arcuato cum amphigastriis tenui limbo ab altera parte plerumque latiore coalita, dorsali rectiusculo. Color flavo-fuscus, infra nigro-fuscus, foliorum novellorum viridis. Textura clarior, lumina cellularum rotunda; anguli incrassati cellularum adjacentium spatium pellucidum formant, quod Mitten in Flora Novae Zealandiae areolam intercalarem nominat («retis maculis majusculis intercalariibus saepe valde conspicuis»). Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta texturam fere *Jung. porphyroleucae* habent. Linea hyalina tenuissima inter cellulas membranam primariam tenuorem prodit; validae incrassationes in angulis margine interno rotundatae et lumen cellulæ sex-septem-radiatum secundum brachia sacculi primordialis saturate tinctum apparent, sed sacculi primordialis rudimenta tantum, ex coctione coagulata, figuram irregularē crenulatam exhibentia in media cellula haerent. Amphigastria ovato-quadrata, bifida vel bidentata sinu acutiore (in amphigastro involucrali) obtusioreve vel semilunato interjecto, laciniis nunc latioribus nunc unica cellularum serie subulatis, margine externo plerumque unico dente (margine involuto interdum latente) armatis, alteri vel utrique folio subjacenti coalita, basi radicellarum toro vestita. Flos masculus in ramis terminalis; folia perigonalia basi dorsali lobulum involutum habent, cuius in gremio unicum antheridium parvo subfultum pedicello latet. Perianthium terminale vel dorsale, si innovatio, quae intra et extra involucrum oboritur, e ventre provenit, 2 lin. longum, 1 lin. latum; in statu juniore campanulatum totum compressum, labiis plerumque reflexis, in adulto ad $\frac{2}{3}$ partes altitudinis cylindrice inflatum, ore compressum, ut margo dorsalis et ventralis appareat, undulatum, truncatum, labiis integerrimis vel subrepandis. Calyptra basi 12—14 pistillis abortivis stipata interjectis pilis triarticulatis. Elateres bispiri, fibrae laxius spirales. Folia involucralia ovato-rotunda, subintegerrima, subrepanda, undulata, apice patenti-reflexa, basi e receptione perianthii concaviora, versus basin ventrale interdum nonnullis denticulis parvis obsita; amphigastrium involucrale intimum, ad basin usque liberum, sed ibi tenuissima lacinia cum interiore margine foliorum involucralium coalitum; bifidum, laciniis elongato-lanceolatis dentatis, margine externo utrinque bidentatum.

Tab. XVII. fg. 1. Pars rami fructificantis $\frac{8}{1}$ aucta. fg. 2. Pars ramuli a ventre visa $\frac{17}{1}$ aucta. fg. 3. perianthium. fg. 4. calyptra. fg. 5. 6. folia involucralia. fg. 7. amphigastrium involucrale. fg. 8. amphigastrium subinvolucrale. fg. 9. folium perigoniale cum antheridio in axilla. fg. 10. par foliorum caulinorum cum amphigastro a dorso visum.

XIV. *Calypogeia Raddi.* *Synops. Hep. p. 197.*

1. *Calypogeia Trichomanis Corda.*

C. foliis subrotundo-ovatis obtusis aut subbidentatis explanato-imbricatis (flagellis ventralibus nullis).

α^3 *Sprengelii*, foliis magis ovatis aut dimidiato-ovatis dissitiusculis pallidioribus, amphigastriis distantibus minoribus.

Synops. Hep. p. 198. n. 1. α^3 .

I blandt andre Hepaticae, som Liebmann samlede paa Plantagen Hacienda de Mirador, fandt jeg nogle Planter, som staae midt imellem denne Art og *Cal. Peruviana*.

Foliorum latitudo paullo minor quam in stirpibus Europaeis, apices acutiores. Textura fere, qualis in planta Europaea. Folia cum liquore kalico cocta et zinco bijodato tincta in cellulis eandem formam irregularem linea tantum circumscriptam nec colore diversam monstrant, quam planta Europaea. Incrassatio angulorum nulla, interdum autem ad speciem obvia; cellulae inter se solatae angulos externos hyalinos prominentes habent, qui unà cum cuticula folii trigona interstitialia punctiformia componunt. In cellulis marginalibus egregie hoc videri potest; ubi duae cellulae convenient, margo externus in apicem parvum extollitur; accuratiore observatione videoas hanc prominentiam ex angulo hyalino utriusque cellulae prominente et e cuticula folii conflari. Capsula (exemplaris Europaei) e duobus stratis composita, quae coctione cum liquore kalico facile inter se solvi possunt; stratum interius fibris latioribus fuscis semicircularibus depictum est, quae si parietem exteriorem attigerunt, circumflectuntur et finibus paullum incrassatis, plerumque cum illis cellularum adjacentium alternantibus, externae cellularum faciei juxta parietem nodosum adspectum praebent. Stratum externum cellulis hyalinis quadratis latioribus tabulatis componitur, quarum parietes undulato-incrassati plerumque tres vel quatuor prominentias obtusas internas monstrant. Semina rotundo-triquetra laevia, majoris diametri quam elaterum latitudo; elateres binas spirales fuscas latores in tubulo hyalino illique adcretas clarissime monstrant.

2. *Calypogeia Peruviana Montgn. Nees.*

C. foliis ovatis apice angustioribus conniventi-bidentatis dentibus acutis, flagellis ventralibus microphyllis foliis bifidis conspersis.

Synops. Hepat. p. 200. n. 4.

$\beta.$ *subintegra*, apice foliorum innovationum et novellorum ramorum integro vel interdum acutiusculo, colore flavescente.

Synops. Hepat. p. 712. n. 4.

Liebmann fandt begge Former uden Frugt i Departementet Vera Cruz omkring San Antonio Huatusco (4500') ved Chistla, og paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') paa nogen Jord, voxende sammen med *Symphyogyna sinuata* og andre Hepaticae.

Folia oblonga, caulina, vix vel breviter decurrentia, ramea apicalia laxiora oblique ovata margine ventrali rectiusculo longe decurrentia, pleraque apice emarginato-bidentata, dentibus acutis longioribus vel brevibus obtusiusculis, nonnulla solummodo breviter emarginata vel omnino integra. Amphigastria parva ovata vel obtuse cuneata profunde bifida sinu obtuso laciniis acutis, nonnullis subdivergentibus, nonnunquam obsoleta. Textura foliorum qualis in praecedente; folia cocta et tincta inter cellulas lineam hyalinam et trigona interstitalia clarius monstrant, quam in *Cal. Trichomanis* Europaea. Incrassatio in angulis cellularum nulla; cellulae inter se solutae monstrant angulum hyalinum prominentem, quae prominentia simul cum superacente et subjacente cuticula trigona illa pellucida efficit, quae lucis transitum minus impediunt, quam membrana secundaria violaceo-tincta, itaque in primis in observatoris oculos incident.

In Varietate β *subintegra* folia oyato-elliptica, acuta vel rotundata, integerrima vel obsoleta emarginato-bidentula. Amphigastria majora, rotundo-ovata, patula, bifida, laciniis acutis vel obtusis. Textura qualis in α .

3. *Calypogeia laxa* Lindbg. et Gottsche.

C. caule repente, foliis laxis rotundo-ovatis decurrentibus brevissime bidentulis, amphigastriis minutis ovatis bifidis.

Synops. Hep. p. 713. n. 4. b.

Ikkun nogle Brudstykker bleve fundne iblandt andre Hepaticae, som Liebmann havde samlet ved San Antonio Huatusco og paa Plantagen Mirador. I den samme Pakke fandtes ogsaa *Cal. Peruviana*. (Hb. Liebm. n. 345 et 409. b.)

Folia subimbricata, apicalia et ramorum distantia subrotunda, ramea saepe oblique ovata longe decurrentia; rarius folia integerrima vel obsoleta emarginata, plerumque dentibus brevissimis biapiculata sunt. Textura qualis in *Cal. Peruviana*; cellulae magnae, marginales transversales longiores. Amphigastria minuta, subovata, bifida, laciniis acutis.

Differit a *Calypogeia bidentula* omnibus partibus minoribus, foliis minus densis, colore dilutiore, amphigastriis parvis ovatis.

Observ. Sub n. 239. b. et a Trapiche de la Concepcion nonnulla frustula adsunt, quae textura et foliis flaccidis longe decurrentibus a *Calypogeia laxa* recedunt, ceteroquin subsimilia sunt. Omnia autem, quae de *Calypogeiae* speciebus diximus, e frustulis sterilibus tantum hausimus, unde dubitationi cuidam omnia haec obnoxia sunt.

XV. *Lepidozia* N. ab E. L. G. *Synops. Hep. p. 200 et 713.*

1. *Lepidozia reptans* Nees ab Es.

L. caule repente pinnatim composito decomposito, ramis saepe flagellaribus, foliis decurvis subquadratis acute (bi-) 3—4-dentatis, amphigastriis subquadratis (bi-) 3—4-fidis, foliis involucralibus ovatis truncatis inaequaliter 4-denticulatis, perianthio incurvo ore dentato.

Synops. Hep. p. 205. n. 15. Lindenbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fascic. VI. VII. p. 31. n. 15. tab. V. Nees ab Es. Hep. Europ. III. p. 31—42.

β , *australis*, caule subbipinnato, foliis confertis planis oblongo-quadratis, dentibus longioribus obtusiusculis.

Synops. Hep. p. 714. n. 15.

Liebmann fandt Hovedformen α i Skovene, som beklæde Siderne af Cerro de Sempoaltepec og i Districtet Chinantla i Marts og Mai. (Hb. Liebm. n. 174, 402 et 424 e. p.) Varieteten β samledes ligeledes paa Cerro de Sempoaltepec i Juni. (Hb. Liebm. n. 152 ex p.)

Folia cocta et tincta lineam hyalinam inter cellulas valde perspicuam et trigona hyalina vel interdum tetragona interstitialia vulgaria monstrant, quae Neesius adesse negat (l. c. p. 37.) In cellula angulose delineata medium aream violaceam subrotundam videoas margine hyalino-roseo circumdatam, quem membrana primaria exterior (linea hyalina) ambit. Incrassationes cellularum non apparent, sed angulus cellulae declivis in apicem subhyalinum protrahitur, qui cum vicinis trigonum interstitiale componit; praeterea folii discus cuticulæ, ut in reliquis Hepaticis, obducitur. Capsula e 4 stratis composita est, quorum extimum cellulæ paullo majoribus hyalinis constituitur; omnium stratorum cellulæ incrassationibus fusco-flavis fulciuntur; stratum intimum fibris semicircularibus notatur. Semina fusca, granulosa. Elateres clarissime fibram spiralem duplicem intra tubulum hyalinum ostendunt. (Nees ab Es. l. c. p. 39 contrarium dicit.)

2. *Lepidozia cupressina Lindbg.*

L. caule procumbente subrepente simpliciter pinnato bipinnatove, ramis decurvatis apice capillari-attenuatis subheteromallis, foliis subverticalibus arce imbricatis oblique rotundo-ovatis convexis basi marginis dorsalis subrotundatis amphigastriisque rotundo-quadratis quadrifidis integerrimis, foliis involucralibus ovatis perianthiisque cylindricis arcuatis minute denticulatis.

Lindenb. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VI et VII. p. 42. n. 22. tab. VII.

Synops. Hepat. p. 207. n. 22.

β , *tenera*, gracilis, flaccida, virens, nonnunquam bipinnata.

Synops. Hepat. l. c.

γ , caule plerumque bipinnato, ramis obtusis vel breviter attenuatis.

Synops. Hep. p. 715. n. 22.

Fandtes paa Sartorius' Plantage Hacienda de Mirador (3000') i Departementet Vera Cruz. (Hb. Liebmann. n. 97, 111, 271 a, 221, og ligeledes en Mellemform imellem α og β , n. 223 og 353. Var. γ n. 350, 398 a og 534.)

Folia cocta cum liquore kali caustici et tincta zinco bijodato eadem cellularum structuram atque texturam monstrant, quam nostra *Lepidozia reptans*.

3. *Lepidozia Hampeana Lindbg.*

L. caule repente pinnato, ramis attenuatis apice capillaribus, nonnullis totis flagelliformibus foliis approximatis subverticalibus oblique cordato-ovatis integerrimis margineque parce denticulatis quadrifidis, laciniis subulatis subconniventibus, amphigastriis similibus convexis profundius fissis.

Lindenbg. et Gottsche Species Hepat. Fasc. VI. VII. p. 51. n. 26. tab. VIII.

Synops. Hepat. p. 208 et 716. n. 25.

Liebmann samlede denne Plante i det østlige Oajaca, i Districtet Villa alta, i de fugtige Bjergskove omkring Roayaga og Tonaguia i en Høide af 4000—5000 Fod, (Hb. Liebmann. n. 295. a), paa Cerro de Sempoaltepec blandet med *Chiloscyphus amphibolius* (Hb. Liebm. n. 176), og en Mellemform imellem Hovedformen og *Lepidozia cupressina* ved Talea (5000') og ved Santiago Amatlan (henimod 6000') i Departementet Oajaca (Hb. Liebm. n. 255. c. og 299) i Maanederne Juni og Juli.

Perianthium juvenile unicum visum in stirpe ad Roayaga-Tonaguia (n. 295) lecta. Folia involucralia adpressa, quadrifida, laciniis erectis acutis. Folia caulina cocta et tincta eadem texturam et cellularum structuram habent, quam *Lepidozia cupressina* ostendit.

4. Lepidozia truncatella Nees ab Es.

L. caule procumbente pinnatum decomposito, ramis divergenti-deflexis plerisque apice capillaribus, foliis imbricatis subverticalibus oblique trapezoideis quadrifidis basi marginis dorsalis truncata angulatis integerrimis unidentatisque, amphigastriis subquadratis quadrifidis basi utrinque subdentatis, foliis involucralibus ovatis perianthioque minute denticulatis.

Lindenbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VI. VII. p. 45. n. 23. tab. VIII.

β, foliis amphigastriisque subintegerrimis.

Synops. Hepat. p. 209 et 716. n. 27.

Liebmann fandt denne Form ved Talea (5000') i Departementet Oajaca i August 1842. (Hb. Liebm. n. 258 a. og 260 a.)

Cellulae foliorum majores; interstitium lineare latius; tamen textura et cellularum structura haud diversa a praecedentibus Lepidoziis.

XVI. Mastigobryum Nees ab Es. Lindbg. Gottsche.

Synops. Hepat. p. 214 et 717.

1. Mastigobryum arcuatum Lindbg. et Gottsche.

M. caule procumbente flexuoso dichotomo-fastigiato, foliis dense imbricatis devexis falcatis convexis integerrimis basi ventrali dilatatis, apice suboblique truncatis tridentatis, dentibus brevibus integerrimis acutis (inferiore minore), amphigastriis imbricatis rotundo-(vel ovato-) quadratis appressis patulisve truncato-emarginatis crenulatisque rarius integerrimis, fructu . . .

Lindenbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VIII. IX. p. 61. n. 30. tab. XII.

Synops. Hepat. p. 718. n. 29. c.

Liebmann fandt denne Art i de fugtige Bjergskove i Departementet Oajaca ved San Pedro Tepinapa (2000'—2500') voxende sammen med *Sphagnoecetis variabilis* og *Jungermannia crassifolia* i Juni 1842. (Hb. Liebmann. n. 279.)

Caulis $1\frac{1}{2}$ —2 pollices longus, basi simplex, tum iterato-dichotomus; rami flexuosi, supremi fastigiati; flagella creberrima 4—8 lineas longa. Folia arcte imbricata, valde devixa, margine dorsali arcuata, ventrali sinu majore curvata, basi dilatata subdecurrentia,

integerima vel leviter repanda, $\frac{3}{4}$ —1 lin. longa, basi $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin., apice $\frac{1}{4}$ lin. lata, apice oblique truncato tridentata, dentibus brevibus integerimis superiore et medio (vel medio solo) majoribus. Folia cocta et tincta praesertim versus basin egregiam imaginem praebent, cum cellulas hyalino-marginatas intus figurā stellatā violaceā depictas ostendunt. Sacculus primordialis brachia flavescentia e membrana secundaria violacea prominentia inter angulos violaceos monstrat, unde figura violacea fere 12 prominentias ad instar stellae habet. Membrana secundaria versus angulos cellulæ conicos embolos acutos demittit, qui, si ictu levi totus nucleus e cellula (nunc e mera membrana primaria residua constante) ejicitur, interdum rumpuntur et in angulis membranae primariae remanent. Latior zona roseo-hyalina nucleum circumdat, quam membranae primariae tribuam, etsi colorata est; si tamen hanc zonam membranae secundariae adnumerare velis, ut linea hyalina intercellularis sola primariam membranam exhibeat, tertiam membranam nucleum efficientem semperque obscurius tinctam statuere debeas. Amphigastria imbricata, nonnulla subrotunda, quadrato-rotunda vel quadrato-ovata, appressa, nonnulla patula, rarius integerrima, pleraque truncato-submarginata crenulatave, margine laterali interdum angulo-denticulata, $\frac{3}{8}$ lin. longa et aequa lata, ejusdem ac folia texturae.

Mastigobryum praeeruptum affine quidem, sed foliis magis obliquis longius dentatis et paullo aliter conformatis diversum est.

2. *Mastigobryum Müllerianum Gottsche.*

M. caule procumbente subdichotome ramoso vel saepius ramis unilateralibus, foliis imbricatis oblongo-ovatis, margine dorsali arcuato-devexis, ventrali sinuatis, apice inaequilater grossè tridentatis, amphigastriis imbricatis elongato quadratis rotundatis marginibus inflexis canaliculato-concavis apice retusis, perianthio erecto trigono sulcato ore dentato. — Gottsche Icon. Hepat. inedit.

β. *Liebmennianum*, amphigastriis rotundioribus foliorumque dentibus minoribus
— Sterile.

Frederik Müller fandt denne Plante med Fructification i Omegnen af Vulkanen Orizaba (Hb. Müller. n. 2361 et 2367); Varieteten β samlede Liebmann i Skovene, som bedække Siderne af Cerro de Sempaltepec, i Juni 1842.

Caulis $1\frac{1}{2}$ —2-pollicaris, in caespite intricatus, flexuosus, unilateraliter vel interdum subdichotome ramosus, flagellis multis flexuosis semipollicaribus cum aliis stirpibus cohaerens, cum foliis humectis $1\frac{1}{2}$ lin. latus. Folia flavescentia, $\frac{5}{8}$ lin. longa, basi $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ lin., apice $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ (in quadridentatis $\frac{1}{4}$ lin.) lata, imbricata, oblongo-ovata, devixa, margine dorsali arcuato leviter repanda, ventrali sinuata, subfalcata, apice grosse longiusque tri- (rarius

quadri-) dentata, dentibus et sinibus valde inter se inaequalibus. Textura foliorum eadem quae in reliquis; in foliis praeparatis cellulæ membrana secundaria paullo intra primariam contrahitur, quae ideo in angulis limbi rosei imaginem praebet; in cellulis mediis basalibus contractio membranae secundariae fortior, et ex his ictu levi totus nucleus extrudi potest. Amphigastria erecto-patentia, imbricata, marginibus incurvis canaliculato-concava, $\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ lin. lata, apice truncato leviter retusa. Perianthium 1 lin. longum, conicum, triquetrum trisulcatumque, ore dentibus capillaribus ornatum. Ramus fructifer 4 paribus foliorum vestitus; folia involucralia suprema longiora, ovata, apice pluridentata, dentibus brevibus latioribus diversiformibus; folia floralia sequentia breviora et ovato-rotunda, apice fere similiter pluridentata. Cetera desunt.

Varietas β forma intermedia est, amphigastriorum forma rotundiori magis ad *Mast. arcuatum* accedens, sed foliis basi non dilatatis speciei legitimae nostrae propior.

A *Mastigobryis* reliquis amphigastriis integerrimis apice retusis diversum est, a *Mastigobr. arcuato* proximo forma amphigastriorum longiore foliisque basi non tam dilatatis et paullo aliter configuratis differt.

3. *Mastigobryum Orizabense* *Gottsc.*

M. caule procumbente flexuoso ramoso, foliis laxe imbricatis deflexis ovatis integerrimis apice oblique truncato recto brevi-tridentatis, amphigastriis ovatis erecto-patentibus integerrimis apice retusis subemarginatisve marginibus anguste inflexis, perianthio . . .

Gottsc. Icon. Hepat. inedit.

Frederik Müller fandt denne Plante i Blomst i Districtet Orizaba voxende sammen med *Leioscyphus Liebmannianus*.

Planta altitudinem $1\frac{1}{2}$ poll. et expansa cum ramis latitudinem pollicis unius habet; rami principales $1\frac{1}{4}$ poll., secundi ordinis $\frac{1}{2}$ pollicem attingunt. Rami saepius ex altero caulis latere tantum provenientes plerumque secundi; flagella 4-linearia. Folia $\frac{5}{6}$ lin. longa, basi $\frac{1}{2}$ lin., apice $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$ lin. lata, in basi plantae arctius, in ramis laxius imbricata, ovata, margine dorsali arcuato-devexa, ventrali subrecta, apice brevi-tridentata, sinibus variis, dentibus vel rectis vel divergentibus; occurunt rarius etiam folia apice valde angustato tantum bidentata, vel rarissime acuto-lanceolata (praeter axillaria, in quibus haec forma normalis); folia breviora basi latiora, folia longiora formam semiovatam induunt. Amphigastria $\frac{1}{3}$ lin. lata, $\frac{1}{3}$ lin. longa et apice $\frac{1}{6}$ lin. lata, in basi plantae imbricata, in ramis contigua, erecto-patula, marginibus incurvis inflexisve canaliculato-concava, unde in planta ovalia vel ovata apiceque leviter emarginata apparent, inter laminas vitreas compressa ovato-rotunda fiunt et apice levem sinum inter lobos rotundos obtusos ostendunt; rarissime 2

sinibus apice praedita sunt. Flos femineus novellus tantummodo visus. Cellularum membrana secundaria in foliis praeparatis paullum contrahitur, unde primaria in angulis tanquam trigonum roseum videtur, quod, ubi tria vel 4 cellularum anguli convenient, parvum interstitium triquetrum vel quadrangulare («Zwickelmasche» Auctorum) sistit, sed lens fortissima taeniam albam — sc. membranas primarias conjunctas cellularum adjacentium — hoc interstitium auctorum percurrentem bene ostendit itaque omnem dubitationem solvit.

Amphigastriorum forma eorumque apice leviter emarginato a reliquis, foliorum forma eorumque dentibus minoribus a *Mast. Mülleriano* dignoscitur.

4. *Mastigobryum Taleanum Gottsche.*

M. caule procumbente parce ramoso, foliis oblongo-ovatis laxius imbricatis integerimis, margine dorsali arcuato-devexo leviter repandis, ventrali sinuato in basin dilatatam decurrente, apice obliquo plerumque inaequaliter (interdum grosse) tridentato, amphigastriis contiguis erecto-patulis ovato-rotundo-quadratis apice retuso (ramorum) vel 2—3 crenulato, perianthio

Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Liebmann fandt denne Plante voxende i Departementet Oajaca ved Talea (5000') tilligemed flere andre Hepaticae (Hb. Liebm. n. 255. ex p.). I hans Herbarium forefandt jeg dog kun nogle ubeskadigede større Grene.

Caulis bipollicaris cum foliis humectis $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ lin. latus, flagella multa semipollicaria et minora edit. Folia 1 lin. longa, basi $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ lin., apice $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{3}$ lin. lata, viridia, dentibus nunc majoribus (ut in *Mast. Hookeri*) nunc minoribus semper inaequalibus, medio plerumque majore, armata. Amphigastria duplo triplove caule latiora, $\frac{2}{5}$ lin. longa, interdum $\frac{1}{3}$ lin. vel interdum $\frac{2}{3}$ lin. lata, unde nunc ovata, nunc magis quadrata videntur, apice 3—4-crenata (crenulis in caulinis profundioribus) vel retusa vel levius crenata (in ramis novellis).

Species inter *Mast. Liebmannianum*, *Hookerianum* et *arcuatum* medium tenens, propter parcam copiam haud omni dubitatione libera.

5. *Mastigobryum acuminatum Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente dichotome ramoso, foliis imbricatis ovatis, medio elongatis subcurvatis, reliquis erectiusculis margine ventrali subrotundatis convexiusculis integerrimis apice acutis integris vel emarginato-bi-tridenticulatis, amphigastriis rotundo-oblongis subcordatisve appresso-patulis obsolete emarginato-2-3-denticulatis, fructu

Lindenbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VIII. IX. p. 69. n. 36. t. XII.

Synops. Hepat. p. 719. n. 32. b.

Liebmann samlede denne Plante i de skyggefulde Skove, som bedække Siderne af Cerro de Sempaltepec, i Juni 1842. (Hb. Liebmann. n. 176 b. Frustula.)

Caulis procumbens, $\frac{1}{2}$ —1 pollicem longus, tenuis, dichotome divisus, flagella emittens crebriora pro ratione plantae longissima. Folia imbricata, in ramulis plantisque junioribus approximata, ovata, in medio caule longiora et nonnihil curvata, reliqua suberecta, margine utroque curvato vel ventrali recto, convexiuscula, integerrima, apice rarius acuta indivisa, axillaria acuminata, caulina pleraque vel emarginato-bidentata vel inaequaliter tridenticulata, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longa, basi $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ lin. lata, apice angustiora et vel acuta vel truncata vel etiam subrotundata. Amphigastria triplo minora, contigua, appressa vel patula, rotundo-oblonga vel ob basin utrinque paullo dilatata subcordata, integerrima vel emarginata et obsoleta bi-tridenticulata.

Diffr. a *Mastigobryo Gottscheano*, quod habitu simile est, foliis brevioribus basi latioribus non curvatis sed plerisque ovatis vel ovato-elongatis vel integris acutis, vel emarginato-bidentatis vel subrotundatis tridenticulatis.

6. *Mastigobryum teretiusculum Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente basi indiviso superne iterato-dichotomo, ramis flexuosis fastigiatis; foliis arcte imbricatis e basi dilatata decurrente sublinearibus devexis falcatis margine dorsali interdum subrepandis, ventrali integerrimis ante basin sinuatis apice tridentatis dente inferiore saepe minore, amphigastriis imbricatis rotundo-oblongis subquadratisve apice truncatis crenato-repandis, fructu

Lindenbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VIII. IX. p. 86. n. 49. tab. XX.

Synops. Hepat. p. 720. n. 40. b.

Liebmann samlede denne Plante i Skovene paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Marts (Hb. Liebmann, n. 112, 162. b, 214, 288. b.), og paa Vulkanen Orizaba i en Hoide af 12000 Fod. (Liebmann in Hb. Schimperiano.)

Caules 1—2-pollicares, caespitose intricati, basi indivisi, superne iterato-dichotomi, rami valde flexuosi fastigiati. Flagella creberrima 2—4 lineas longa, tenuissima. Folia arcte imbricata, fere linearia, devixa, falcata, basi dilatata, margine dorsali integerrima vel subrepanda, ventrali ante basin sinuata, apice nonnihil angustiora tridentata, dentes integerrimi vel aequales vel inferior minutus, $\frac{1}{2}$ —1 lineam longa, basi parte latissima $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. lata, apice $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$ lin. lata. Amphigastria imbricata, rotundato-quadrata, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. longa, aequa lata vel paulo angustiora, basi medio cauli affixa utroque latere ampliata, apice truncata vel distincte quadricrenata vel obsoletius crenulato-repanda, nonnulla dente brevi ab

altera parte vel utrinque instructa. Lentibus fortioribus in hisce amphigastriorum prominentiis apicalibus ubique cellulam primordialem, in amphigastriis praeparatis non violaceam, sed semper decolorem vidimus. In foliis praeparatis textura omnino similis praecedentibus; in cellulis basalibus mediis majoribus saccus primordialis 6-brachiatus bene intra membranam secundariam roseo-violaceam cognoscitur, quae ut nucleus ictu levi e membrana primaria extrudi potest.

A *Mastigobryo Brasiliensi* foliorum forma, basi valde ampliata dentibusque minoribus facile distinguendum; maxime affine est *Mast. Martianum* G. MSS. e Brasilia (ab illustr. de Martio allatum in Hb. Reg. Monacensi), quod foliorum dentibus minoribus et amphigastriis paullo minoribus basi utrinque subauriculatis a nostro recedit, sed tantum localem formam nostrae plantae sistit; in neutro fructificatio cognita est.

7. *Mastigobryum Liebmannianum Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente dichotome ramoso, foliis imbricatis deflexi-divergentibus e basi late ovata linearibus margine obsolete crenulatis apice breviter tridentatis dentibus acutis integerrimis medio saepe majore amphigastriis subimbricatis rotundato-quadratis appressis apiceve patulis integerrimis apiceve truncato crenato-denticulatis, perianthiis apice trigonis rectiusculis ore denticulatis.

Lindbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VIII. IX. p. 74. n. 41. tab. XX.

Synops. Hepat. p. 719. n. 35. c.

Liebmann fandt denne Plante i de tempereerte Skove i Departementet Oajaca's østlige District ved Lobani (3000') i Juni Maaned med Frugt. (Hb. Liebmann. n. 201.)

Caulis procumbentes, flexuosi, 2—3-pollicares, e basi simplici dichotome divisi, flagella longa 6—9-linearia emittentes. Folia imbricata, e basi valde dilatata linearia, deflexo-divergentia, siccitate conniventia, basi ventrali decurrentia, margine subrepanda, apice tridentata, dentes breves latiores acuti integerrimi, medius plerumque major, $1\frac{1}{2}$ lin. longa, basi ampliata $\frac{3}{4}$ lin. lata, ramorum suprema minora minus arcte imbricata. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta egregiam imaginem observatori praebent, praesertim si cellulae folii mediae examinantur. Intra cellularum fines nunc bene conspicuos vides marginem hyalinum membranae primariae, includentem nucleum violaceo-fuscum angulosum substellatum — scilicet membranam secundariam coctione a membrana primaria solutam — quem levi ictu e cellula dirupta ejicere possis. Remanebunt nunc cellularum series nonnullae diruptae roseo-hyalinae, quae e mera membrana primaria consistere videntur, dum nuclei violacei ejecti circumnatant. In hisce nucleis saccus primordialis cum brachiis paullo prominentibus colore flavidо bene cognosci potest; nucleus violaceus totus ergo pro membrana secundaria incrassata haberi debet. Sacci primordialis brachia accurate

versus brachia saccorum primordialium in cellulis vicinis tendere — (vel ut botanice loquar, poros uniuscujusque cellulæ cum poris cellularum adjacentium convenire), eandem legem sequentia, quam botanici jam diu in plantis phanerogamis cognoverunt — et inter se solâ membranâ primariâ separari videas. In cellula hexagonalî hoc modo 5 prominentias nuclei violacei in utroque latere numeres, 3 angulos nuclei et duo brachia prominentia utriculi primordialis. Amphigastria subimbricata appressa vel apice patula, subquadrata vel subrotunda, $\frac{1}{3}$ lin. longa, aequa lata vel paullo latiora, apice truncata, rarius integerrima, plerumque vario modo crenato-denticulata, crenis paucis pluribus majoribus obtusis et minoribus in dentem acuminatis. Substantia tenerior, sed ejusdem structuræ ac folia. Ramulus fructifer brevissimus. Folia inferiora amplectentia, apice interdum patula, breviora, rotundo-ovata, 2—3-dentata; involucralia elongata, $1\frac{1}{6}$ lin. longa, $\frac{3}{4}$ lin. lata, perianthium ultra medium tegentia, appressa, denticulata apice quadrifida, laciis lanceolatis denticulatis subincurvis. Textura laxior, cellulae longiores. Amphigastria late ovata, tenera, inciso-lacera, margine integerrima vel parce denticulata. Perianthium 3 lineas longum, basi cylindrica 1 lineam diametro latum, tum attenuatum trigonum, erectiusculum vel modice curvatum, ore denticulatum. Capsula constat e cellularum stratis 5, quorum extimum cellulis duplo majoribus hyalinis tabulatis conformatur, quae fibris validis fuscis fulciuntur. Reliqua 3 strata intermedia cellulas aequa incrassatas habent; stratum quintum, intimum, fibris semicircularibus notissimis depictum est.

Affine *Mastigobryo Vincentino*, sed folia habet basi magis dilatata magisque curvata, amphigastria breviora interdum subdentata. A *Mastigobryo Hookeri* differt nostrum caule ramosiore, foliis magis confertis longioribus ad apicem angustatis amphigastriorumque forma.

8. *Mastigobryum affine Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente dichotomo, ramis divergentibus apice subincurvis, foliis dense imbricatis basi convexa deflexis apice divergentibus e basi latiore ovato-linearibus subfalcatis, margine integerrimis obsolete crenulatisve apice inaequaliter tridentatis truncato-trideticulatisque dentibus acutis subintegerrimis, amphigastriis imbricatis transverse rotundis appressis apice truncato-crenatis subdenticulatisve, perianthiis incurvis apice trigonis ore inciso-laciatis.

Lindbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VIII. IX. p. 93. n. 65. tab. XX.

Synops. Hepat. p. 720. n. 44. b.

β , foliis dentibus minoribus praeditis.

Liebm̄ann fandt denne Plante paa Tørvejord iblandt *Leucobryum* i Districtet Chi-

nantla i Departementet Oajaca ved Indianer-Landsbyen Teotalcingo (4000—5000') og i Departementet Vera Cruz ved Huitamalco (2500') i December 1841 og Juni 1842. (Hb. Liebm. n. 257. a, 266. a, 459, 594.)

Caulis pollicaris et longior, flexuosus, iterato-dichotomus; rami ramulique divergentes, supremi interdum fastigiati apiceque incurvati. Flagella crebra strictiuscula lineas 3—6 longa. Folia arcte imbricata, siccitate devexa, apice distiche divergentia, ovato-linearia, basi scilicet (praesertim ventrali) dilatata, tum vero aequilata, margine dorsali non-nihil arcuata, ventrali curvata, apice varie tridentata, dentibus in pluribus majusculis integerrimis acutis medio interdum majore, in nonnullis supremis praesertim et in varietate β minutis subrepando-crenulatis. Folia semilineam fere longa, $\frac{1}{4}$ lin. (basi $\frac{3}{8}$ lin.) lata, margine integerrima vel obsolete repando-crenulata. Retis maculae ad speciem rotundo-ovales, quia lumén cellularum tantum nec fines apparent, marginem ventralem versus majores, marginales ipsae minores subquadratae; in foliis cum liquore kali caustici coctis et zincio bijodato tinctis illas maculas videoes violaceas margine linearis hyalino circumdatae, qui membranam primariam sistit, quod adhuc magis eluet in cellulis majoribus mediis basalibus. In nonnullis figuram violaceam stellatam, qualem in *Mastig. arcuato* descriptsimus, sed minus elegantem vidimus, quia intervalla hyalino-rosea inter radios minora, itaque minus conspicua sunt. Amphigastria imbricata, transverse rotunda, rarius rotundo-oblonga, plana, appressa, margine laterali integerrima, apice truncata magis minusve repando-crenata, nonnunquam latere dente instructa. Textura laxior, areolae majores. Fructus in basi ramorum, interdum gemini. Folia rami fructiferi inferiora breviora, involucralia elongata, perianthium amplectentia, nonnulla apice patula, apice bi-trifida, laciniis acuminato-subulatis. Amphigastria rotundo-ovata. Perianthium sesquilineare, basi cylindricum, apice attenuatum trigonum, incurvum, ore inciso-laciñiatum. Reliqua non visa.

Mastigobryum australe, simillimum, distinguitur foliis minus curvatis evidentius eroso-denticulatis nec plurimis tridentatis, ut etiam textura densiore aequali.

9. *Mastigobryum stoloniferum* Lindbg. (Swartz).

M. caule adscendente apice dichotome-divaricato rigido, foliis arcte imbricatis ovato-lanceolatis basi valde dilatata convexis subfalcatis subrepandis apice tri- (rarius bi-) dentatis dentibusque inaequalibus acutis integerrimis, amphigastriis contiguis rotundo-quadratis subquadrirenatis planis, perianthiis ovatis inciso-ciliatis.

β . *intermedium*, forma intermedia inter *M. stoloniferum* et *Liebmannianum*.

Synops. Hepat. p. 227 et 720. n. 39. Lindenbergs et Gottsche Species Hepat. Fasc. VIII. IX. p. 78. n. 44. tab. 14. et p. 81.

Liebmann fandt denne Plante paa Plantagen Hacienda de Mirador i Marts 1842 (Hb. Liebm. n. 32), voxende iblandt *Leucobryum glaucum*.

Ex sententia beati Lindenbergii magis *M. Liebmannianum* adnumerandum est; in hoc tamen amphigastria magis quadrata et apice magis crenata sunt, quam in nostra forma, quae jam statura majore diversa videtur; folia in nostro magis arcuata etiam similitudinem cum *M. arcuato* praebent. Cum nonnullas plantas steriles tantum observare licuerit, et cum *Mastigobryum stoloniferum* Ldbg. secundum exemplaria originalia Swartzii in Herbario Weberiano duas formas foliis diversas amplectatur, specimina dubia hoc loco enumerare maluimus, quam speciem bonam obnubilare.

Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta pulchram imaginem praebent, quia maculas crenulatas violaceas hyalino-marginatas ostendunt.

10. *Mastigobryum denticulatum* *Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente dichotome subfastigiato, foliis imbricatis valde deflexis semi-cordato-ovatis, margine dorsali arcuato-devexus subrepandis, basi aliquantum dilatatis, ventrali leviore sinu subcurvatis, apice tridentatis, dentibus acutis integerrimis, medio interdum majore, amphigastriis subimbricatis contiguisve subquadratis margine laterali rotundatis patulis appressisve repando-dentatis, dentibus acutis angustioribus plerisque divergenti-reflexis, fructu

Lindenbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VIII. IX. p. 62. n. 31. tab. XII.

Synops. Hepat. p. 718. n. 29. d.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Oajaca imellem Totontepec og Sukkerplantagen Trapiche de la Concepcion ved Santiago Amatlan (henimod 6000') paa nogen Jord og jernholdigt Leer i Juli, uden Frugt. (Hb. Liebmann. n. 298.)

Caulis $1\frac{1}{2}$ pollic. longus, cum foliis $1\frac{1}{2}$ lineam latus, basi foliis emortuis vestitus, subinde iterato-dichotomus, ramis subfastigiatis, flagellis interdum ramulos emittentibus repens. Folia $\frac{3}{4}$ lin. longa, basi $\frac{5}{2}$, apice $\frac{1}{4}$ lin. lata, imbricata, ut plerumque nec foliorum apices liberos videoas nisi in ramulis supremis, margine dorsali devexa, subrepanda, margine ventrali curvato-sinuata, basi dilatata, apice tridentata, dentibus acutis integerrimis, sinibus secundum diversam dentium directionem vel angustioribus vel latioribus. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellulas materie grumulosa repletas — scilicet e sacco primordiali dissoluto proveniente — vel, si vacuae sunt, areolam obscuriorem in superficie ostendunt. Membrana secundaria tincta est et externe in angulis in prominentiam declivem abit minus tinctam, unde hac parte ambitus ejus subrotundus apparet, quia margo elevatus praesertim propter colorem obscuriores animadvertisit, angu-

lusque, qui fere alam clariorem praebet, praetermittitur. Omnia haec membranā hyalinā primariā circumvestiuntur, quae lineam hyalinam inter cellulas sistit. Praeterea in margine folii cuticula apparet ex coctione paullo emollita. Amphigastria caule paullo latiora, imbricata vel contigua, subquadrata, marginibus lateralibus rotundata, patula vel adpressa, margine supero 4—6 dentibus acutis interdum deflexis armata. Textura amphigastriorum eadem ac foliorum. Color viridis. Fructificatio junior tantummodo visa. Ramus fructifer parvus, pone amphigastrium e caule ortum trahens, 3—4 paribus foliorum componitur, folia floralia magna, ovato-lanceolata, bifida, segmentis uno alterove dente subulato instructis, circa folia intima, 10 pistilla foventia, cylindrice arte circumvoluta. Ulteriora desunt.

A *Mastigobryo Peruviano*, *Novae Hollandiae* aliisque affinibus statim distinguitur amphigastriis haud coalitis foliorumque dentibus integerrimis, a *Mastigobryo uncigero* et *planiusculo* foliis basi magis dilatatis differt. *Mastigobryum paradoxum* et *trilobatum* longius distant.

11. *Mastigobryum planiusculum* *Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente dichotome ramoso, foliis imbricatis ovato-linearibus (supremis ramorum ovatis) convexis subcurvatis margine dorsali subrepandis, apice truncato tridentatis, dentibus longioribus acutis integerrimis, amphigastriis contiguis vel remotis quadratis adpressis margine laterali repando-crenulatis, ad apicem apiceque ipso inaequaliter dentatis, dentibus interdum divergenti-reflexis, fructu

Lindenbg. et Gottsche Spec. Hepat. Fasc. VIII. IX. p. 63. n. 32. tab. XII.

Synops. Hepat. p. 718. n. 29. e.

Liebmman samlede denne Plante i det østlige Oajaca i Districtet Villa Alta i fugtige Bjergskove omkring Tonaguia og Roayaga (4—5000') i Juli, uden Frugt, men kun faa Exemplarer, og disse voxede blandt andre Hepaticae (Hb. Liebm. n. 295. b.)

Caulis 3 quadrantes pollicis longus, cum foliis $1\frac{1}{3}$ lin. latus, dichotome ramosus, parce flagellosus, flagellis 3—6 lin. longis. Folia disticha, planiuscula, ut in planta humectata omnino expansa videantur (nec deflexa ut in *Mastig. denticulato*), imbricata, e basi dilatata paullo elongata, (longiora quam in *Mast. denticulato*), margine dorsali subrepanda basi subarcuata, ventrali plus minus ante basin sinuata, apice tridentata, dentibus longioribus validis acutis integerrimis, medio interdum majore. Textura clarior quam in *Mast. denticulato*, ceteroquin conformis. Amphigastria caule fere duplo latiora, quadrata, suprema magis elongata, appressa, contigua vel remota, nonnulla imbricata, margine laterali crenulato-repanda vel rarius denticulo armata, apice interdum 4—6 dentibus validioribus ornata, interdum tantummodo crenato-dentata; in amphigastriis caulis primarii dentes obsoletiores fiunt,

in apice ramorum amphigastria majora et evidentius acutiusque dentata sunt et utrinque saepius dentem lateralem recurvatum habent. Inflorescentia mascula versus basin caulis nobis visa. Folia perigonalia obovata, concava, arcte imbricata, convoluta in iulum parvum, apice tridentata, basi subsaccata bina antheridia continentia.

A *Mastigobryo denticulato* differt praesertim foliorum forma linearis nec basi magis dilatata; *M. Sieberianum* foliis longioribus et amphigastriis accretis longius distat.

XVII. *Sendtnera Endlicher. Synops. Hepat. p. 238 et 721.*

1. *Sendtnera juniperina Nees ab Es. (Swartz.)*

S. foliis amphigastriisque oblongis, illis ultra medium, his ad medium fere bifidis sinu obtuso, laciniis lanceolato-falcatis secundis subdivergentibus basi ima ciliato-dentatis.

α , *Swartziana*. Swartz Flor. Ind. Occident. p. 1855.

β , *Neesiana*, foliorum laciniis lineato-acuminatis rectis.

Liebmann fandt denne Plante voxende sammen med *Plagiochila implexa* paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 8000 Fod i September 1841, og i de tætte Skove, som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec i Juni. (Hb. Liebmann. n. 184. b.) Fr. Müller samlede den ligeledes i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Asseradero de Santa Cruz i Juli (n. 2383) med Frugt.

Plantae laxe intricatae, 3 pollices et ultra altae. Caules adscendentes, flexuosi, foliis fusco-viridibus falcato-secundis vestiti. Folia $1\frac{1}{4}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{2}$ lin. lata, bifida, laciniis integerrimis, ad imam basin utrinque dentibus 5—7—10 latioribus et obtusis, plerumque apice cellula primordiali piriformi adhuc coronatis, varie curvatis armata. Stria latior e cellulis longioribus confecta discum folii a basi et deinde in partes duas divisa utramque laciniam in medio percurrit, unde haec pars clarior fit; versus margines cellulae minores diagonali tractu decurrunt. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tineta egregiam imaginem praebent. Cellulæ medianæ in ima basi fibra spirali percurruntur 15 aut in longioribus cellulis usque ad 22 ductus efficiente, quae præparatione illa violacea fit, quaeque interdum etiam ad instar vasorum retiformium inter spiras singulas vinculis parvis connectitur. In cellulis versus apicem insequentibus haec cellularum conditio magis sentiri quam clare observari potest, quia incrassationes oborientes imaginem obnubilant. Nec solum præparatione modo dicta haec res cognosci potest, sed etiam adhibito acido

sulphurico concentrato haec structura optime elucet, scilicet si folia inter laminas vitreas calefacias, ubi plerumque cuticula folii defluit, ut mera cellula cum inclusu primordiali brachiato remaneat. Fibra fere octodecim spiris in cellula circumducitur, plerumque cum fibra cellularum adjacentium alternans, ut juxta marginem duarum cellularum linea hyalina intermedia in processus alternantes transire videatur. In cellulis lateralibus hae fibrae modo polymorpho cellulam transcurrunt et elegantissimum cellularum ambitum punctis hyalinis decussatim depictum mentiuntur. Amphigastria bifida, ima basi prominulis dentibus obtusis 2—5 armata. Perianthium magnum, conicum, plicatum, basi ima cum foliis intimis involucralibus subcoalitum; folia floralia involucrum arcte imbricatum polyphyllum nec inter se coalitum componunt. Capsula rotunda, valida, haud semper in 4, sed etiam in plures valvas dehiscens; sectione transversali 7 (vel nonnullis locis 8) stratis composita apparet, quae omnia cellulas fibris crassis fuscis modo parietalibus, modo fere liberis fultas monstrant. Stratum extimum cellulas hyalinas habet majore externe cuticula secundum morem obductas; stratum intimum fibras notissimas semicirculares convexitate introrsus conversas monstrat. Elateres longiores spiram duplicem flavo-fuscum in tubulo hyalino habent.

Pace Viri Illustrissimi W. Hooker hanc speciem Swartzii diversam habeo a planta Scotica, quae tamquam varietas β ad priorem adjungitur. Desiderantur in planta Scotica dentes basales foliorum et amphigastriorum; folia minora et rigidiora sunt et aliam directionem sequuntur.

2. *Sendtnera Orizabensis Gottsche.*

S. caule erecto flexuoso flagellifero, foliis secundis ovato-acutis bifidis subintegerrimis, laciniis lanceolatis angulose repandis vel angulo uno altero in dentem producto, basi ima denticulis 2—5 recurvis obtusis armatis, amphigastriis minoribus subconformibus subintegerrimis, fructu

Liebmann fandt af denne Art nogle faa Planter, voxende iblandt andre Hepaticae paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 12000 Fod.

Plantae triplicares et ultro, nigro-fuscae, parce ramosae, propter folia secunda fere 1 lin. latae. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellularum structuram similem edunt, ac *Sendtnera juniperina*; tamen imaginem minus elegantem praebent, nec in adultis nec in junioribus cellulis fibram spiralem videre contigit. In cellulis longioribus mediis intra membranam hyalinam utrinque 8 fere embolos prominentes violaceos video; partes inter embolos minus coloratae sine dubio membranae secundariae adnumerari debent, quae praesertim in cellulis lateralibus in angulis valde incrassata ap-

paret. Habitu atque statura magis accedit ad *Sendtneram aduncam* Gottsche*), quae tamen dentibus basalibus caret.

3. *Sendtnera ochroleuca* Nees ab Es.

S. foliis amphigastriisque tri-quinquefidis basi ciliatis, laciniis amphigastriorum canaliculatis, perianthio campanulato propter folia floralia accreta ad speciem ramentaceo-hirsuto.

β. Mexicanana, amphigastriorum laciniis planis hinc inde ciliatis.

Synops. Hep. p. 240. n. 5.

Hampe fandt denne Art iblandt Mosser fra Mexico.

Capsula e stratis 5 composita est, quorum extimum cellulis duplo majoribus, incrassationes fuscas irregulariter juxta parietes positas monstrantibus, compositum est. Strata tria sequentia intermedia e cellulis minoribus, sed incrassationibus fusco-flavis quoque depictis, constant; stratum denique intimum fibras semicirculares notissimas habet. In fundo capsulae cellulae basi accretae, ceteroquin liberae majores cylindricae inveniuntur, quae perfectam fibram spiralem unicam latiore fuscum continent, quae in nonnullis nec basin nec apicem tubuli hyalini attingit. Praeterea cellulae videntur fibris circularibus distantibus expansae quasi e strato intimo capsulae confectae. (Exemplar Javanicum).

Nec in hac *Sendtnera ochroleuca*, nec in *S. rigida*, quam in schedula De Notaris omnium pulcherrimam laudavit, foliorum textura, si coquuntur et tinguntur, tantam cellularum elegantiam monstrat, quantam in *S. juniperina*, nec fibram spiralem in cellulis folii basalibus invenire contigit. Cellulae mediae tractu recto per folii longitudinem, subinde in duas strias pro laciniis divisae, decurrent, et intra membranam hyalinam imaginem crenatam violaceam edunt; cellulae laterales elegantiores figuram stellatam radiis obtusis violaceam monstrant.

*) *Sendtnera adunca* G. in Rabenhorst Hepat. Europ. n. 210.

S. caule erecto, foliis amphigastriisque bifidis secundis integerrimis (basi ima non denticulatis.)

α. Dicksoniana foliis brevioribus erecto-patulis, segmentis rectis acuminatis. Fusco-viridis.

Jung. juniperina *β.* Hook. Brit. Jung. tab. IV. et Supplement t. 1 (Foliorum imagines minus accuratae, cum nec cum Scoticis (*α*) nec cum Hibernicis (*β*) exemplaribus meis quadrent).

β. Hutchinsiae, foliis longioribus in secca planta aduncis, in humecta squarrosis, segmentis incurvis lanceolatis. — Flavo-fusca. — Hucusque tantum sterilis cognita. Altera in alteram transiens.

Habitat Var. *α* in Scotia in Monte Ben Voirlich (Gourlie), Ben Lomond, Ben Avon, Ben Lawes (Stuich-em-Lochan, W. Gardiner). Var. *β* in Killarney Hiberniae (legit T. Taylor) et in Scotia.

In foliis coctis et tinctis exemplarium Scoticorum in cellulis basalibus minoribus 8, in majoribus usque ad 15 ductus spirales medio plus minus coalitos dilucidissime video, quod in planta Hibernica minus contigit.

XVIII. Radula Nees ab Es. Synops. Hepat. p. 253.

1. Radula subinflata Lindbg. et Gottsche.

R. dioeca, caule repente regulariter pinnato bipinnato fasciculatoe, foliis imbricatis semicordato-ovatis obtusis integerrimis convexis apice deflexis basi ventrali subsinuato-complicatis, lobulo subquadrato acutiusculo margine libero depresso intus cauli oblique angustissimeque imposito, basi conice inflato, fructu in dichotomia rarius laterali, perianthiis elongato-obconicis compressis incurviusculis ore crenatis.

Variat. a, foliis involucralibus circa perianthii basin convolutis (n. 188).

b, involucralibus patentibus (n. 369).

Synops. Hepat. p. 724 n. 3. b.

Liebmman fandt denne Plante i Skovene, som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec, i Juni, ♂ og ♀, voxende sammen med andre Hepaticae. (Hb. Liebmman. n. 170, 177, 188, 369).

Caules caespitose inter muscos repentes, regulariter pinnati; rami subaequales, 1—2 lineas longi, densi, superiores nonnunquam elongati et pinnula iterum instructi vel etiam fasciculati. Folia imbricata, semicordato-ovata, obtusa, integerrima vel margine subrepanda, convexa, apice decurva, basi dorsali supra caulem protracta fere transverse cauli adnata et praesertim quum sicca sunt reflexo-squarrosula, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. longa, basi aequa lata, apice paullulo angustiora, basi ventrali subsinuato-complicata, lobulus majusculus, subquadratus, basi conice inflatus, apice acutiusculus, superiore parte vel margine libero folii disco adpressus, intus caulis latus paullum obtegens, ita ut caulis inter lobos foliorum fere omnino nudus sit. Folia involucralia caulinis similia, erecta, concava, plerumque convoluto-vaginantia. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tineta nucleus obscurum violaceum in cellulis hyalino-marginatis in imagine microscopica ostendunt. Levi ictu nucleus totus e cellula dirupta, nunc tota hyalino-rosea e mera membrana primaria consistente, ejicitur; nucleus violaceus, si dissiluit, discum flavum oblongum — saccum primordiale coagulatum — emittit; interdum in nucleo violaceo — membrana secundaria — duo strata colore pallidiore et obscuriore discernenda bene conspiciuntur. Statu morboso in nonnullis foliis hinc inde cellula augetur et margine crassiore super vicinas quasi excrescit et observatoris oculo audacius se objicit. Perianthium compressum, obconicum vel cylindrico-infundibuliforme, fere bilineare, basi attenuatum, incurviusculum, ore crenato-lobatum. Capsula e duobus stratis composita est; exterius cellulis hyalinis majoribus tabulatis, parietibus columnis horizontalibus fuscis (praesertim ad valvularum marginis validioribus et confertis) incrassatis constat; parietum lateralium adspactus nodulosus, quia incrassationes cellularum adjacentium sibi respondent, itaque striae laxe moniliformes longitudinales in

valvulis depinguntur; interius stratum flavum, cellulis oblongis, angustioribus, nusquam incrassatis neque fibris semicircularibus vulgatissimis depictis constituitur. Elateres bispiri, flexuosi, $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$ lin. longi, sed variae longitudinis; interdum unus alterve subfurcatus inventur. Semina angulato-rotunda, fusco-lutea, sporodermide laevi externa vestiuntur, intus nucleus subviridem habent, qui membrana tenuissima hyalina cinctus est.

Planta mascula in eodem caespite, pinnata vel subbipinnata, perigonis ad basin et in apice ramorum spicas ovales e 4—5 foliorum perigonialium paribus composita formantibus; in gremio cujusque folii perigonialis unum vel duo antheridia pedicello parvo fulta inveniuntur.

Radula physoloba, huic affinis, differt caule inordinate pinnato, foliis orbiculatis, lobulo majore altius folii margini coalito, apice obtusiore, perianthio breviore ore integrerrimo.

Tab. XX. fg. 1. Pars plantae fructiferae a ventre visa $\frac{1}{4}$ aucta. fg. 2. basis perianthii et folia involucralia a dorso visa. fg. 3. folia involucralia soluta a ventre visa.

2. *Radula Xalapensis Mont.*

R. dioeca, caule procumbente dense pinnatim ramoso flaccido, foliis imbricatis suborbiculatis obtusis integerrimis basi subinflata complicatis, lobulo lato trapezoideo-rotundo supra caulem producto, margine semicirculari undulato, basi in appendiculum curvatum obtusum transeunte et excisura acuta cauli adnato, fructu laterali (et terminali in ramulis Mont.), perianthio elongato infundibuliformi compresso ore truncato repando.

Synops. Hepat. p. 255 et 725. n. 6.

Liebm. fandt denne Art paa Cerro de Sempoaltepec i Juni (♀ n. 192, ♂ n. 184. b) og i Departementet Vera Cruz ved Huitamalco (2500—3000') i Mai (n. 446), uden Frugt. Fra Jalapa findes den i Hb. Funckii, og i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Aserradero de Santa Cruz samledes den af Frederik Müller med fuldkommen Frugt i Juli.

Planta mascula (184, b) tenerior est, tamen haud diversa censenda. Spica mascula ovata, lineam fere longa, vel basalis vel in medio ramo, e paribus foliorum perigonialium 4—6 composita. Folia perigonalia laxius densiusve imbricata, amplexicaulia, erecta, apice patula, basi longius complicato-ventricosa, superiora subaequiloba. Antheridia rotunda pedicello minutissimo insidentia, interdum bina in axilla folii.

Foliorum lobi, in icone Montagneana (d'Orbigny Voyage dans l'Amérique tab. 2 fg. 4) pessime delineati, forma fere convenient cum lobis foliorum *Radulae volutae Tayl.* (Synops. Hepat. p. 255. n. 5) et tum demum rite cognoscuntur, si folia a caule solvuntur; in medio

ferre sinus depresso diagonalis inter marginem inflatum, radicularum toro ornatum, et emphysema serpentino ductu in appendiculum descendens. Folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta saccum primordiale coagulatum ostendunt in cellulis violaceis hyalino-marginatis. Incrassationem angularem omnino nullam inveni vel rarissimam, sed maculae sex intensius violaceae planae marginem cellulae ornant, et si, quod continet cellula, demum est, in fundo aequa atque in tegmine medium discum intensius coloratum videas, quod tamen phaenomenon vulgatissimum est. Si autem levi ictu cellulae dirumpuntur, nucleus totus violaceus albo-marginatus ejicitur, et maculae intensius violaceae intus membranae secundariae adhaerent; remanet mera membrana primaria nunc hyalino-subrosea ubique aequaliter colorata, cum membrana primaria cellularum adjacentiam in situ priori continente. Maculae fundi igitur et tegminis ad membranam secundariam pertinent, quae in imagine microscopica margine crassiore albo nucleum totum violaceum ambit. Torus radicularum in foliis praeparatis tubos hyalinos, cujus lumen violaceum est, ostendit.

Perianthia lateralia tantummodo vidimus; juniora 1 lineam longa, basi in stipitem longiorem contracta, pernae formam induunt, ore plerumque margine laterali altero reflexa, labiis interdum introrsum flexis; adulta fere 3 lineas longa, elongato-obconica, ore $\frac{2}{3}$ lin. lata. In junioribus 16 pistilla numeravimus. Capsula e duobus stratis composita est; stratum exterius cellulas hyalinas columnis horizontalibus fuscis in parietibus irregulariter et interrupte incrassatas ostendit; stratum internum flavum, sine fibris semicircularibus notissimis, e longioribus, sed angustioribus cellulis sine ulla parietum et angularum incrassatione constat. Externe capsula, ut solet fieri cuticulâ tenuissimâ hyalinâ, acido sulphurico concentrato calido facile solvendâ, obducitur. Elateres $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$ lin. longi, tenues, fibram fusco-flavam duplicum in tubo hyalino ostendunt; acido sulphurico concentrato calido haud solvuntur nec fibrae distrahuntur. Semina majora, diametro longiore $\frac{1}{60}$ lin. metientia, tetraëdro-sphaerica vel in imagine microscopica rotunda, sporodermidem tenuem granulosam fuscescentem habent et materiem viridem, quae cum acido sulphurico concentrato calido in guttulas oleosas virides solvit, continent; in sporis contusis intra sporodermidem fuscescentem videas nucleus viridem grumulosum membranâ tenuissimâ hyalinâ circumdatum, qualem cl. Corda in *Radula complanata* (Sturm Flor. Germ. tab. 51. fig. 10, 11) depinxit et p. 154 descriptis, haud probante Neesio, ut videtur. (Nees ab Es. Hep. Europ. III. p. 154 in Observ. sub textu.)

Observ. Planta ex Huitamalco (n. 446) lobis minoribus appendiculoque minore paullum recedit ab exemplaribus sub n. 192 collectis.

3. *Radula quadrata Gottsche.*

R. dioeca, caule procumbente pinnatim ramoso flaccido, foliis dense imbricatis brevi-ovalibus obtusis integerrimis basi complicatis, lobulo majore transverse quadrato caulem omnino tegente vel superante margineque externo ad apicem folii versus reflexo, fructu terminali in ramulo proprio vel in dichotomia, perianthio subcylindrico compresso ore truncato subcrenato.

Synops. Hepat. p. 255. n. 7.

α^* , *propagulifera*, foliorum margine in gemmas disciformes excrescente.

β , *fusca*, caule ramosiore subbipinnato, lobulis foliorum pluribus minus reflexis, nonnullis acutis sive apiculatis.

Synops. Hepat. p. 725. n. 7.

Hovedformen fandtes paa Xalape krybende paa *Frullania hians*, og paa Plantagen Hacienda de Mirador (Hb. Liebmann. n. 41 b., 102, 116 b, 133). Frederik Müller fandt den steril ved Escumala i Omegnen af Vulkanen Orizaba; Varieteten β voxer i Oajacas østlige District Chinantla (Hb. Liebmann. n. 411).

Caules 1— $1\frac{1}{2}$ -pollicares, cum foliis 1 lineam lati. Perianthia $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. longa, ore $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ lin. lata. Spica mascula in ramulo proprio elongata e 14 paribus foliorum perigonialium componitur. Ulteriora non visa. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta in cellulis nucleus violaceum, saccum primordiale coagulatum includentem, ostendunt, qui levi ictu e cellula dirupta ejici potest. Nucleus interdum sex maculas intensius coloratas habet praeter fundum et tegmen saturatius violaceum. Cellula dirupta constat e mera membrana primaria nunc colore hyalino-subroseo aequaliter tincta; nucleus autem, e membrana secundaria confectus, praeter maculas obscuriores marginales, complures annulos colore paullum diversos interdum ostendit.

Varietas α^* *propagulifera* gemmarum evolutionem egregie ostendit. Margo lobi dorsalis, sub lentibus debilioribus ($\frac{1}{1}^5$) erosus, sub microscopio composito quadringenties augente imaginem perfectam praebet. Primo cellula quaedam marginalis augetur et prominet, sed mox paries obliquus illam in duas cellulas primi gradus dividit; sequitur partitio decussata secundum latitudinem, et processu iterato discus subrotundus fit 8 cellulis compositus basi coarctato cum cellulis matricalibus (gemmas nondum evolventibus) vicinis adhuc cohaerens; sed evolutione gemmarum vicinarum premitur solviturque et vitam propriam quaerens per turbam stipatam evadit, ut denique in substrato apto radiculos emittat et ex prothallo in plantam legitimam transeat. Nec alia conditio in nostra *Radula complanata* invenitur.

Varietas β *fusca* fortasse ad *Radulam affinem* referenda est, sed ramosior et flaccidior est, et foliorum lobuli majores, fere ut in *Radula Xalapensi*, magis nostrae opinioni favent.

4. *Radula mollis Lindbg. et Gottsche.*

R. dioeca, caule procumbente flaccido pinnato bipinnatove, foliis dense imbricatis brevi-ovalibus obtusis integerrimis convexis apice reflexis molibus basi complicatis, lobulo magno late ovato-quadrato margine interno supra caulem producto, apice externo truncato subundulato interdum (sinu vel plica) ad speciem in dentem producto, perianthio

β , *prolifera*, lobo dorsali foliorum margine vel eroso propter cellulas matricales in gemmas evolutas jam dejectas, vel lacinulato propter gemmas stipatas adhuc adhaerentes.

Synops. Hepat. p. 725. n. 6 b.

Liebmann fandt denne Art paa Vulkanen Pico de Orizaba i en Høide af 10000 Fod i September uden Frugt (n. 151).

Caulis procumbens, flaccidus, pinnatus vel bipinnatus, rami ramulique patuli. Folia dense imbricata brevi-ovalia, convessa, apice ad ventrem versus reflexa, integerrima, mollissima. Lobulus magnus, transverse ovato-quadratus, basi subinflatus et in conum prominentem pro radicularum toro (non semper obvio) protrusus, margine externo truncatus, vel interdum subundulatus, vel anguste reflexus et ad speciem propter plicam depressam in dentem apicalem productus, margine laterali interno rotundato supra caulem protractus. Folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta nucleus contractum circa saccum primordiale coagulatum flavum et margine latiore hyalino membranae primariae circum-datum in cellulis ostendunt.

Forsitan haec species major forma *Radulae quadratae* est, sed textura molliore, statura majore et lobulo latiore magis supra caulem protracto rariusque reflexo; a *Radula Xalapensi* statura ramosiore, foliorum compage molliore et lobulo minore differt; a *Radula reflexa* denique caule haud rigido, foliis brevioribus et lobulis apice non reflexis diversa est.

5. *Radula affinis Lindbg. et Gottsche.*

R. dioeca, caule procumbente rigidulo subpinnato, foliis imbricatis ovali-subrotundis obtusis integerrimis deflexis basi complicatis, lobulo quadrato margine interno caulem

tegente vel paullo superante subundulato, fructu terminali in ramulo laterali, perianthio subcylindrico compresso subincurvo, ore subcontracto subintegerrimo.

β. propagulifera, lobo dorsali foliorum margine eroso propter gemmarum evolutionem.

Synops. Hepat. p. 725. n. 7 b.

Liebmman fandt denne Art i Skovene i Omegnen af Plantagen Hacienda de Mirador i Februar med Perianthier. (Hb. Liebmman. n. 284.)

Caulis procumbens, 6—8 lineas longus, rigidulus, fulvus, parce ramulo uno altero instructus, rarius simpliciter pinnatus. Folia imbricata, brevi-ovalia, rotundata, deflexa, obtusa, integerrima, inferiora nonnihil decurrentia. Lobulus foliorum inferiorum minor, rotundo-quadratus, oblique truncato-acutus, propter torum radicularum in medio in umbonem obtusum elevatus, quod in lobulis foliorum superiorum minus appareat, quorum lobuli majores, basi magis dilatati, rotundati, haud raro supra caulem producti sunt (ut in *Rad. Xalapensi*) et dentem solitarium habent, interdum subreflexi, subundulati, plerique vero quadrati, exciso-truncati obtusi vel acutiusculi; nonnulli, praesertim in ramis fertilibus, reflexi. Textura densa, areolae inaequales; color fulvus. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta in basi cellulas figura violacea substellata depictas ostendunt, quae si levi ictu e nexu communi solvuntur, apiculos hyalinos in angulis insidentes — trigona interstitialia auctorum — egregie monstrant. In medio disco hanc imaginem in cellulis non observavi; nucleus violaceus saccum primordiale flavescentem coagulatum includens fere ad limites membranae primariae accedit, unde linea hyalino-rosea inter cellulas tenuissima appareat. Fructus terminalis in ramulo brevissimo vel ad speciem lateralis propter innovationem subinvolucralem, quae plerumque ex altero latere caulis intra lobos folii subperichaetialis (nec in axilla) oboritur. Perianthium $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. longum, ore $\frac{1}{2}$ lin. latum, compressum, subcurvatum dorso convexiusculum, e basi brevi angustiore lineare, fere ut in *Radula complanata*, sed angustius, sub ore subintegerrimo paullo contractum.

Affinis *Rad. Xalapensi* et *quadratae*; a priore distinguitur caule simpliciore rigidiusculo, lobulo minore minus dilatato subquadrato et nonnunquam acutiusculo, et perianthii forma; a *Rad. quadrata* quoque habitu simpliciore et lobulo minore, margine non vel raro reflexo, colore fusco-flavo.

Tab. XX. fig. 1. Pars plantae fructiferae a ventre visa $\frac{17}{1}$ aucta. fig. 2. perianthium. fig. 3. folia involucralia et basis perianthii a ventre visa.

6. *Radula pallens* Nees. ab Es.

R. dioeca, caule repente rigidulo, ramis adscendentibus dichotomo-divaricatis, foliis subimbricatis subrotundis obtusis integerrimis basi decurrente lobulatis, lobulo subquadrato apice (angulo) obtuse subtruncato subinflexo margine interno cauli breviter imposito eique oblique adnato, fructu e dichotomia lateralive, perianthio elongato subcylindrico compresso, basi attenuato, ore repando-crenato.

- α , foliis rotundioribus longius decurrentibus, lobulo margine interno secundum longitudinem cauli adnato;
- β , *minor*, viridis, foliis nonnullis oblongioribus, lobulis pluribus in acumen breve subtriangulare planum productis;
- γ , *Brasiliensis*, foliis oblongioribus vix decurrentibus lobulo oblique truncato anguloque depresso.

Synops. Hepat. p. 256 et 726. n. 8.

Var. α fandtes i Juni med unge Perianthier i Skovene paa Cerro de Sempoaltepec (Hb. Liebmann. n. 194, 582) med *Radula subinflata*; Varieteten β voxer ved Rio Nautla ved Ranchoen Cabrestros (Hb. Liebm. n. 442), og Varieteten γ fandtes i Nærheden af Santa Maria Tlapacoyo i Departementet Vera Cruz paa Plantagen Hacienda de Jovo (1800—2000') i Mai og paa Hacienda de Mirador (3000') i Marts (Hb. Liebmann. n. 562, 570, 574). Frederik Müller fra Bern fandt Hovedformen α i Omegnen af Vulkanen Orizaba, ved Aserradero de Santa Cruz i Juli med halvmodne Perianthier.

Folia (e n. 194) cum liquore kali caustici cocta et zincio bijodato tincta in cellulis rete albo marginatis areolam violaceam subrotundam — membranam secundariam contractam et solutam — ostendunt, quae in medio discum obscurioreum — saccum primordialeum coagulatum — habet, qui versus basin folii saepius brachia sua tamquam puncta hyalino-lucentia et ante nucleus violaceum prominentia monstrat. Cellula levi ietu dirupta totum nucleus ejicit, sed colore roseo-hyalino imbuta est, dum paries erectus observatori ob-versus colore hyalino-albo splendet. Folii margo sub lentibus fortius augentibus ($\frac{3}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{0}{1}$), subrepandus, cellulas minores extus paullo latius albo-marginatas habet, quia cuticulae duplicatura ad membranae primariae latitudinem accedit. Capsula e duobus stratis componitur; stratum interius e cellulis oblongis angustis flavescentibus parietibus lateralibus punctiformi-incrassatis constat; stratum exterius e cellulis latioribus quadratis tabulatis hyalinis, marginibus lateralibus fortius sed interrupte incrassatis cum adjacentibus striam monili-formem fuscam longitudinalem formantibus, constat. Semina rotunda, in juventute quaterna, in cellula matricali ventricoso-emarginata; matura exosporio fuscescenti-flavido laevi circum-data, nucleus viridescentem in endosporio hyalino ostendentia. Elateres flexuosi, $\frac{1}{9}$ — $\frac{1}{8}$ lin. longi, fibram spiralem duplarem fuscam arcte contortam habent.

7. *Radula flaccida* *Lindbg. et Gottsche.*

R. dioeca, caule repente applanato pinnatim ramoso, ramis patentii-divergentibus, foliis subimbricatis ovali-ovatis obtusis integerrimis planis, basi decurrente lobulatis, lobulo subquadrato inflato, margine interno cauli adnato, apice (angulo) triangulari-acuto, fructu in dichotomia laterali, perianthio elongato-conico compresso, lasi valde attenuato, ore crenato repandove.

β, propagulifera, cellulis marginalibus foliorum in gemmas disciformes exscentibus.

Synops. Hep. p. 726. n. 8 c.

Liebmann samlede denne Plante i Nærheden af Santa Maria Tlapacoyo i Departementet Vera Cruz i Skovene paa Hacienda de Jovo (2000') paa et Psychotria-Blad (Hb. Liebmann. n. 533) med Perianthier.

Caulis repentes, applanati, foliis, quibus innascuntur, arctissime appressi, ut et madefacti illaesi vix separari possint, simpliciter pinnati vel, quod saepius accidit, bipinnati. Rami patentii-divaricati, breves, alii elongati, 6 lineas ad pollicem longi. Folia subimbricata, basi se tegentia, apice plerumque aliquantum a se invicem distantia, plana, subovata vel brevi-ovalia, obtusa, integerrima, nonnulla ob marginem ventralem rectiusculum aliquantum obliqua, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ lin. lata, basi decurrentia et in lobulum complicata, parvum, subinflatum, secundum longitudinem caulis lateri adnatum, acutum vel angulo in apicem breviorem longioremve triangularem productum. In foliis cum liquore kali caustici coctis et zinco bijodato tinctis cellulae rarius nucleus violaceum subcontractum ostendunt, quare areolam violaceam aequaliter tinctam rete albido circumdatam videoas; tamen hinc inde exemplorum invenias sufficientem numerum, quae et haec folia eandem texturam quam reliquarum Radularum habere satis superque probent.

Spicae masculae in ramulis lateralibus ejusdem(?) plantae terminales vel caule continuato inferne caulem cingentes, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longae, ovato-oblongae vel cylindricae; folia perigonalia arctius imbricata vel laxius disposita, 6—10 paria, caulinis similia, sed lobulus ventricosus ad apicem brevem obtusum usque adnatus. Folia involucralia erecta, basi perianthio adpressa, angustata. Perianthium elongato-conicum, compressum, lineam et quod excedit longum, basi valde attenuatum, ore crenato-lobatum. Capsula ex duobus stratis composita, quorum exterius cellulas tabulatas majores hyalinas, parietibus lateralibus columnis horizontalibus fuscis crassioribus firmatas, ostendit. Semina fuscescentia, rotunda, exosporio tenui subgranuloso vestita; elateres in tubulo hyalino duplcam fibram spiralem arctius contortam fuscam habent.

Plantam quoque in folio Caladii (n. 54!) inventam *Radulae flaccidae* ad numero, sed

vix est applanata foliisque minus arce adpressa; folia ipsa breviora et lobulorum anguli apiculati vel in acumen longum producti.

Proxima est *Radulae tenellae* *), sed lobulo non in bullam conicam inflato facile distinguitur; a *Radulae pallentis* varietate β minutia, ramificatione, perianthio longissimo basi valde attenuato, a *Radula complanata* perianthii forma et perigoniorum situ differt.

8. *Radula macrostachya Lindbg. et Gottsche.*

R. dioeca, caule procumbente rigidulo parce ramoso, foliis subimbricatis contiguisse ovalibus obtusis integerrimis basi decurrente complicatis lobulo subquadrato margine interno cauli adnato, apice (angulo) triangulari acuto subinfexo, perianthiis elongato-obconicis compressis basi attenuatis incurvis ore crenato-lobato.

Synops. Hepat. p. 726. n. 8 b.

Den voxer paa Træbark og blev funden paa Plantagen Hacienda de Jovo i Mai med halvmoden Frugt. (Hb. Liebmann. n. 568.)

Caules 6 lineas ad 1 pollicem longi, procumbentes, parce ramosi, rigiduli. Folia laxius imbricata vel contigua, semi-subverticalia, divergentia, oblonga, obtusa, integerrima, basi decurrentia et subitus complicata, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ lin. lata. Lobulus saccatus, cauli secundum longitudinem margine interno adnatus, apice (vel angulo) triangulari acutus, saepius inflexus. Textura foliorum ut in praecedente. Fructus terminalis, lateralis vel in dichotomia subsessilis. Folia involucralia caulinis similia, adscendentia. Perianthium 1 lineam longum, infundibuliforme sive elongato-obconicum compressum, basi attenuatum, ore crenato-lobatum, $\frac{1}{3}$ lin. latum. Spicae masculae in eadem et in diversa planta, $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longae, laxae; folia perigonalia (paria 6—10) valde iuflata, in lobulum saccatum producta apice brevi tantummodo libero patulo rotundato.

Sterilis aegre a *Radula pallente* minore distinguenda, sed perianthii forma et spicis masculis longissimis differre videtur.

*)

Radula tenella *Gott sche* *Mss.*

R. dioeca, caule repente applanato pinnatum ramoso, ramis patent-divergentibus, foliis subimbricatis ovatis obtusis integerrimis, basi decurrente sinuato-complicatis, lobulo subquadrato basi media in bullam conicam vel brevi-cylindricam radicelligeram inflato, margine interno cauli acreto, apice (angulo) plus minus prominulo vel omnino deflexo, fructu terminali sed innovationibus utrinque abortis majoribus ad speciem in dichotomia, perianthio elongato-obconico compresso, basi attenuato, ore repando; inflorescentia mascula in ramulis propriis, spicam cylindricam ex 8 paribus foliorum perigonialium conflatam formante. — *Gott sche* *Icon. Hepat.* *inedit.*

In insula Trinitatis legit botanices indefessus cultor hortique botanici director H. Grüger.

9. Radula conferta Lindbg. et Gottsche.

R. dioeca, caule caespitoso dichotomo-pinnato, ramulis supremis confertis, foliis imbricatis squarrosulis subrotundis oblongioribusque subfalcatis convexis obtusis integerimis, apice reflexis basi in lobulum subquadratum complicatis acutiusculum (lobis foliorum floralium 3—4 alternatim imbricatis), fructu terminali, vel superveniente innovatione ad speciem laterali, perianthio subcylindrico compresso basi attenuato, ore repando.

Synops. Hepat. p. 729. n. 10 e.

β , laxior, foliis laxius imbricatis.

Liebmann samlede denne Plante i Februar med ♀ Blomst (Hb. Liebm. n. 332) paa Hr. Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000'), og den laxere Form β sammesteds i April med uddannede Perianthier. (Hb. Liebm. n. 9.)

Caules dense caespitosi, subpulvinati, semipollicares, basi dichotomi, rami divaricati, laxius sed apice confertim pinnati, ramuli apicales congesti, $\frac{1}{2}$ —2 lin. longi. Folia inferiora caulis et ramorum laxius disposita, superiora arcte imbricata, squarrosula, subrotunda, convexa, margine inprimis apice inflexa, integerrima, obtusissima, margine ventrali subsinuata et in lobulum complicata quadratum acutiusculum adpressum; nonnulla folia inveniuntur fere oblonga sive obovata, apice magis reflexa, margine ventrali evidentius sinuata, fere falcata, lobulo oblongo truncato-rotundatove; folia $\frac{1}{2}$ lin. longa, vix vel paululum angustiora. Lobulus margine interno ad $\frac{1}{3}$ latitudinis fere cauli impositus eique oblique adnatus est, sed in ramis fertilibus augescit et in 3 vel 4 paribus foliorum sub involucro sequentibus medium caulis transgreditur et lobuli foliorum alternatim imbricata sunt. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellulas monstrant pallide violaceas rete hyalino-albo distinctas et in medio nucleum violaceum foventes, in quo praesertim in basi folii saccum primordiale cum brachiis suis interdum observare, plerumque autem ex rudimentis suspicari magis quam videre possis; nucleus e cellula ejici potest et cellula dirupta, quae nunc hyalino-rosea fit, e mera membrana primaria constare videtur, nisi propter colorem eam tenuissimo strato membranae secundariae obtegi statuere malis, cum parietes cellularum observatori obversi rete omnino album inter cellularum areolas hyalino-roseas depingant.

10. Radula Mexicana Lindbg. et Gottsche.

R. monoeca, caule procumbente dichotomo-bipinnato rigidiusculo, foliis imbricatis oblongo-rotundis subcordatisve obtusis integerrimis et obsolete repando-crenatis, lobulo subquadrato basi inflato, margine interno cauli adnato, apice (angulo) plano subtriangulari

acutiusculo, fructu vel terminali, perigonis sub eo obviis, vel in dichotomia sine perigonis, perianthio elongato-obconico recto basi attenuato ore subrepando.

Liebmann fandt denne Plante i Nærheden af Plantagen Hacienda de Mirador ved Chistla i Departementet Vera Cruz. (Hb. Liebmann. n. 478 e. p.)

Caules caespitosi, procumbentes, semipollicares, dichotomo-bipinnati, rigidiusculi. Folia imbricata, nonnihil deflexa, oblonga, subrotunda oblique subcordatave, obtusa, integrerrima vel obsolete repando-crenata, in lobulum complicata cauli adnatum subquadratum, basi subdecurrente aliquantum inflatum, apice planum subtriangularem acutiusculum rarius subinflexum. In ramulorum foliis lobuli magis inflati, breviores, apice saepius inflexi. In foliis coctis cum liquore kali caustici et zineo bijodato tinctis nucleus lentius contrahitur, unde haud statim post praeparationem apparet; ceteroquin textura folii eadem est quae in reliquis Radulis. Fructus dispositio triplex est; invenitur enim in dichotomia et tum solis binis foliis involucralibus circumdatur perianthium; si autem terminalis in ramulo laterali est, inveniuntur sub binis foliis involucralibus folia perigonalia plura, quorum numerus variat; si denique fructus lateralis est, folia perigonalia sub perichaetio in una eademque stirpe vel adsunt vel desunt. In exemplari, quod ante oculos habemus, invenimus 2 ramos fructiferos sub perichaetio folia perigonalia habentes et in dichotomia horum ramorum fructificationem solis foliis involucralibus circumdatam. Interdum etiam innovatio sub involucro oborta perigoniorum geniturae obstare videtur. Folia involucralia caulinis similia, apice patentia. Perianthium $1\frac{1}{2}$ —2 lin. longum, basi attenuatum, ore $\frac{1}{3}$ lin. latum, obsolete crenatum; in uno exemplari monstrositatem observavimus, cristam internam per totam perianthii longitudinem decurrentem, superne latiore marginaque libero repandam. Fructus semimaturus semina quaterna adhuc in cellula matricali emarginata, interjectis elateribus nondum fibra spirali depictis, monstrabat. Inflorescentia mascula sub ipso flore femineo in ramulis invenitur et perigonia, ut videtur, semper impari numero (2 + 3 vel 1 + 2) adsunt; haec dispositio nostrae *Radulae complanatae* affinis est, quae tamen fructificatione in dichotomia carere videtur.

Radula complanata, cum qua conjunctione florum ♂ et ♀ commutari possit, perianthii forma et statura majore diversa; reliquae *Radulae*, quae lobuli et perianthii forma huic accedunt, perigonis in ramulis propriis (nec sub ipso perianthio obviis) diversae sunt.

11. *Radula complanata* Dumort.

R. monoeca, caule repente vase subpinnatim ramoso, foliis brevi-ovalibus obtusis integerrimis basi in lobulum quadruplo minorem complicatis angulo rotundato margineque interno cauli ad $\frac{1}{3}$ imposito, fructu terminali, perigonis sub involucro semper obviis, perianthio elongato cylindrico compresso ore repando.

Synops. Hepat. p. 257. n. 11. Nees ab Es. Hepat. Europ. III. p. 146—156.

Liebmam fandt denne Art steril paa Plantagen Hacienda de Mirador.

Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta areolas violaceas in rete albo, cujus anguli triangulo lucente notati sunt, ostendunt, quam imaginem microscopicam philosophi botanici varium in modum explicaverunt. Areola violacea nucleus est, membranā secundariā ex nostra sententia confectus intusque saccum primordiale ejusque succum in corpus flavum coagulatum foyens. Quo nucleo levi ictu e cellula dirupta ejecto, membrana, quae nunc cellulam constituit, primaria esse debet; ea vero rete format, unde et hoc pro membrana primaria haberi debet. Hanc nostram opinionem sequitur etiam clar. botanices professor Wigand (Intercellularsubstanz und Cuticulae p. 20, 21, et in »Botanische Untersuchungen» p. 74. tab. III. fg. 29); clar. Schacht in scriptis suis (Pflanzenzelle p. 81 et in »Lehrbuch der Anatomie und Physiologie etc. I. p. 116, 117. Tab. III. fg. 7) hoc rete e materia intercellulari confici statuit; cui tamen sententiae viri amicissimi assentiri nequeo. Iconem ejus (Lehrbuch t. III. fg. 7) paullo aliter interpretor. Cellulæ dupli linea confiniuntur; linea interna maculam violaceam — sc. membranae secundariae limitem-denotat, e cujus gremio discus succi coagulati perlucet; linea externa limitem cellulæ, sc. membranae primariae, ostendit, quae propter microscopiorum insufficientiam in cellulis vicinis communis appareat nec hucusque in duas solvi potest. Ubi cellulæ inter se solvuntur (y) parietes cellularum aequaliter incrassatos esse, dicit Schacht, et cum membranam primariam exteriorem esse credat, in *Radula complanata* vinculum album materiae intercellularis deesse hancque materiam in minutissimum trigonum angularum contrahi scribit. Nescio cur hoc trigonum luceat; tamen cum in angulis cellularum solutarum ut apiculus haereat, quem nunquam chemice separare potui, (Schacht Anatomie etc. p. 115: «Dagegen kann man das erwähnte Band, welches der Schwefelsäure länger als die Zellwand widersteht, so ziemlich isoliren, tab. III. fg. 4 x.»), membranae primariae particulam habere malo; sed tamen tacere nequeo, me in praeparatis Schachtii rete intercellulare pini piceae, quale in tabula sua depingit, liberum et ab omnibus cellulis solutum summa cum voluptate et admiratione vidiisse.

Flos femineus gemma terminalis est in ramulo masculo, qui vocatur, i. e. perigonia

cum antheridiis semper sub ipsis foliis involucralibus in hac specie inveniuntur. (Gottscche in Mohl et Schlecht. Bot. Zeitg. 1861. p. 3.)

Capsula e duobus stratis composita est; stratum interius, flavescens, e cellulis angustioribus oblongis constat, quarum parietes laterales punctis fuscis plerumque cum vicinis convenientibus incrassati sunt; fibram tamen semicircularem nunquam vidi nec rudimentariam, quare sententiae Neesii (Hep. Europ. III. p. 154) assentire nequeo. Stratum externum cellulis tabulatis hyalinis, ex incrassationibus validioribus fuscis parietum colorem suum accipientibus, componitur. Cum incrassationes tantum in parietibus laterilibus adsint (variae quidem formae, modo moniliformes, modo oblongae majores) et in cellulis vicinis plerumque sibi convenient, valvula tota externe striis longitudinalibus depingitur; in valvularum marginibus incrassationes adhuc densiores et validiores sunt. Semina fusca, subtetaëdro-rotunda sporodermidem granulatam tenuem et nucleus subviridem, qui membrana tenuissima hyalina continetur, ostendunt. Elateres fibram duplificem in tubo hyalino habent, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longi.

Cl. Hofmeister in libro suo (Vergleichende Untersuchungen etc. p. 42) capsulas semimaturas *Rad. complanatae*, ut et plurimarum Jungermanniarum, e duobus stratis constare, quorum interius plerumque in fructu maturante liqueceret et a sporis augscentibus depelleretur, scripsit, qui status tamen, si re vera existit, transitorius tantummodo esse potest, cum capsula matura hujus plantae (et aliarum Jungermanniarum, quamquam stratorum numero valde variantium) ad minimum duo strata omnino diversa et bene distinguenda dilucide monstrat.

XIX. Madotheca Dumort.

1. Madotheca Mülleri Gottsche.

M. caule flexuoso procumbente alternatim pinnato nudo, ramis longitudine inaequalibus, foliis oblique ovatis acutis subimbricatis apice acuminatis vel plus minusve denticulatis margine ventrali anguste recurvis, lobulo linguaeformi angusto canalis dimidium fere aequante extus repando intus versus basin exciso-dentato, amphigastriis linguaeformibus apice truncato retuso denticulato vel rarius execto marginibus repandis basique decurrente dentatis, fructu in ramulis parvis lateralibus, perianthio (juniore) compresso ore dentato, foliis involucralibus acuminatis longius dentatis, amphigastro involucrali latiore apice emarginato longius dentato.

I Omegnen af Vulkanen Orizaba fandt Fr. Müller denne Plante iblandt andre Mosser.

Caules 6-pollicares fusco-flavescetes cum foliis fere $1\frac{1}{2}$ lin. lati; rami longitudine variantes, pollicares et ultra, profundiores aequae ac caulis pinnati. Folia laxe imbricata, 1 lin. fere longa, basi $\frac{3}{4}$ " lata, viridia, ovata, in dentem longiorem acuminata vel apicem bidentulum, vel utrinque uno altero denticulo accedente 3—5-denticulatum, dente medio semper longiore, monstrantia; ceterum folia integerrima. Folia cocta texturam vulgarem, cellularum incrassationem angularem punctiformem membranae secundariae monstrant. Folia involucralia ovato-lanceolata, apice magis acuminata paucisque dentibus angustis longioribus armata; lobulus basi magis dilatatus hinc inde denticulo obtuso obsessus; amphigastrium latius apice emarginato dentatum. Perianthium (junius) continet 7—9 pistilla.

Propius accedit ad *Mad. acutifoliam*, quae tamen foliorum forma angustiore, lobulo latiore totoque habitu diversa est. *Mad. plumosa Mitteni* foliis rotundioribus validius serratis lobulisque minoribus et *Mad. inaequalis G.*, cuius frustula nonnulla cl. Didrichsen in Madeira insula legit, foliis subrepandis apice haud denticulatis et lobulis et amphigastriis brevioribus differt.

2. Madotheca Liebmanniana Lindbg. et Gottsche.

M. caule bipinnato rigidulo paleaceo, ramis recurvis apice attenuatis, foliis imbricatis oblique cordatis vel (rameis praesertim) ovatis apice margineque reflexis subsquarroso-margine ventrali basi inflexiuscula subdenticulatis apice obtusis vel acutis integerrimis erosominate-2- vel 3-denticulatis, lobulis oblongis obtusiusculis margine subreflexis integerrimis et parce dentatis basi ab altera parte vel utrinque caudato-dentatis amphigastriis oblongis vel subrotundo-quadratis margine reflexis subintegerrimis basi utrinque appendiculato-dentatis et paleis polymorphis lacinulato-dentatis fultis, fructu in ramulis brevibus lateralibus, involucro dentato, perianthio campanulato compresso subplicato ore laciniato, laciniis dentatis.

β. Orizabensis, foliis paullo minoribus plerisque muticis.

Synops. Hepat. p. 731. n. 9 b.

Denne Art blev samlet i de tætte Skove, som beklæde Siderne af Cerro de Sempoaltepec i Juni 1842 med Perianthier (Hb. Liebmann. n. 154. ♀ et ♂); Fr. Müller fandt Hunplanten med fuldkommen Frugt i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Aserradero de Santa Cruz i Juli 1853 (2247).

Caulis semipedalis et longior, flexuosus, multis lacinulis polymorphis vario modo divisis vestitus, bipinnatus, rami primarii longiores semipollicares, ramuli 1—3 lineas longi,

rami ramulique paullum decurvi apice attenuati. Folia imbricata, semicordata, ramea pleraque paullo longiora oblique ovata obtusa subintegerrima apice marginibusque reflexis (praesertim quum sicca sunt) squarrosa, margine dorsali repanda basi valde ampliata integerrima vel lacinula parva angusta praedita, ventrali basi inflexiuscula integerrima vel denticulata, apice plerumque obtusa integerrima, nonnulla acuta vel eroso-bi-tridenticulata, dente nonnunquam sub apice accedente, lineam fere longa, basi aequa lata vel etiam latiora, ramea minora longiora quam latiora. Lobuli oblongi, obtusi, truncati vel acutiusculi, margine subreflexi, basi altero latere (rarius utrinque) appendiculato-dentati, reliquo margine plerique, praesertim foliorum rameorum, integerimi vel repandi, nonnulli parce dentati. Folia in media basi cellulas multo majores, reliquas fere aequales, facie externa convexa vel dorsali magis rotunde prominentes, facie concava magis applanatas habent. In foliis cum liquore kali caustici coctis et zinco bijodato tinctis nucleus violaceus contrahitur in figuram stellatam, praesertim in cellulis majoribus basalibus, ibique brachia pellucida prominentia sacculi primordialis optime monstrat. Est lex in plantis phanerogamis, ut porus in cellularum margine, ubi membrana primaria clauditur, paullo latior fiat; eadem lex in Hepaticis invenitur, quare brachia sacci primordialis apice dilatata limites membranae secundariae designant; itaque si levi ictu e cellula dirupta nucleus totus ejicitur, cellula remanens e mera membra primaria consistere debet, quamvis colore hyalino-roseo imbuta sit. In cellulis disci minoribus difficilius membranae inter se separari possunt, et in cellulis versus marginem basalibus aequa atque in cellulis lacinularum caulem vestientium parietes incrassati colore saturatiore violaceo indicantur, dum media cellula areolam pallidiorem habet. Amphigastria lingulata, subquadrata vel transverse rotunda, medio gibba, obtusa vel emarginata, margine reflexa et interdum undulata, pleraque integerima et basi sola utrinque subdenticulata vel caudiculato-dentata, nonnulla dente uno altero obtuso vel acuto vel incisura aliqua instructa. Lacinulae illae, quibus facies ventralis caulis exasperatur, pro maxima parte, appendices accessorias sistunt, in quas basis amphigastriorum et lobularum exubent; videoas enim plerumque laciniam in hunc labyrinthum daedaleum transire, cuius tamen tractus maeandrici, si extricare velis, dirumpuntur observationemque elidunt. Ad sunt autem sub amphigastriis in caule lacinulae solitariae, cuius conjunctio cum modo recensisitis negari debet. Basis foliorum dorsalis margine undulato-crispo saepe quoque in processus sinuato-crispos transit et in caulem decurrit, et nisi paleas ad basin amphigastriorum internam, qua cum caule cohaeret, originem e lobulorum appendicibus haud trahentes, eodem modo, quo in foliorum basi dorsali lacinulae proveniant, oriri putes, hae omnino obscurae naturae esse videntur. Folia involucralia longiora, acuminata, toto margine dentata, lobuli et amphigastria subovalia, plana, acuta, margine inciso-dentata. Perianthium adultum sesquilineam longum versus apicem dilatum aequa latum, compressum, obsolete plicatum, ore laciniatum, laciniis plerumque curviusculis dentatis. In fructu semimaturo

dissecto cellulae matricales seminum alternatim cum utriculis elaterum ductu serpentino inter eas dispositis in seriebus longitudinalibus inveniebantur. Utriculi elaterum, utrinque attenuati succoque coagulato repleti, regularem formam (excepta fibra spirali nondum conformata) jam induerant. Cellulae seminum matricales ovales et appendiculis acutis, quibus aut interpositis aut superpositis cum cellulis vicinis contignabantur, $\frac{3}{1}$ auctae singulae ostendebant corpus breviter cruciato-brachiatum, membrana hyalina crassiore circumdatum, cuius in medio massa sporarum, nondum in quatuor semina discreta, inaequaliter coagulata erat; igitur hoc corpus erat cellula matricalis propria, e qua denique sporae quatuor originem trahunt. Pedicellus capsulae, involucello obsoleto, in basin fusiformem medio auctam transit caeruleum supremo partem conicam imam intrudit — gomphosin dixerim — nec alio modo cum eo connectitur. Capsula junior videtur e dupli strato composita, et externe cellulas cubicas breviores, interne longiores ostendebat; matura autem e quatuor vel quinque stratis componitur et pluribus valvis irregulariter formati, quarum nonnullae breviores sunt, finditur. Capsulae maturae sectio transversa plerumque 4 strata cellularum perfecta ostendit, nonnullis autem locis quintae seriei rudimentum. Stratum extimum, cuticulâ externe adhuc velatum, cellularum lumina oblonga, duplo majora quam sequentium stratorum et altius raostendit parietesque versus stratum secundum fuscescentes; stratum secundum cellularum lumina minus alta, latiora, basi transversalia parietesque laterales hic illic magis incrassatos et fuscos habet et tertio strato omnino simile est. In quarto strato color fuscus recedit et magis versus stratum tertium revertitur, introrsum album fit et, si quinta series cellularum adest, omnino decolor videtur; color capsulae effetae exinde cinereo-fuscus est. Capsularum examinatio varietatis β plerumque 4 strata monstrabat. Semina rotunda, granulato-scabriuscula, subviridia. Elateres longiores, bi- (interdum tri-) spiri in tubulo hyalino.

Aliquoties in varietate β metamorphoseos retrogradae exemplum vidi. Inveniebatur autem in perianthio adulto foliolum longum accessorum, angustum, sinuato-undulatum utrinque dentatum, inter pistilla emarcida cum basi calyptae coalitum eamque duplo superans, quem casum non aliter intelligo, ac si in planta phanerogama carpellum in foliolum verum reverteretur.

Planta mascula, secundum exemplaria originalia in eodem caespite cum femineis inventa, folia integerrima habet; folia perigonalia unicum antheridium pedicellatum in gremio fovent.

A *Madotheca subciliata* caule paleaceo, foliorum et amphigastriorum forma facile distinguitur.

3. Madotheca Leiboldi Gottsche.

M. caule procumbente flexuoso inordinate ramoso, ramis saepe incurvis pinnatis bipinnatisque, foliis laxius imbricatis ovatis integerrimis basi dorsali (plantae fructiferae plerisque) in appendiculum dentiformem decurrentibus, apice rotundo dorsum versus saepius revolutis, lobulo linguaeformi apice rotundato margine integerrimo vel subrepando basi caudato-dentato, amphigastrijs brevi-ovatis margine toto revolutis medio gibbis basi utrinque decurrentibus laciniato-appendiculatis paleisque accessoriis multifidis fultis, fructu terminali in ramulis lateralibus (longioribus quam in aliis *Madothecis* fit), foliis involucralibus apice obtusis, lobulo et amphigastro margine dentato-lacinulatis, perianthio campanulato ore compresso saepe retroverso 10—12-laciniato, laciniis bifidis, lacinulis lanceolatis dentatis.

Gott sche in Lehmann Pugill. VIII. p. 11. Synops. Hepat. p. 269. n. 12.

Leibold fandt denne Plante (sandsynligviis paa Plantagen Zazuapan) i Districtet Vera Cruz, krybende imellem *Frullanias quarrosa* og *hians*, med mange Perianthier og halvmoden Frugt.

Caules triplicares, cum foliis 1 lineam et ultra lati, inordinate ramosi, plerumque flexuosi vel incurvi, inter alias Hepaticas repentes. Folia ovata marginibus subrepanda, apice obtusa; axillaria, ut solent, cordiformia; lobulus linguaeformis, margine subrepandus basi lacinulato-caudatus vel imo paleis accessoriis polymorphis parce ornatus. In planta fertili fere omnia folia cum lobulis (nec involucralia sola) basi vel una vel altera sive unidentata sive dentibus lacinulisque pluribus ornata. Carina lobuli et folii in dorso caulis versus apicem sursum revoluta, ita ut discus folii vel lobus major duos margines dorsales habere videatur.

Amphigastria ovato-cordata, toto marginē reflexa, medio gibba, basi utrinque decurrentia in lacinulas diversiformes vel lacinulato-dentata, saepe paleis polymorphis multifidis et ab amphigastro ipso discretis ornata. Color brunneo-flavus; textura qualis in reliquis; retis maculae media foliorum basi maiores sexangulares, decrescentes versus marginem, marginales subquadratae obscuriores. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta vulgarem imaginem quidem praebent, sed incrassationem a primordio usque ad extremum observatori mirifice monstrant. Cellulae basales marginis dorsalis et praesertim illae, quae inter ipsum marginem et cellulas maiores medias interjectae sunt, nec punctum incrassationis nec trigonum interstitiale auctorum ostendunt; paullo altius 6 puncta in angulis violacea, tum margo completus violaceus appetit; sequitur nuclei contractio in figuram substellatam 6-radiatam angulique conis acutis replentur, qui coloris diversitate egregium adspectum praebent, donec in cellulis mediis majoribus basalibus denique nucleus adhuc magis contractus magnitudine spectabili spectroque elegantiore observatoris oculos

attrahit. Cum apices angulorum nuclei in conos longiores terminentur, qui cum adjacentium cellularum conis exakte coeunt, interstitia hyalina elliptica, zonam albidam concatenatam sistentia et linea mediā percursa, propter contracturam lunatam parietum utriusque nuclei cellularum adjacentium, videntur. Si cautius coquitur, saccus primordialis cum brachiis in cellulis grandibus mediis bene observari potest, dum in minoribus solvit vel coagulatur. In foliis complicatis cellulæ convexulae apice depresso vel planae apparent, dum valleculæ inter eas latiores et profundiores sunt; margo folii æque ac facies dorsalis, si in marginem con-duplicatur, cuticulam bene ostendit. Perianthium fere 1 lineam longum, campanulatum, compressum, apice bilabiato-lacinulato reflexo; laciniae singulae lanceolatae, dentatae. Capsula valvulis 4 oblongis apice ovatis finditur. Elateres bispiri. Sporae, quaternae in cellula matricali in statu semimaturo, magnae. Pistilla circiter 16. E toro pistillorum monstrose interdum gignuntur foliola metamorphosi retrograda, quod et in hac planta semel ob-servavimus.

4. *Madotheca intermedia* *Gott sche.*

M. caule procumbente flexuoso inordinate pinnato, foliis imbricatis ovatis integer-rimis, margine dorsali subrepandis apice ventrem versus reflexis, lobulo oblongo subrepando apice oblique rotundo acutove basi paudentato, amphigastriis oblongis ovatisve utroque margine leviter inflexis basi lacinulato-dentatis, fructu terminali in ramulis lateralibus ple-rumque 4 foliorum paribus vestitis, perianthio campanulato compresso, ore lacinulato-dentato laci-niis inaequalibus subdentatis, foliis involucralibus acutis margine undulato-repando-den-tatis, amphigastrio ovato apice emarginato-bidentato, toto margine repando-dentato, saepius alteri lobulo foliorum involucralium adnato.

Leibold samlede denne Plante (sandsynligviis paa Plantagen Zazuapan) i Districtet Vera Cruz krybende iblandt *Frullania squarrosa* og *hians* med Perianthier.

Habitus idem est atque *Madothecæ Leiboldi*, cuius haec forsitan varietatem localem sistit; sed plantæ juxta positæ diversum adspectum praebent propter folia caulinæ in nostra (a dorso visa) apice ventrem versus reflexa (nec dorsum versus revoluta, ut in *M. Leiboldi*), paullo longiora basinque versus minus lata; praeterea differt perianthii ore aliter laciniato foliisque involucralibus acutis dentatis. In monstrosa forma perianthium ventre non clausum inveni; margo lateralis fissurae completæ alter repando-dentatus, alter laevis; folium involucrale alterum et amphigastrium quoque a forma vulgari diversa erant.

5. *Madotheca alpina Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente tripinnato, foliis imbricatis oblique ovatis margine repandis subinflexis apice obtusissimis integerrimis et subangulatis oblique acutis truncato-bi- vel tridentatis, basi ventrali integerrimis aut dentato-ciliatis, lobulo ligulato subrepando apice obtuso, acuto bidentatove, amphigastriis ovatis truncatis margine subreflexis basi utrinque decurrente inciso-laciñati subciliatis, involuci foliis et lobulis acuminatis amphigastroque inciso-dentatis, perianthio campanulato truncato compresso late plicato ore inciso, laciñis denticulatis.

Synops. Hepat. p. 732. n. 12 d.

Liebmann samlede denne Plante paa Vulkanen Pico de Orizaba i en Høide af 10000 Fod i September 1841 med fuldkommen Frugt. (Hb. Liebmann. n. 494 a.)

Caulis 2—3-pollicaris, tripinnatus, rami ramulique patuli. Folia imbricata, pleraque, praesertim plantae sterilis, oblique ovata vel subrhomboidalia, obtusa, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{8}$ lin. lata, margine subrepando et ad apicem incrassato-subinflexa, basi imprimis ventrali latius inflexa et appendiculo in laciñias duas, tres vel plures fisco vel ciliato instructa, nonnulla uno altero dente solummodo praedita vel omnino integerrima; superiora folia, praesertim in planta fertili, subangulata, apice oblique acuta vel truncato-emarginata, bi- vel tridentata, nonnunquam et sub apice margine dente instructa; lobuli duplo minores, ligulati, margine subrepandi, obtusi vel apice dente laterali praediti, vel etiam bidentati, basi extrorsum inciso-laciñati, introrsum caudicula ciliato-dentata instructi, raro subintegerrimi. Retis maculae inaequales, basales mediae majores. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellularum limites 5-, 6-, 7-, 8-angulatos ostendunt, quarum anguli colore violaceo intensiore depicti, incrassationem punctiformem monstrant. In cellulis basalibus majoribus illà præparatione membrana secundaria in nucleum violaceum figuram stellatam exhibentem contrahitur, et levi ictu e cellula — nunc e sola membrana primaria constante — ejici potest. In reliquis disci foliorum cellulis, in lobulis, in amphigastriis et in perianthio (quamquam in basi majores cellulas habet) tantummodo incrassatio punctiformis angularis invenitur. Saccus primordialis coctione plerumque in duas vel plures partes coagulatur. Amphigastria breviora et latiora quam lobuli, lingulata, apice obtusa vel truncata, integerrima vel emarginato-obtuse dentata, basi utrinque decurrentia inciso-laciñata, laciñis divergentibus, interdum margine altero ante basin reflexo-ciliata. Fructus in ramis apicalis. Folia involucralia ovata, plerumque acuta (alterum folium interdum apice rotundato truncatoe), margine repando vario modo inciso-dentata et ciliata, lobuli angustiores ceteroquin similes, amphigastrium involucrale ejusdem formae ac caulina sed toto margine dentatum. Perianthium campanulatum, abbreviatum, 1 lineam longum et apice

aeque latum, compressum, late plicatum, ore truncatum, inciso-laciniatum, laciniis denticulatis. Capsula valvis 4 subregularibus (interdum valvis 5 irregularibus) dehiscens e duobus stratis componitur, quorum interius cellulis elongatis parietibus subincrassatis fuscis constituitur, stratum exterius cellulis magis quadratis gaudet. Fibrae semicirculares, ut fieri solet, desunt in pagina interiore capsulae. Semina magna, angulosa, oblonga, granulosa. Elateres spiram duplificem flavo-fuscam in utriculo hyalino ostendunt.

Madotheca Leiboldi, maxime affinis, differt foliis planis nec apice inflexis nec acutodentatis, margine minus repandis basi ciliatis quidem, non vero caudiculatis, lobulo expanso extrorsum denticulato, introrsum margine subdentato nec vero appendiculato, amphigastriis vel toto margine vel basi altero latere solummodo inciso-ciliatis, involueri foliis obtusis subintegerrimis. *Mad. subciliata* distinguitur caule longiore minus diviso, foliis elongatis plerisque acutis, margine undulato crispulis distinctius complicatis, amphigastriis subintegerrimis, lobulo vel integerrimo vel altero latere dentato.

6. *Madotheca elongata* *Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente flexuoso paleaceo bipinnato, ramis decurvatis apice attenuatis supremis divergentibus aequalibus, foliis imbricatis semicordato-ovatis basi convexis decurvatis apice reflexo-squarrosis integerrimis obtusis subacute, lobulis oblongo-ligulatis obtusis concaviusculis basi utrinque dentato-ciliatis (altero latere plerumque magis incisis), amphigastriis imbricatis subquadratis medio gibbis apice et saepe margine quoque reflexis basi dentatis altero latere dilatatis magisque incisis apice truncatis oblique acutis emarginatis, perianthio campanulato compresso ore laciniato, laciniis dentatis, foliis involucralibus elongatis obtusis (altero haud raro acuto) parce dentatis, lobulis et amphigastrio dentato-ciliatis.

Synops. Hepat. p. 733. n. 15 c.

Liebmann fandt denne Art i Nærheden af San Antonio Huatusco (4500') i Departementet Vera Cruz i November 1841 med mange Perianthier (Hb. Liebm. n. 396 et 397); i Omegnen af Vulkanen Orizaba blev den samlet af Fr. Müller i blomstrende Tilstand.

Caulis 4—8-pollicaris, procumbens, flexuosus, bipinnatus; rami 6—8 lineas longi, decurvi, apice attenuati, supremi divergentes aequales, ramuli breves 2—4 lineas longi. Folia imbricata, semicordata vel obliqua ovata, obtusa, basi convexa deflexa, apice sursum flexo squarrosa, interdum apice paullo angustiora acutiuscula, integerrima, sed basi nonnunquam lacinula vel dente uno altero praedita, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. longa, basi aequa lata; lobuli oblongi, obtusi, concaviusculi, basi utrinque, rarius ab altera tantum parte, dentato-lacinulati, priore casu altero latere magis incisi, margine nonnunquam repandi.

Amphigastria imbricata, subquadrata, arcte appressa, medio gibba, vel apice solo vel margine quoque reflexa, basi dentata, altero latere ampliata et magis incisa, apice truncata vel oblique acuminata, rarius emarginata. Folia involucralia elongata, angustiora, obtusa vel acuta, margine ventrali saepe inflexa, repanda vel parce dentata (plerumque in acutis); lobuli acuti vel obtusiusculi repando-dentati (rarius) vel plerumque laciniato-dentati; in uno exemplari intermedium lobulum paullo minorem repando-subdentatum accessorum deprehendimus. Amphigastrium involucrale oblongum vel ovatum planum margine spinoso-(vel laciniato-) dentatum. Folia subinvolucralia prima laeviora sed subconformia, ubi folia involucralia acuta sunt, ipsa quoque acuta videntur, ubi obtusa sunt, haec quoque obtusa. Perianthium campanulatum compressum, apice laciniato-dentatum (laciniis iterum dentatis), 14—16 pistilla fovea. Etiam in hac specie in perianthio laciniam accessoriam inter pistilla observavi, quam metamorphosi retrograda pistillum abortivum esse censeo.

Plantae Orizabenses a Müllero collectae foliorum involucralium lobuli et amphigastrii minus dentata habent, et foliis caulinis paullo acutioribus a specie originali recentant et quasi transitum ad *Mad. Leiboldii* parant.

Differt nostra (n. 396) a *Madotheca Neesiana* omnibus partibus paullo majoribus, lobulis et amphigastriis latioribus reflexis basi arctius dentatis.

7. *Madotheca cognata* Lindbg. et Gottsche.

M. caule procumbente flexuoso paleaceo bipinnato, ramis decurvatis attenuatis, superimis divergentibus aequalibus, foliis imbricatis oblique rotundo-oblongis semiovatisse squarrosulis obtusis integerrimis basi ventrali subundulato-inflexis, lobulis oblongo-ligulatis obtusis margine integerrimis subreflexis basi caudato-dentatis, amphigastriis subrotundis margine toto vel apice solo reflexis integerrimis vel ad basin sinuato-repandis basi decurrente subdentato-ciliatis.

Synops. Hepat. p. 733. n. 15 d.

β , *major*, lobulis paullo latioribus.

Liebmann fandt denne Plante i Districtet Ixtlan i Departementet Oajaca i Nærheden af Bjergværksstedet Yavesia (7—8000') i Juni 1842 (Hb. Liebm. n. 278); Fred. Müller samlede den i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Rio blanco og Rio de Orizaba i September 1853 (δ).

Spica mascula in ramulo brevissimo laterali, lineam longa, ovalis. Folia perigonalia arctissime imbricata, erecta, adpressa, integerrima, basi complicata.

Habitus, praesertim caulis paleaceus et ramificatio qualis in *Madotheca elongata*, quae vero folia longiora, apice minus reflexa, lobulos angustiores, basi praesertim altero latere evidenter appendiculato-dentatos, amphigastria arcte appressa, margine et apice quidem aliquantum sed minus reflexa, basi utrinque dentata et saepius caudata habet.

8. *Madotheca Neesiana Lindbg.*

M. caule procumbente paleaceo subdichotomo, ramis irregulariter pinnatis, foliis subimbricatis oblique ovato-oblongis obtusis subdecurvis marginibus repandis, ventrali non inflexis, lobulo concaviusculo ligulato basi caudato-dentato, amphigastriis brevi-linguaeformibus obtusis basi dentato-laciniatis caudiculatisque, perianthio campanulato compresso sinuato ore laciniato, laciniis dentatis, foliis involucralibus obtusis acutisque aequae ac lobulis et amphigastrio parce denticulatis.

Synops. Hepat. p. 271 et 732. n. 15.

β , forma major, foliis paullo latioribus.

Fandtes i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca i Mai 1841. (Hb. Liebmann. n. 433 et 435.) Den større Form sendte Hampe mig (ex Hb. Schlechtendal.) uden nærmere Angivelse af Findestedet, med fuldkommen Frugt; Hanplanten fandt Liebmann i Districtet Chinantla (n. 412).

Caulis 2—3-uncialis et ultra, procumbens, flexuosus, in facie ventrali sub amphigastriis praecipue squamulis oblongis vel lanceolatis vario modo inciso-ciliatis subsquarrosis conspersus, pinnatim divisus, basin versus saepe dichotomus, ramis vel simplicibus vel praesertim superioribus iterum pinnatis. Folia basi arcte imbricata, semicordato-ovata, $\frac{1}{2}$ —1 lin. longa, basi $\frac{1}{2}$ lin. lata, decurva, margine dorsali subrepanda, basi dilatata nonnumquam lacinula una alterave subulata instructa, ventrali vel integerrima vel subundulata, basi appendiculata, caudicula minuta parce ciliata. Textura foliorum simillima *Madothecae Leiboldi*, retis maculae parvae, versus basin medium augescentes, marginales minores. Lobuli ligulati, obtusi, margine integerrimi vel repandi, basi extrorsum appendiculo praediti magis minusve ciliato-dentato, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. longi, $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ lin. lati. Amphigastria linguaeformia, $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{6}$ lin. longa, $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ lin. lata margine integerrima subundulatave basi descendente vel utrinque vel altero latere ciliato-dentata. Folia involucralia obtusa, acuta vel acuminata, interdum apice emarginato-bidentula, lobi acuti plerumque margine uno alterove dente instructi; amphigastrium oblongum, obtusum vel truncatum, toto margine parce inaequaliter dentatum. Perianthium adultum campanulatum compressum, ore laciniatum, laciniis dentatis. Fructum perfectum tantummodo in forma majore β deprehendimus.

Forma major, primo adspectu paullum aliena, a beato Liebmanno eodem loco eodemque tempore sub n. 412 collecta est. Caulis basi pinnatim ramosus, pinnis brevibus indivisis, a medio inde ramis elongatis subfasciculatis ramulis brevibus iterum instructis dichotomobipinnatus, paleis polymorphis obsitus. Folia, lobuli et amphigastria fere qualia in n. 435, sed folia ad apicem apiceque ipso inflexa, lobuli et amphigastria paullo majora subreflexa et texturā densiore. Spicae masculae laterales, incurvae, e paribus foliorum perigonialium 6—8 compositae. Folia perigonalia e basi inflata amplexicaulia, cum lobo interdum fere aequali altius coalito, ceterum caulinis similia, antheridia singula majuscula brevi pedicello fulta foventia. Planta feminea (ex Hb. Schlechtendalii) fructus perfectos habet, valvulis inaequalibus quinque vel quatuor dehiscentes. Capsula e duobus tantummodo constat stratis; exterius fuscum parietibus incrassatis robustius, interius tenuius flavesrens est. Semina magna, angulata, granulato-scabra. Elateres binas (interdum ternas) spiras pallide fuscas in tubulo hyalino monstrabant. Pistilla 14 numeravi.

9. *Madotheca expansa* *Lindbg. et Gottsche.*

M. caule procumbente bi-tripinnato nudiusculo, ramis ramulisque patentibus rigidis, foliis imbricatis oblique oblongo-ovatis obtusissimis apice breviter inflexis integerrimis basi ventrali subundulatis subinflexis, lobulis oblongis obtusis planis margine reflexisque basi utrinque subcaudato-denticulatis, amphigastriis ovatis obtusis margine reflexis basi utrinque appendiculato-dentatis, foliis involucralibus integerrimis, lobulo acutiusculo basi inflexo subdentato, amphigastrio quadrato denticulato, perianthio . . .

Synops. Hepat. p. 732. n. 15 b.

Liebmann fandt denne Plante ved La Foya i Juli 1841 (Hb. Liebmann. n. 513 b. et 591) og paa Vulkanen Orizaba (10,000') uden Frugt (Hb. Liebmann. n. 494 b.) i September 1841.

Specimina sub n. 591 collecta foliorum lobulos et amphigastria habent minus denticulata, ceteroquin illis sub n. 513 b. collectis omnino similia, sed statura paullo minora; exemplaria Orizabensis staturā similia sunt n. 513 b.

Caulis procumbens, subnudus, rarius hic illic lacinulis paucis variae formae obsitus (praesertim in n. 513 b.), irregulariter bi-tripinnatus; rami ramulique patentes rigidi. Folia subimbricata, oblique oblongo-ovata, apice rotundato breviter inflexa, convexiuscula, nitidula, integerrima, rarius basi ventrali lacinula aucta, eadem basi subundulata et saepe inflexa, linea longa, $\frac{3}{8}$ — $\frac{3}{4}$ lin. lata; lobuli oblongi, paullum obliqui, obtusi, plani vel reflexi, basi utrinque caudiculato-dentati, reliquo margine integerrimi. Amphigastria ovata, obtusa, margine utroque reflexa, basi utrinque appendiculato-dentata. Fructus in ramulis latera-

libus. Folia involucralia caulinis aequalia, integerrima, margine ventrali ad basin undulata; lobuli acutiusculi basi inflexi et subdentati, amphigastrium quadratum denticulatum.

Textura foliorum vulgaris. Cellularum incrassationem punctiformem latiorem mox in lateralem continuam transeuntem praesertim in parte alari foliorum baseos videre licet. E cellulis mediis nucleus totus incrassatus membranae secundariae ejici potest, et interdum contingit, operculum e junctura lateralí quasi intactum dimovere. Nucleum ipsum minus belle in figuram notissimam stellatam contrahi in hac planta observavi.

Madotheca Neesiæna differt ramificatione et habitu paullum diversis, foliis saepius appendiculatis, lobis amphigastriisque multo evidentius ciliato- (lacinulato-) dentatis, amphigatriis latioribus vix reflexis. *Mad. divergens* statura minore, ramis flaccidis, foliis longioribus lobulisque angustis falcatis margine subdentatis et amphigastriis ad basin ciliato-dentatis diversa est.

10. *Madotheca divergens* Lindbg. et Gottsche.

M. caule procumbente dichotomo-bipinnato, foliis imbricatis ovatis planis obtusis integerrimis, lobulo oblongo subfalcato obtuso margine vel basi sola dentato, amphigastriis cordato-lingulatis basi utrinque dentatis apice retusis, foliis lobulis amphigastriisque involucralibus acuminatis margine ciliatis, perianthio . . .

Synops. Hep. p. 731. n. 12 c.

Liebmann samlede denne Art iblandt andre Hepaticæ paa Hr. Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') i April 1842. (Hb. Liebm. n. 9 b.)

Caulis procumbens, dichotomo-bipinnatus, 1—2 pollices longus et paullo longior, nudus; rami flexuosi divergentes. Folia arce imbricata, ovata, apice rotundata, sursum flexa, margine dorsali integerrima, ventrali subrepanda et interdum (sed rarius) basi ciliis nonnullis praedita; lobuli e basi nonnihil latiore oblongo-attenuati, obtusi, subfalcati, margine vel toto vel inferne, basi plerumque arctius externoque latere longius dentati. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta in cellulis disci incrassationem punctiformem angulorum ostendunt; in cellulis basalibus mediis membrana secundaria separatur a primaria et contrahitur in figuram stellatam saturatius violaceam, quae interdum rudimenta brachiorum sacculi primordialis habet. Levi ictu hic nucleus violaceus e cellula dirupta, nunc e mera membrana primaria constituta, ejici potest, et a latere observatus lora violacea descendentia angulorum et interjecta spatia hyalina pro brachiis sacculi primordialis (scilicet poros) ostendit. In cellulis majoribus basalibus inter se solutis et illaesisis apiculi hyalini declives externe videntur in angulis membranae primariae, sed minus prominent, quia tota cellula, coctione soluta e compressione cellularum vicinarum, magis ovalis

facta est. Amphigastria approximata vel contigua, cordato-lingulata, medio gibba, apice retusa, basi utroque latere dentato-ciliata. Involuci (juvenili statu tantummodo visi) folia, lobuli et amphigastrium toto margine longius dentata.

Differt a *Madotheca Leiboldi* foliis longioribus, lobulis amphigastriisque omnibus et arctius margine dentatis, illis angustioribus, amphigastriorum non revolutorum forma; a *Madotheca Swartziana* foliis margine ventrali haud inflexis, lobulo longiore latioreque multo magis dentato, amphigastriis toto fere margine dentato-ciliatis; a *M. Capensi* iisdem fere notis et caule breviore minus ramoso foliisque longioribus.

11. *Madotheca Swartziana Lindbg.*

M. caule procumbente ramis pinnatim divisus, foliis subimbricatis oblique ovato-oblongis obtusis subintegerrimis margine ventrali subinflexis lobulo ligulato angusto falcato integerrimo basive parce ab altera parte ciliato, amphigastriis linguaeformibus obtusis basi utrinque ciliato-dentatis, fructu

β , ramis elongatis, foliis brevioribus ad apicem magis angustatis nonnullis acuminate, aliis repando-truncatis margine dorsali subundulatis, ventrali magis inflexis apice reflexis emarginato-bifidisve.

Synps. Hep. p. 271. n. 17.

Deppe fandt denne Plante-Art i Nærheden af Jalapa (4500') uden Frugt; Fred. Müller samlede den med Perigonier i Indianer-Landsbyen St. Juan del Rio ved Rio bianco i Nærheden af Vulkanen Orizaba (n. 2368).

12. *Madotheca Mexicana Hampe.*

M. caule procumbente bipinnato, ramulis subtrifidis apice recurvis obtusis, foliis imbricatis oblique ovato-suborbiculatis obtusis integeriinis margine ventrali undulato, lobulis oblongo-lanceolatis acutiusculis canaliculatis, amphigastriis subquadratis margine supero integerrimo reflexo basi longe decurrentibus sinuato-crispis extremodo calcarato-dentatis, fructu

Synops. Hep. p. 273. n. 20.

Regel samlede denne Plante i Mexico uden nærmere Angivelse af Finestedet.

Ad adspectum in universum similis est *Madothecae platyphyllae*, sed ad characteres *Madothecae subciliatae* et *naviculari* propinquior. Differt ab hisce imprimis amphigastriis, quae per se quidem subquadrata, integerrima, marginibus praesertim supero

reflexis, longo tractu in caulem decurrent alamque sinuatam undulatam, ubi desinit, dentem unum alterumve subulatum recurvum emittem formant. Folium contra neutquam decurrit sed margine postico dilatato undatoque cauli accedens in lobulum ventralem reflec-titur amphigastrio breviorem dimidiato-oblongo-lanceolatum acutiusculum integerrimum margineque exteriore reflexi-canaliculatum quandoque dente uno alterove setaceo praeditum. Caulis fuscus $1\frac{1}{2}$ —2 polices longus. Folia viridia mollia; textura eadem atque in *M. platyphylla*; incrassatio angularis, interdum latior.

13. *Madotheca navicularis* Nees. ab Es.

M. caule repente, ramis rigidulis subbipinnatis distantibus plerisque apice recurvis aliis obtusis aliis attenuatis, foliorum lobo superiore nitidulo suborbiculari obtuso margine postico basi ulteriusque undulato-crispo, lobo inferiore integerrimo oblique cordato-ovali obtuso deflexo naviculari, amphigastriis subrotundis obtusis marginibus reflexis integerrimis aut basi ab altera parte unidentatis, perianthii ore subintegerrimo.

Synops. Hep. p. 277. n. 28.

Fandtes i Nærheden af Jalapa paa Cuesta grande de Chiconquiaco.

14. *Madotheca platyphylloidea* Nees. ab Es.

M. confertim bi-tripinnata ambitu trigono aut flabellari, ramis ramulisque rigidis obtusis patentibus approximatis summis decrescentibus, foliorum lobo superiore suborbiculari obtuso angulo postico producto inferioreque ovato concaviusculo integerrimis, amphigastriis semicircularibus subrepandis margine reflexis apiceque revoluto-patulis, involucri foliis longidentatis perianthii ore subedentulo.

Nees. ab Es. Hep. Europ. IV. p. 497. — Synops. Hep. p. 280. n. 33.

Regel fandt denne Art i Mexico uden nærmere Angivelse af Findestedet.

15. *Madotheca semiteres* Lindbg. et Gottsche.

M. caule procumbente subbipinnato nudiusculo, ramis patentibus, foliis imbricatis convexis decurvis oblique orbiculato-cordatis obtusis integerrimis, lobulis ovatis oblongo-linearibusve obtusis margine reflexo canaliculatis extrorsum basi decurrente inciso-dentatis, amphigastriis rotundo-quadratis margine reflexis medio gibbis integerrimis basi altero latere appendiculato-dentatis, altero subintegerrimis, fructu . . .

Synops. Hepat. p. 735. n. 34 b.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Vera Cruz i Nærheden af San Antonio Huatusco (4500') i Februar 1843 uden Frugt. (Hb. Liebmann. n. 158.)

Caulis procumbens, flexuosus, 2—3-pollicaris, pinnatim ramosus vel bipinnatus, ramis ramulisque patentibus, nudus, vel hic illic parce squamulis obsitus minutis inciso-dentatis. Folia arctius imbricata, paullum obliqua, orbiculata vel semicordata, nonnulla praesertim in ramulis semi-ovata, convexa, apice decurva, obtusa, nitidula, transversalia, integrerrima, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. longa, aequa lata vel etiam aliquanto angustiora basi subinfexa. Lobuli ovati vel angusti, sublineares, obtusi, ob margines reflexos canaliculati, basi introrsum integerrimi vel subrepandi, extrorsum decurrentes inciso-dentati. Amphigastriorum forma rotunda vel subquadrata, ob margines vero praesertim ad apices reflexos ovata videntur, medio sunt gibba, basi decurrentia hinc appendiculato-inciso-dentato, hinc integrerrima vel sinuato-dentata.

Affinis *Mad. Abyssiniae*, sed differt caule subpaleaceo, statura ob folia minora decurva multo angustiore fere tereti, foliis magis orbiculatis, lobulis amphigastriisque planis basi minus evidenter inciso-dentatis. Habitu quoque accedit ad *M. subsquarrosum* et *madidam* charactere tamen satis diversas.

XX. *Bryopteris* Lindbg. *Synops. Hepat.* p. 284 et 737.

1. *Bryopteris filicina* Nees ab Es.

Br. caule procumbente, ramis erectis pinnatim ramosis ramulis strictis, foliis arcte imbricatis ovatis acutis serratis subtus sinuato-complicatis, lobulo rotundato plicaque media impresso integerrimo brevitranseunte, amphigastriis foliis parum minoribus imbricatis subrectangulis truncatis apice dentatis.

α , *Hookeriana*, foliis apice tantummodo serratis, margine ventrali angustissime subreflexis.

Synops. Hep. p. 284. n. 1.

Utraque inflorescentia in uno eodemque ramo invenitur in plantis Mexicanis; mascula est foliis perigonialibus apice bilobis subdenticulatis repandisve amphigastriisque ellipticis apice bidentulis.

Liebmann fandt Hanplanten og Hunplanten med fuldkommen Frugt i August Maaned paa Plantagen Mirador 3000' (Hb. Liebm. n. 10, 180, 182, 219, 310 b, 312, 317, 360, 485, 492 e) i Departementet Vera Cruz og ved Sukkerplantagen Trapiche de la Concepcion (3000') i Districtet Chuapam i Departementet Oajaca i Nærheden af Indianer-Landsbyen Comaltepec; den fandtes ligeledes af Leibold.

Capsula e dupli cellularum strato componitur; stratum exterius ab ima basi ad tertiam fere altitudinis partem cellulis longioribus et angustioribus parietibusque minus incrassatis constituitur; deinde cellulae duplo-quadruplove maiores et tabulares sunt pariesque valde incrassatos (poris tamen relictis) habent; cellulae marginales dimidio angustiores, transversales. Stratum interius constituitur cellulis quadruplo minoribus, quae fibram flavam (fibrarum semicircularium notissimarum vices, ut videtur, gerentem) monstrant, quarum in superficie elateres monospiri in tubulo hyalino clauso hic et illic annulo basali insident; in ipso capsulae fundo circiter 16 tales annulos numeravi. — Foliorum textura in Bryopteridis speciebus una eademque videtur; in foliis coctis cellularum fines lineæ albæ moniliformitumidulæ ubique elegantissime eluent; sequitur circulus crenulatus saturatius violaceus membranae secundariae incrassatae lumen cellulae cingens, in quo residua coagulata sacci primordialis videntur. Si cautius egeris, etiam sacci brachia in poros singulos cellularum intrantia vicinisque convenientia videoas. Incrassatio parietalis intermedia etiam vulgaris in Lejeuniis est, quae multa cum hisce plantis communia habent, areolarum forma plerumque in Bryopteride elongato-hexagonalis, dum cellulae Lejeuniarum plerumque rotundo-sexangulares videntur.

2. *Bryopteris Liebmanniana Lindbg. et Gottsche.*

Br. caule procumbente, ramis subsimpliciter pinnatis ramulisque elongatis decurvatis apice attenuatis flaccidis, foliis basi imbricatis apice distiche divergentibus ovatis acutis subfalcatis apice serratis, margine ventrali latius reflexis et in lobulum rotundo-quadratum integrerrimum angulo acuto patulum vel plerumque intus reflexum complicatis, amphigastriis approximatis subrectangulis margine anguste reflexis apice subtruncato dentatis.

Synops. Hep. p. 788. n. 1 b.

Liebmann fandt denne Plante i de fugtige Bjergskove omkring Tonaguia (4—5000') i Districtet Villa alta i det østlige Oajaca; den blomstrede i Juli. (Hb. Liebm. n. 149. ♀.)

Lobuli foliorum, amphigastria et fructificatio (junior) qualis in *Bryopteride filicina*, a qua tamen differt ramis flaccidis ramulis elongatis deflexis plerisque simplicibus, foliis dissitusculis paullo angustioribus ob marginem ventrale magis inflexum subfalcatis lon-

gis acuminatis apice solo serratis. Ramificatione similis *Bryopteridi tenuicauli*, sed caule flaccido, foliis longioribus angustioribus et amphigastriis diversa est.

3. *Bryopteris Trinitensis Lindbg.*

Br. caule procumbente, ramis erectis pinnatis fastigiatis, foliis remotiusculis semi-verticalibus rotundo-ovatis acutis apice subdentatis basi subtus complicatis lobulo minuto inflexo, amphigastriis distantibus subrotundis retusis integerrimis crenulato-dentatis.

Synops. Hepat. p. 285. n. 3.

β , *intermedia*, foliis longioribus amphigastriisque evidentius serratis, ramulis valde attenuatis.

Synops. Hepat. p. 738. n. 3.

Planta mascula spicas 6—8 paribus foliorum perigonialium compositas habet; folia perigonalia biloba, saccato-complicata, lobis acutis integerrimis; amphigastria ovato-rotunda integerrima, apice truncata.

Liebmann samlede denne Plante paa Hacienda de Jovo (1800—2000') i Nærheden af Sta Maria Tlapacoyo i Departementet Vera Cruz (Hb. Liebm. n. 534, 554, 565 ♀ et 516) og paa Hacienda de Mirador (Hb. Liebm. n. 310 ♂ et 497). Hanplanten og Hunplanten blomstre i Foraaret i Marts. Fred. Müller fandt Hanplanten ved Cordova.

4. *Bryopteris diffusa Nees ab Es.*

Br. caule procumbente dichotomo-ramoso divaricato, foliis arcte imbricatis ovatis acutis integerrimis, lobulo majore inaequaliter tri-quadrifido-dentato et longiore tractu in marginem ventralem transeunte, amphigastriis imbricatis subquadratis praemorso-dentatis in medio gibbis, perianthiis latioribus e prismatico teretiusculis, involueri foliis cum lobulis et amphigastriis serrato-ciliato-dentatis.

Synops. Hepat. p. 286. n. 4. Nees ab Es. in Mart. Flor. Brasil. I. 1. p. 364. n. 49.

β , *subserrata*, foliis caulinis apice serrato-denticulatis.

Liebmann samlede denne Plante paa forskjellige Steder i Departementet Vera Cruz. Var. α ved Huitamalco (2500—3000') i Mai (n. 471), ved Colipa (500—800') og i Kystskove ved Misantla i Marts (n. 145 a, 146, 514 a) og paa Hacienda de Jovo (1800—2000') i Juli (n. 466 a). Ved Aguas Santas imellem Hacienda de Mirador og Totutla fandtes Var. β (i Juli n. 110, 407, i August n. 498 a, i November n. 557 og i Februar 1842 n. 275 a). Fred. Müller fandt Hunplanten ved Cordova og ved Dos Puentes (4000').

Inflorescentia mascula in distincto individuo hac in specie conspicitur, quod surculi (n. 145, 146) apud Colipam lecti optime probant.

5. *Bryopteris flaccida Lindbg. et Hampe.*

Br. caule pendulo procumbente irregulariter ramoso, ramis elongatis flaccidis pinnatis, foliis contiguis subimbricatisve oblique ovato-acutis apice levissime subrepandis vel denticulo unico subintegerrimis, margine ventrali a medio anguste inflexo basi in lobulum longiorem ovalem vel subquadratum angustum complicato, amphigastriis subimbricatis spatulatis apice rotundato serrato-dentatis, marginibus lateralibus a medio ad basin anguste reflexis.

Linnaea Tom. 24. p. 640. n. 3.

Paa Sierra de San Cristobal samlede Fred. Müller denne Plante i Januar 1853 (under n. 2354, 2347, 2349) uden Frugt.

XXI. *Phragmicoma Dumort. Synops. Hep. p. 292.*

1. *Phragmicoma Bongardiana Lindbg.*

Phr. caule adscendente dichotomo-fasciculato, foliis remotiusculis subhorizontalibus semiovato-oblongis obtusis acutis vel apice plus minus dentatis integerrimisve flaccidis basi decurrente brevilibulatis, lobulo plerumque acuto, amphigastriis remotis obovato-rotundis basi utrinque (altero latere saepe longius) decurrentibus integerrimis, fructu in dichotomia, perianthio adulto elongato obovato compresso laevissimo apice truncato.

α , *flaccida*, foliis remotiusculis subintegerrimis, lobulo plerumque parvo vel obsoleto.

α^{**} *viridula*, foliis subintegerrimis, lobulo saepe paullo majore.

β , *rigidula*, foliis contiguis vel imbricatis, pluribus apice angulato-dentatis convexiusculis, amphigastriis subreflexis.

β^{**} *longior*, foliis 3—4-dentatis, lobulo parvo, amphigastriis planiusculis.

Synops. Hepat. p. 740. n. 2 c.

Liebmann fandt Varieteten α^{**} (Hb. Liebm. n. 369 b et n. 483 a) i Departementet Vera Cruz omkring San Antonio de Huatusco (4500') i September og November i Blomst,

og Varieteten β^{**} paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') imellem *Drepanophyllum* i Marts ogsaa i Blomst (Hb. Liebm. n. 286).

Perianthium junius piriformi-compressum, adultum elongatum apice brevitubulato truncatum, marginibus linearibus, sine ulla crista aut carina, 1 lin. longum, $\frac{2}{3}$ lin. latum. Folia involucralia ovato-acuta plus minus repando-dentata (in β^{**}) vel subserrata (in α^{**}), lobulo ovato-lanceolato; amphigastrum involucrale ovato-oblongum apice emarginato-bidentatum margine serrato-dentato, vel interdum sine emarginatura truncato-dentatum; amphigastrum subinvolucrale primum apicem rotundum subundulatum habet.

Cellularum incrassatio angularis et lateralis intermedia.

2. *Phragmicoma Guilleminiana* Nees et Mont.

Phr. monoeca, caule adscendente dichotomo fastigiato, foliis imbricatis nitidiusculis decurvis ovatis obtusiusculis apice subrepandis basi subtus arcte complicatis lobulo ovato basi inflato denticulato, amphigastriis imbricatis transversalibus recurvato-convexis subtus in medio plicato-ventricosis subretusis obiterque repandis, perianthiis dichotomiae impositis compressis obovatis truncatis dorso medio ventricosis marginibusque laevibus.

Synops. Hep. 293. n. 2.

β , *Mexicana*, lobulis foliorum involucralium angustioribus acuminatis, perianthiis basi magis attenuatis.

Fandtes med Perianthier af den afdøde Fredr. Müller fra Bern i Skovene, som bedække Siderne af Vulkanen Orizaba.

Perigonia in ramorum apice, vel ramo crescente in medio demum ramorum obvia, in eadem planta cum fructificatione feminea; inveniuntur 8—10 paria foliorum perigonialium 1—2 antheridia in gremio foventium.

Folia cocta angulorum et parietalem intermedium incrassationem in cellulis ostendunt, et nucleus ejectus in parietibus lateralibus unum vel bina foramina habet ad meliorem communicationem brachiorum sacci primordialis. Membrana secundaria violacea hisce locis pertusa membranā hyalinā primariā vestitur, quae ita foramina illa claudit. Incrassatio parietum lateralium vel longiore tractu in medio appareat et simplex, vel brevior et duplex, unde cellularum vicinarum parietes quasi nodulosi apparent. Disci cellulae basales majores, marginales minores, rarius quadratae, plerumque quinquangulares. Caulis cellulae elongatae, parietibus valde incrassatis, ut canalis aequalis angustus tantummodo remaneat, apice attenuatae ad modum cellularum prosenchymaticarum.

3. *Phragmicoma bicolor* *Nees ab Es.*

Phr. caule repente dichotomo-ramoso divaricato, foliis semiverticalibus imbricatis ovatis integerrimis obtusis, superioribus subacutis, margine ventrali complicato-saccatis, (margine plicae tuberculis minutis 5—7-denticulato), amphigastriis imbricatis transversim rotundo-quadratis integerrimis apice subreflexis, fructu laterali vel in dichotomia, perianthiis ovatis apice 8—10-plicatis, foliis involucralibus subundulatis carinato-alatis, ala cum ramulo innovationis coalita.

Synops. Hepat. p. 294. n. 3 (exclus. var. β Paraënsi).

α , amphigastrio perichaetiali late spathulato, obtuso, integerrimo.

Nees ab Es. in Mart. flor. Brasil. I. 1. p. 349. (in textu). — Gottsche Icon. Hepat. inedit.

β , *armata*, tenerior, lobuli margine libero evidentius obtusidentato, amphigastrio perichaetiali lunato-emarginato margine repando-subdentato. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 743. n. 3.

β^{**} *major*.

γ , *Chinantlana*, tenerior, foliis innovationum arctius imbricatis acutis et apice hamato subfalcatis.

Liebmann fandt Varieteten α i Skovene omkring Sta Maria Tlapacoyo (2—3000') i Mai med Perianthier (Hb. Liebm. n. 563 b) og β paa Vulkanen Orizaba i en Heide af 10,000 Fod med Perianthier (n. 389 b). Fred. Müller samlede den i Districtet Orizaba ved Sanjuan del Rio og paa Sierra de Cristobal i September med Perianthier (n. 2368). Varieteten γ fandt Liebmann i Districtet Chinantla i Mai med moden Frugt (Hb. Liebm. n. 456 b). Leibold bragte ligeledes denne Plante tilbage fra Mexico, sandsynligviis samlet paa Plantagen Zacuapan, 5 Leguas Østen for Byen S. Antonio de Huatusco.

4. *Phragmicoma polycarpa* *Nees ab Es.*

Phr. caule repente irregulariter pinnatum decomposito, ramis ramulisque subfasciculatum congestis, foliis semiverticalibus imbricatis planiusculis ovatis obtusis integerrimis basi ventrali complicatis, lobulo truncato in marginem folii acuminato integerrimo, amphigastriis imbricatis cuneato-orbiculatis integerrimis, fructu in ramulis terminali, perianthiis obovatis subcompressis ore quinqueplicato longitudine involucri bifidi integerrimi.

Synops. Hepat. p. 295 et 744. n. 5.

α , *Martiana*, foliis involucralibus profundius divisis, amphigastrio involucrali oblongo bifido, florali vel emarginato-bidentato vel integro. — Nees ab Es. in Mart. Fl. Brasil. I. 1. p. 350. n. 32.

α^* *intermedia*.

β , *Liebmanniana*, foliis involucralibus brevius bifidis, amphigastrio involucrali obovato latiore exsecto-biapiculato, florali obovato longiore integro.

β^* *major*, statura et omnibus partibus major.

β^{**} *minor*.

Liebmann fandt denne Plante (β^*) i Departementet Vera Cruz i Skovene omkring Sta Maria Tlapacoyo (2—3000') i Mai (Hb. Liebm. n. 578 b) og paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Marts ♀- og ♂-Planten (n. 336); Formen β fandt han ved Rio Nautla i Nærheden af Iicaltepec i April (n. 415).

Exemplaria Miradorensia in statu sicco paullo teneriora sunt, foliorum lobulos maiores et amphigastria latiora habent, quam exemplaria originalia ab Illustrissimo Martio collecta; adsunt tamen alia specimina Brasiliensia in Hb. Lindenbergii (nunc in Academia Vindobonensi asservato), quae a cel. Meissner acceperat, quorum lobuli et amphigastria hisce plantis Mexicanis omnino similia sunt.

Capsula e dupli strato composita est; exterius cellulas paullo maiores haud incrassatas ostendit marginalesque transverse quadratas; stratum interius fibris reticulatis flavis incrassatum, quibus elateres, $\frac{1}{3}$ millim. longi, inhaerent. Semina magna, $\frac{1}{20}$ millim. longa, $\frac{1}{25}$ millim. lata, angulata, sporodermide granulata obducta.

5. *Phragmicoma Leiboldiana Lindbg. et Gottsche.*

Phr. caule repente dichotome ramoso, ramis fasciculatis, foliis imbricatis semiverticalibus oblique ovato-rotundis obtusis integerrimis subrepandisive, margine ventrali plerumque late inflexis basique in lobulum majusculum complicatum subquadratum oblique truncatum subintegerrimum angulo vel semiinflexo vel plerumque omnino involuto, amphigastriis imbricatis transversali-rotundis margine subreflexis integerrimis, fructu laterali subsessili vel e dichotomia, perianthio emerso oblongo compresso quadrangulo basi tereti substipitato, dorso sulcato, ventre late obtuseque carinato, foliis involucralibus ellipticis (saepius alatis), lobulo oblongo-quadrato angulo obtuso margine libero saepius inflexo, amphigastrio obovato integro apice rotundo.

Synops. Hepat. p. 296. n. 6.

β , *fastigiata*, ramulis supremis confertis fastigiatis brevibus, fructibus creberimis.

Synops. Hep. p. 744. n. 6 γ .

γ , *gracilior*, teres, ramis elongatis flaccidis fasciculatis, foliis ovato-acutis margine ventrali latius inflexis, amphigastris rotundioribus minoribus.

Synops. Hep. p. 744. n. 6 β .

Leibold fandt Originalplanten, sandsynligviis i Departementet Vera Cruz paa Plantagen Zacuapan, 5 Leguas Østen for Byen San Antonio de Huatusco; Liebmann samlede Arten i Marts uden Frugt paa Plantagen Hacienda de Mirador (Hb. Liebm. n. 20 ex p.) og Var. β sammested i Marts med Perianthier (n. 191); Var. γ samlede han iblandt andre Hepaticae i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca med Perianthier i Mai (n. 530 e. p.).

6. Phragmicoma Liebmanniana Lindbg. et Gottsche.

Phr. caule repente irregulariter pinnato, ramis elongatis flaccidis, foliis arcte imbricatis semiverticalibus ovatis basi convexis apice planiusculis obtusis margine ventrali basi complicatis, lobulo magno repando vel crenato-dentato in folium acuminato saepe extrorsum exciso-unidentato, amphigastriis subimbricatis quadrato-rotundis apice truncato-repandis, perianthiis e dichotomia ovali-oblongis margine compressis ad apicem utrinque 2—3-plicatis.

Synops. Hep. p. 744. n. 8 b.

Liebmann fandt denne Plante i Districtet Chuapam i Departementet Oajaca, i Nærheden af Zapotekbyen Comaltepec (2000—3000'), i Juli med Perianthier (Hb. Liebm. n. 197).

Caulis repens, sesqui—bipollicaris, flacidus, dichotome divisus; rami elongati, nonnulli, praesertim inferiores, ramulis brevibus iterum instructi. Folia arcte imbricata, semi-verticalia, ovata, ad latus patentia, basi convexa, apice planiuscula, obtusa, rarius acutiuscula, integerrima vel subrepanda, margine ventrali ad $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ longitudinis folii in lobulum complicata. Lobulus latus, plica angusta haud raro in folium usque ad apicem fere transiens, saepius vero apice extrorsum excisus vel in acumen parvum abiens, reliquo margine vel repandus vel crenato-dentatus. Folia incrassationem angularem et lateralem monstrant, et si chemice praeparantur, strias violaceas e fundo adscendentibus parallelas ostendunt, quae cellulas hexagonas regulariter dispositas halone lateralii violaceo quasi cingunt, dum lumen cellulae succo coagulato magis viridescit. Amphigastria contigua vel subimbricata quadrato-rotunda aut (superiora praesertim) subreniformia, plana, adpressa, sed apice nonnunquam reflexa, margine integerrima, apice truncato-repanda vel emarginata, foliis

duplo minora. Color plantae basi nigricans, folia apice virescentia, in statu sicco cauli circumvoluta, sed apice squarroso-patula. Plantae fertilis folia pleraque breviora, obtusiora; involucralia majora, medium perianthii attingentia, biloba, lobo dorsali longiore acutiusculo, ventrali latiore obtusissimo. Amphigastrium involucrale longius quam caulinata, evidentius emarginatum. Perianthium ovali-oblongum, margine compressum, ad apicem utroque latere pluri- (plerumque 2—3-) plicatum.

Stirps fructifera, praesertim foliorum forma, similis *Phragmicomae corticali*, in primis formae *melanophloeae*, haud difficulter tamen distinguenda caule multo majore, ramis elongatis flaccidis, colore virescente, foliis longioribus, lobulo saepe maximo apice exciso.

7. *Phragmicoma teretiuscula* Lindbg. et Gottsche.

Phr. caule repente rigidiusculo dichotomo-fasciculato, foliis imbricatis semiverticibus oblongo-ligulatis subfalcatis apice oblique-truncato acutis margine ventrali inflexis basi in lobulum complicatis ovato-quadratum majuscum subrepandum integerrimumve sed angulo plerumque introrsum vel involuto vel semiemerso versiformem, amphigastriis erecto-patentibus imbricatis obcordato-spathulatis apice repandis retusisve margine subreflexis, fructu laterali et in dichotomia sessili, perianthio oblongo trigono margine compresso, dorso convexo leviter sulcato, ventre alte angusteque unicarinato, foliis involucralibus subconformatibus lobulo majore. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 745. n. 9 b.

Liebmann fandt denne Plante med Perianthier i November paa Plantagen Zazuapan (2500—3000'), 5 Leguas fra San Antonio de Huatusco, ved Colipa (500—800') og paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') i Marts med Perianthier (Hb. Liebm. n. 535 b, n. 143 et 147 e. p. og n. 300).

Caulis semi—1-pollicaris, basi foliorum emortuorum rudimentis vestitus, dichotome divisus, rami subfasciculati, patentes, rigidiusculi. Folia imbricata, semiverticalia, oblongo-ligulata, subfalcata, distiche patentia (quum sicca sunt cauli circumvoluta, ut surculi teretes videantur) integerrima, apice obtuse lanceolata, margine ventrali repando-undulata vel inflexa et basi in lobulum versiformem complicata, interdum appressum et ovato-quadratum, margine libero repandum vel repando-angulatum, interdum (angulo plus minus inflexo vel involuto) oblongum ad speciem conicum.

Amphigastria erecto-patentia obcordata vel cuneato-rotunda, imbricata, apice rarius rotundata, plerumque retusa vel repanda, medio gibba, margine subreflexa, ceteroquin integerrima. Ex apice ramorum innovationes saepe prodeunt foliis minutis rotundis decurrentibus et amphigastriis planis subrotundis praeditae. Fructus vel laterales vel in

dichotomia sessiles, saepe gemini. Folia involucralia caulinis similia, sed lobulus longitudinaliter concaviusculus, major; amphigastrium obovatum concavum longitudinaliter gibbum, subconforme. Perianthium prismatico-triquetrum, compressum; dorso convexo levi sulco praeditum, ventre alte angustequaque carinatum.

XXII. *Omphalanthus Lindbg. et Nees ab Es. Synops. Hep. p. 303.*

1. *Omphalanthus filiformis Nees ab Es.*

O. caule repente subpinnato, ramulis distantibus abbreviatis superioribus elongatis subfasciculatis, foliis imbricatis distichis ovato-orbiculatis deflexis basi longe decurrente complicatis lobulo saccato infexo, amphigastriis folia aequantibus subrotundis integris et integerrimis margine subreflexis, perianthiis lateralibus obovato-cylindricis ore inflexis.

Synops. Hepat. p. 304. n. 2.

α^* forma latior.

Liebmann fandt denne Plante i Skovene paa Plantagen Mirador (3000') i Marts-Maaned med Perianthier (Hb. Liebm. n. 253 b); Frederik Müller samlede den i Omegnen af Vulkanen Orizaba (Hb. Müller. n. 2351. steril.).

2. *Omphalanthus debilis Lindbg.*

O. caule repente filiformi vage ramoso ramis brevibus, foliis oblique cordatis apice angustioribus modo obtusis, modo acutiusculis aut truncato-bi-tridentulis ample reticulatis basi decurrente subtus breviter complicatis lobulo truncato, amphigastriis folia aequantibus cordato-ovatis anguste profundiusque emarginato-bifidis, laciniis subconniventibus lanceolato-acutis, perianthiis subfasciculatim in ramo dispositis parvis oblongis pyriformibus, sursum acute quinquangulis, angulis cristatis dentatis mucronulatis, postea cyathiformibus.

α , *originalis*.

α^* *Liebmannianus*, involucro paullo recedens, ceteroquin qualis α .

α^{**} , paullo laxior, foliis minoribus.

β , *angustior*, longior, magis ramosus, folia minora, magis acuminata amphigastriaque flaccidula, lobuli minus distincti.

Synops. Hepat. p. 306 et 746 sq. n. 5.

Varieteten α^* samledes paa Plantagen Mirador i Juli (Hb. Liebmann. n. 27) og ved Zazuapan (2500') i November (n. 539 a) og Varieteten α^{**} blev samlet blomstrende i Juli ved Sanjago Amatlan (6000') (n. 309). Varieteten β fandtes paa Hacienda de Jovo (2000') (Liebmann Herb. n. 515).

Exemplaria Mexicana, quod ad folia et amphigastria attinet, omnino cum planta originali ex insula St. Vincentii conveniunt, sed caules cum foliis humectis paullo angustiora sunt ($\frac{9}{10}$ —1 lin. lati in planta originali, $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{5}$ lin. lati in plantis nostris). Folia subcordata $\frac{2}{5}$ lin. longa et $\frac{4}{3}$ lin. lata (in n. 309) vel $\frac{1}{2}$ lin. longa et $\frac{1}{3}$ lin. lata (n. 539 a) basi ventrali in lobulum parvum $\frac{1}{15}$ lin. longum, $\frac{1}{20}$ lin. latum, basi dorsali caulem superante in lobum liberum rotundum abeunte. Amphigastria cordato-orbiculata $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longa et aequa lata (in n. 539) vel $\frac{12-13}{30}$ lin. longa et $\frac{11-12}{30}$ lin. lata (in n. 309); lacinia amphiagastriorum apice curvo conniventes, interdum apicibus decussatis, incisura ubique fere $\frac{2}{15}$ lin. longa. Folia involucralia (in n. 309) $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{2}{15}$ lin. lata; amphigastrium involucrale $\frac{1}{8}$ lin. longum, $\frac{1}{5}$ lin. latum. Foliorum textura elegantissima, pellucida; in foliis praeparatis cellulae regulares, hexagonales, limite albo membranam primariam ostendunt; nucleus violaceus angulis et mediis parietibus locum incrassatum minutissimum obscurius tinctum habet levique ictu e cellula ejici potest. Areolae marginales foliorum et amphiagastriorum in hac planta, aequa atque in reliquis Omphalanthis, extrinsecus rotundatae, sub lentibus fortioribus margines crenulatos faciunt.

3. *Omphalanthus subalatus* Lindbg. et Gottsche.

O. monoecus, caule repente flexuoso vase inordinate ramoso bipinnato, foliis imbricatis cordato-ovatis apiculatis integerrimis, basi lobulo parvo convolutis, amphigastriis subimbricatis reniformi-rotundis, apice $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{7}$ sinu angusto margini fere parallelo incisis laciniis obtusis medio affixis basi lobis rotundis liberis decurrentibus, perianthiis cylindrico-turbinateis apice pentagonis angulis subalatis laevibus. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 747. n. 5 b.

Liebmann samlede denne Plante paa Plantagen Mirador (3000') iblandt *Chiloscyphus combinatus* i Januar og Februar med Perianthier (n. 262, 326).

Caulis 1—2-pollicaris, procumbens, flaccidus, flexuosus, inordinate subbipinnatus, ramis scilicet instructus aliis brevibus indivisis, aliis elongatis iterum pinnatim ramosis. Nonnulla specimina inveniuntur simpliciter pinnata, alia tripinnata. Folia imbricata cordato-ovata, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longa, basi $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. lata, oblique cauli adnata et basi dorsali supra caulem protracta, deflexiuscula, apiculata vel acuta, pleraque margine integerrima, nonnulla sub

apice altero margine exciso-unidentata, basi subtus in lobulum complicata parvum exciso-dentatum ab amphigastriis tectum. Retis maculae rotundae; subaequales. Amphigastria magna, $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, contigua subimbricatave, reniformi-rotunda, medio cauli affixa basi laciniis liberis rotundatis decurrentia, integerrima, brevi spatio ($\frac{1}{15}$ lin.) incisa, laciniis obtusiusculis. Folia involucralia ovato-acuta vel in apicem longiorem producta, margine angulato repando et ad apicem denticulo uno alterove instructa, perianthium medium usque obvallantia. Amphigastrium involucrale majus obovatum, apice breviter acute incisum. Perianthium obconicum $\frac{1}{2}$ lin. longum, apice $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ lin. latum, tubulo oris prominente, angulis carinisque rotundatis prominentibus pentagonum. Seta tenuis, flexuosa, noduloso-articulata, vix e perianthio egressa. Capsula ovata, ad medium quadrifida, valvis ovatis erectis pellucidis e duobus cellularum stratis compositis. Elateres tenuissimi, unispiri, flexuosi. Inflorescentia mascula in ramulo proprio ejusdem ac feminea stirpis, e paribus 6 foliorum perigonialium composita.

Differt ab *Omphalantho pterogonio* proximo statura ramosiore, foliis evidentius complicatis et perianthii conformatione, cuius apex in angulos quinque laeves dilatatur, qui nec dentibus singulis nec cristis dentatis, ut in *Omphalantho pterogonio* et *debili*, ornantur. Amphigastriorum forma et incisura tamen ad *Omphalanthum pterogonium* et *O. debilis* formam peruvianam proprius accedit.

Obs. *Omphalanthus pterogonius* e Mexico, in Synops. Hepat. p. 306. n. 6. allatus, hujus loci est.

4. *Omphalanthus isocalycinus* Nees ab Es.

O. caule procumbente strictiusculo ramulis brevibus pauciramoso, foliis distichis subimbricatis ovato-cordatis acutis integerrimis planis basi subtus obsolete complicatis, amphigastriis foliorum magnitudine cordato-orbiculatis acute breviterque bifidis laciniis conniventibus, fructibus secundis seriatim dispositis in ramulo brevi laterali, perianthiis obconico-cylindricis laevibus, ore truncato umbonato.

Synops. Hepat. p. 305. n. 4.

β. *Müllerianus*, major, perianthiis apice minus tumidis.

Gottscche Icon. Hepat. inedit.

Fred. Müller fandt denne Plante krybende iblandt andre Hepaticae i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Rio blanco (Hb. Müller. n. 2324) i Januar med Perianthier.

Caulis vel rami primarii 2—3-pollicares, recti, flavo-virides, cum foliis humectis $\frac{2}{3}$ —1 lin. lati. Folia ovato-cordata $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ lin. lata, basi dorsali in lobum

rotundum liberum abeuntia, ita ut basis folii cauli vere affixa $\frac{1}{5}$ lin. aequet; in plerisque lobulus oblongus minutus, $\frac{1}{15}$ lin. longus, $\frac{1}{30}$ lin. latus, conspicitur. Amphigastria fere orbicularia $\frac{1}{2}$ lin. lata, fere $\frac{2}{5}$ lin. longa, incisura $\frac{1}{15} - \frac{1}{20}$ lin. longa; medio fere affixa, basi in lobulos liberos rotundos $\frac{2}{5}$ lin. altos decurrentia. Perianthium $\frac{2}{5}$ lin. longum, $\frac{1}{5}$ lin. latum, apice subangulato-sulcatum in facie ventrali carinae obtusissimae rudimenta aemulans. Folia involucralia minora ovato-lanceolata, $\frac{1}{4}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{6}$ lin. lata, lobulo angustissimo, $\frac{1}{50}$ lin. lato, minuto oblongo praedita; amphigastrium involucrale ova-
tum $\frac{1}{5}$ lin. latum, $\frac{1}{4}$ lin. fere longum.

5. *Omphalanthus lusorius* *Lindbg. et Gottsche.*

O. monoecus, caule repente flexuoso vase ramoso, foliis contiguis vel subimbricatis brevi-ovatis apiculo acutis integerrimis basi lobulo nullo complicatis, amphigastriis distan-
tibus ovato-rotundis ad medium bifidis minoribus, perianthiis confertis exsertis cylindrico-
turbinatis, apice pentagono-angulatis subalatis laevibus, foliis involucralibus subserrato-
dentatis.

Synops. Hep. p. 747. n. 5 c.

β , foliis involucralibus subintegerrimis, caulinis plerisque lobulo praeditis. —
Gott sche Icon. Hep. inedit.

Fr. Müller fandt Var. β i Juli med Perianthier i Districtet Orizaba i Omegnen af Saugmøllen Aserradero de Santa Cruz iblandt andre Hepaticae.

Caules vel rami primarii $1\frac{1}{2}$ —2-pollicares, cum foliis humectis viridibus $\frac{2}{3} - \frac{5}{6}$ lin.
lati. Folia varietatis β formâ paullo diversa, ovato-acuta, $\frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, basi
plerumque in lobulum $\frac{1}{15}$ lin. longum, $\frac{1}{20}$ lin. latum complicata. Amphigastria ovato-rotunda
 $\frac{1}{6} - \frac{1}{5}$ lin. longa et aequa lata, incisurâ $\frac{1}{15}$ lin. longâ fere ad medium bifida. Perianthia
obconica, $\frac{1}{2}$ lin. longa, apice $\frac{1}{6}$ lin. lata, ore tubuloso inter angulorum sinus prominulo;
apice quinque-alata, alis $\frac{1}{15} - \frac{1}{10}$ lin. longis rotundis sine ulla crista vel prominentia; pe-
rianthium apice fructus egressu apertum nihil nisi apiculos 5 tubuli disrupti monstrat.
Folia involucralia (— in forma originali ovato-lanceolata, serrata cum amphigastrio lae-
viore —) in nostra planta elliptico-acuta, repando-angulata, $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{10}$ lin. lata; am-
phigastrium involucrale $\frac{1}{5}$ lin. longum, $\frac{2}{5}$ lin. latum. Inflorescentia mascula femineac
proxima in eadem stirpe, e 3—4 paribus foliorum perigonialium conflata.

XXIII. *Lejeunia Lindbg. et Gottsche. Synops. Hepat. p. 308.*

A. *Amphigastriis indivisis.*

1. *Lejeunia phyllorhiza Nees ab Es.*

L. caule ex amphigastriorum dorso repente subpinnatim ramoso apice fasciculato, foliis distichis verticalibus patentibus suborbiculatis integerrimis, margine ventrali fere toto in lobulum conicum introrsum revolutum apiceque transeuntem late complicatis, amphigastriis imbricatis reniformi-quadratis subretusis integerrimis dorso gibbis, fructu laterali et terminali, perianthio obovato compresso dorso concaviusculo ventre obtuse carinato apice cristato-ciliato, foliis involucralibus (plerumque unico tantum praesente) duplo minoribus ovato-lanceolatis angulato-repandis lobulo parvo oblongo complicato, amphigastrio oblongo-rotundo.

Synops. Hepat. p. 312 n. 3. Nees ab Es. in Mart. Fl. Bras. I. 1. p. 348. n. 30.

β , foliis involucralibus apice dentatis. — *Synops. Hep. p. 748. n. 3. Phragmicomia suberistata Lindbg. et Gottsche. Synops. Hep. p. 744 n. 4 b.*

Liebmann fandt denne Art paa forskjellige Steder i Departementet Vera Cruz, paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') ♀ og ♂, i Omegnen imellem Mirador og Totutla ved Dos Puentes (4000') og i Nærheden af San Antonio de Huatusco (4500') i September og i Februar. (Herb. Liebm. n. 357 b, 483 b).

Exemplaria Brasiliensia originalia (Var. α) ab Illustrissimo Martio collecta, folia arctius imbricata habent et tota statuta minora sunt; folia involucralia plerumque ovato-lanceolata repando-angulosa, rarius autem dentem ostendunt (semel tantum apicem dentato-spinosum vidi); in exemplaribus nostris plerumque unicum modo folium perichaetiale invenire contigit. Exemplaria Mexicana (var. β) statuta robustiora, folia laxius imbricata habent; involucralia apice acuto 6-8-dentata sunt (dente medio apicali majore), et lobulus lanceolatus integerrimus fere medium folii attingit. Folia subinvolucralia prima, aequa atque in exemplaribus Martianis duplo majora, apiculata sunt vel rarius denticulos nonnullos obtusos ostendunt; paria sequentia caulinis similia sunt. Amphigastrium involucrale obovatum, apice rotundum, latius quam in exemplaribus Brasiliensibus. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta singularem praebent adspectum, quia cellularum parietes laterales praesertim incrassati strias violaceas fere ad instar radiorum flabelli tractu parallelo subarcuato a folii apice et margine ad medianam basin decurrentes efficiunt. In foliis junioribus incrassatio punctiformis angularis; mox accedit incrassatio parietalis inter angulos, et si deinde totus paries latius incrassatur, puncta illa primaria, quae modo dixi, colore obscuriore violaceo prae aliis observantur. In medio folii disco etiam in cellula hexagona magis regulari lumen propter marginem incrassationis crenulatum oblongum videtur; si cellulæ

inter se ictu leviore separantur, angulos saturatius coloratos conice prominentes acutos ostendunt; cellulae marginales minores, plerumque quinquangulares, transversae. Sacculus primordialis in grumulos diffusos in omnibus cellulis coctione solvit.

Obs. Exemplaria Columbica a cl. Moritz collecta foliis subapiculatis ab exemplaribus Mexicanis et Brasiliensibus paullum recedunt, sed tamen folia involucralia apice dentata acuta, aequa atque exemplaria Mexicana, habent.

2. *Lejeunia Hobsoniana Lindbg.*

L. monoeca, caule adscendente dichotomo, ramis divaricatis, foliis distichis basi imbricatis horizontalibus ovatis integerrimis apiculatis, margine ventrali oblique levi sinu descendantibus, basi complicatis, lobulo parvo infexo, amphigastriis contiguis orbiculatis decurrentibus integerrimis medio gibbis margine subreflexis, perianthiis lateralibus obcordatis compressis dorso concaviusculis margine cristato-ciliatis, facie ventrali convexis laevibus vel parce spinulosis; involuero minore, foliis involucralibus fere aequaliter bilobis, amphigastrio fere aequa magno apice emarginato.

Synops. Hep. p. 313. n. 5.

β , *confertior*, foliis fere imbricatis magis ovalibus margine ventrali rectiore; perianthio facie ventrali spinuloso (30 vel ultra tubercula monstrante). — Fortasse propria species. —

Synops. Hepat. p. 748. n. 5 β .

Liebmann fandt denne Art (Varieteten β) paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') ved San Antonio de Huatusco (4500') og i Nærheden af Santa Maria Tlapacoyo paa Hacienda de Jovo (1800—2000') i Departementet Vera Cruz. (Hb. Liebmann. n. 372 b, 559, 542, 570 b, 588.)

Caules ex amphigastriorum radicellis repentes bipollicares et ultra, fusco-virides, inordinate ramosi, cum foliis $1\frac{1}{2}$ lin. lati. Folia ad tertiam latitudinis partem imbricata, horizontalia, subovalia, $\frac{2}{3}$ lin. longa, vix $\frac{1}{2}$ lin. latitudinem parte latissima ostendunt; margo dorsalis paullum arcuatus, ventralis rectiusculus levi sinu versus lobulum descendens; lobulus parvus, margine superiore cucullatum versus folii discum reflexo, deinde per sinum leviter repandum in marginem ventralem transeunte. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta monstrant cellulas hyalino-marginatas, incrassationem angularem punctiformem et interangularem habentes, quae in cellula hexagonalis regulari ad 12 puncta violacea adscendit; cum tamen inter angulos saepe 2 puncta intermedia incrassata sint, in multis cellulis 15 puncta numerantur. Saccus primordialis solvit; tamen granula chloro-

phylli hinc inde in cellula sparsa videntur; si autem acido sulphurico concentrato calido utaris, granula chlorophylli versus marginem luminis cellulae coacervata coronam extrinsecus crenulatam propter incrassationes membranae secundariae intus prominentes formant. Ictu levi cellulae rarius inter se solvuntur, sed nucleus totum violaceum interdum e dirupta membrana primaria ejicere contingit; tamen ex punctis hyalino-roseis angulorum ruptura embo-lorum membranae secundariae locum habuisse videtur. Cellulae singulæ tabulatae, sub-planae, angulis acute prominentibus praeditæ. Amphigastria imbricata, transversali-rotunda, $\frac{1}{2}$ lin. lata, $\frac{2}{5}$ lin. alta, medio gibba et toro radicularum obsita; ejusdem texturæ ac folia. Perianthium $\frac{5}{6}$ lin. longum, $\frac{1}{2}$ lin. latum, margine spinosum, dorso laeve, ventre plus minus spinulosum; in exemplari laeviore circa 16 tubercula, quorum 4 longiora, in spinosiore circa tubercula 36, inter quae 13 longiora erant, numeravimus; in specie originali *Lejeuniae Hobsonianae* e contrario unam alteramve spinulam tantummodo in ventre invenimus. Involucrum idem atque in *Lejeunia transversali*; folia involucralia fere aequaliter biloba (lobus dorsalis $\frac{1}{3}$ lin. longus et $\frac{1}{6}$ lin. latus); amphigastrium ovale basi subcontractum, apice leviter re-pandum, $\frac{1}{3}$ lin. longum, $\frac{1}{6}$ lin. latum.

Ramuli masculares in eadem planta ac feminei; folia perigonalia saccata in gremio unum antheridium continent.

Omnès fere plantæ, quae ad *Lejeuniam Hobsonianam* referuntur, paullum inter se variant, sed parva exemplarium copia accuratiæ notitiae adhuc obstat; omnium tamen simillima nostræ videtur planta ex insula Trinitatis, quam def. horti botanici director Crüger collegit; amphigastria tamen minus lata et perianthia ventre adhuc spinosiora sunt. *Lejeunia barbiflora* G. (Linnaea t. 24. p. 630) foliis brevioribus, amphigastriis majoribus transversa-libus saepius margine reflexis diversa est.

3. *Lejeunia Sagraeana Montgn.*

L. monoeca, caule repente subpinnatim ramoso conferto, foliis imbricatis ovato-rotundis obtusis integerrimis, basi in lobulum complicatis inflatum apice extrorsum subuni-dentatum, amphigastriis foliis minoribus contiguis reniformi-rotundis planis, fructu in ramulis lateralibus brevibus, foliis involucralibus cuneiformi-ovovatis minute denticulato-serratis basi obsolete complicatis, perianthio subimmerso obovato-rotundo compresso dorso concavo (interdum laciniola 1—3-dentata in medio ornata) ventre bicarinato, marginibus angulisque cristato-incisis laciniis lanceolatis.

Synops. Hep. p. 314 et 750. n. 9.

Liebmann fandt denne Plante paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') (n. 53),

i Omegnen af Hacienda de Jovo (1800—2000') og omkring San Antonio de Huatusco (4500') i Dep. Vera Cruz (n. 436.) med Perianthier og Antheridier.

Planta Mexicana omnino convenit cum planta Cubana, cuius exemplaria originalia a Montagneo missa et majorem copiam a cl. Wright collectam comparare potui; tamen amphigastrium involucrale in omnibus integerrimum vel levissime repandum erat, nec dentatum, quale in Synopsi nostra (p. 315) describitur. Folia involucralia, apice obtusa in exemplari originali parcus et obsoletius dentata, in nostris Mexicanis dentes evidentiores ostendunt, sed in statu juniore minus armata et interdum fere inermia videntur. Perianthii cristae laterales latae, latitudinem spatii a carina ad marginem aequantes vel superantes, e laciniis lanceolatis saepe uno altero dente armatis consistentes. In dorso perianthii speciminis originalis in plicula subelevata laciniolam tribus dentibus cristata inveni, quod et in exemplaribus Cubanis a cl. Wright collectis et in specimine Trinitensi a cl. Crüger misso observavi. Sporae majores, granulatae.

Folia ubique apice obtusa et rotundata, basi paullo latiora, breviter ovata vel ovalia, margine ventrali in lobulum inflatum oblongo-quadratum angulo libero rotundatum complicata. Textura vulgaris, incrassatio angulorum et intermedia parietalis in foliis fortior quam in amphigastriis.

Perigonia in basi vel in apice ramorum vulgaris formae, foliorum perigonialium 5 vel plura paria inveniuntur.

Obs. Cum exemplaribus Cubanis et Mexicanis specimina Surinamensia a Spitgerber allata (var. β Synops. Hep. I. c.) et Brasiliensia, in insula Sctae Catharinae ab hortulano Pabst collecta (in Hb. Carol. Müller n. 334 β) omnino convenient. Multo magis autem recedunt specimina Brasiliensia, quae sub var. γ in Synopsi nostra commemorantur, foliis involucralibus acutis et perianthii cristis brevioribus; haec fortasse ad speciem sequentem adnumerari debent, sed folia apice rotundata habent, vel rarissime tantum folium apice acutiusculo invenitur. Specimina originalia var. γ perianthia semiemersa angulis laciniolis simplicioribus minoribus armata habent; folia involucralia denticulata lobum parvum plurumque explicatum oblongum et apicem lanceolatum ostendunt, amphigastrium involucrale margine supero subrepandum; perianthia et folia involucralia juniora minus dentata et amphigastrium involucrale junius repandum. Hisce originalibus exemplaribus omnino similia invenerunt ad Desterro (insulae Sctae Catharinae, Brasiliae) hortulanus Pabst et prope oppidum Caldas clar. Lindenbg. (sub n. 35). Planta ex insula Trinitatis a clar. horti botanici directore Crüger missa huic varietati γ adnumeranda, perianthia ex involucro semiemergentia ostendit, dorso concaviuscula, medio tamen plicâ subelevata nudâ instructa; folia involucralia aut servant lobulum parvum explicatum aut basi anguste reflexa sunt; amphigastrium involucrale transverse orbiculatum. Folia caulina apice rotundata, (rarissime apice acutum

vidi) lobulo subsaccato majore arcu versus caulem descendunt, itaque sinum notabiliorem marginis ventralis ostendunt; amphigastria distantia reniformi-rotunda.

4. *Lejeunia Mülleriana* *Gott sche.*

L. caule repente subpinnatim ramoso conferto, foliis subimbricatis ovato-acutis integerrimis apice reflexis, basi in lobulum inflatum complicatis, amphigastriis foliis minoribus imbricatis contiguise rotundis subplanis, fructu in ramis terminali vel in innovatione sub folio subinvolucrali primo proveniente, foliis involucralibus ovato-lanceolatis serrato-denticulatis basi in lobulum oblongum complicatum vel explicatum transeuntibus, amphigastrio involucrali majore obovato-rotundo superne leviter repando, marginibus lateralibus plus minus reflexo, perianthio piriformi quadrangulo compresso, dorso concaviusculo medio subelevato, ventre bicarinato, marginibus angulisque lacinulato-cristatis.

Frederik Müller fandt denne Plante i Omegnen af Vulkanen Orizaba med Perianthier og Perigonia.

Plantae habitu *Lejeuniae Sagraeanae* stratis sibi superpositis caespites nigros formantes in terra crescent; caules singuli propter ramos intricatos difficulter solvendi plerumque franguntur, sesquipollares vel longiores. Folia ovalia, acuta, apice reflexa, interdum, sed rarius rotundata; lobulus major oblique truncatus, margine superiore cucullatum inflexus, quare prope caulem inflatus est, angulo libero depresso, ut interdum non observetur. Folium subinvolucrale apiculatum (interdum jam paria antecedentia apiculata), folium involucrale ovato-lanceolatum, denticulatum (in juniore obsoletius); lobulus oblongus, quartam folii latitudinis partem aequans, aut explicatus appendiculumque formans aut, ut fieri solet, complicatus. Perianthia juniora immersa ut in *L. Sagraeana*, sed mox emergunt, ita ut involucrum ad medianam fere altitudinem assurgat, quod in *L. Sagraeana* multo serius locum habet, nec ante germinis perfectam maturitatem. Textura qualis in *Lej. Sagraeana*, cellulae in angulis et in medio pariete incrassatae, unde paries lateralis intermedius nodulosum praebet adspectum.

Proximae huic sunt formae sub *Lejeuniae Sagraeana* varietate γ recensitae; omnino huic convenient, si apices foliorum negligas. *Lejeunia subfusca* (originalis!) differt amphigastriis distantibus minoribus, foliis apice obtusis rotundatis, foliis involucralibus fortius lobulatis et amphigastrio obovato angustiore plus minus repando. *Lejeunia nigricans* (originalis!) differt amphigastriis distantibus adhuc minoribus rotundis, sed foliis acutis magis cum nostra convenit.

5. *Lejeunia devexa* *Lindbg. et Gottsche.*

L. caule densis stratis repente ramoso arrhizo, foliis imbricatis ovatis obtusis integrerrimis, apice rotundatis, margine dorsali arcuato-devexit, ventrali sinuato-complicatis, lobulo convoluto subconico apice introrsum reflexo unidentato (ad speciem rotundo-truncato), amphigastriis erecto-patentibus rotundatis parvis dissitis concaviusculis, margine supero anguste inflexis, fructu in dichotomia, perianthio . . ., foliis involucralibus majoribus ovatis margine repandis lobulo ovato-quadrato, amphigastrio involucrali obovato integerrimo.

Synops. Hepat. p. 750. n. 10 b.

Liebmann samlede denne Art i Skoven i Omegnen af Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Februar.

Plantae stratis densissime sibi superpositis caespites flavo-fuscous formant, e quibus propter ramos inter se quam maxime intricatos caules longiores quam bipollicares difficulter solvi possunt. Folia ovata vel ovalia vel propter sinum marginis ventralis fere reniformia, margine dorsali arcuato-devexa, apice rotundata, margine ventrali ante lobulum emarginato-sinuata, integrerrima, flavo-fusca; lobulus convolutus, conicus apice rotundo-truncato in marginem transit, sed, si dissectione explicatur, subquadratus, margine laterali libero lunulatus et in angulum productum dentiformem transiens, margine supero introrsum reflexus est. Amphigastria remota, parva, erecto-patentia, duplarem caulis latitudinem aequantia vel paullo excedentia, interstitia inter lobulos foliorum expletia lobulosque omnino nudos relinquuntia, margine incurva, unde ad speciem circumcirca incrassata videntur, medio subgibba, arrhiza. Folia involucralia magis ovata, integrerrima, lobulum complicatum oblongum margine supero libero rotundum, lateraliter profundius lunulatum itaque unidentatum habent; amphigastrium obovatum apice leviter repandum. Textura crassior; in foliis coctis et tinctis tantummodo incrassatio angulorum (nec intermedia parietum) observatur.

Sterilis ad formas *Lej. subfuscae* accedit, sed tamen foliorum declivitate lobulique dente incurvo dignosci potest; fertilem involucrum integerrimum primo aspectu distinguit.

6. *Lejeunia incongrua* *Lindbg. et Gottsche.*

L. caule repente ramoso subfasciculato, foliis imbricatis ovato-cordatis deflexis acutis margine ventrali sinuato-complicatis, lobulo lato-ovato basi anguste inflato margine libero subintegerrimo (dentibus duobus minutissimis armato) apice acuto in folium transente, amphigastriis parvis rotundis subcontiguis (fere lobuli magnitudine), fructu in dichotomia, perianthiis piriformi-subcompressis (interdum ventre obtuse carinatis) laevissimis

apice usque ad angulum ciliato-cristatis; foliis involucralibus integerrimis parvilibulatifs (lobulo oblongo minore externe subalato), amphigastrio involucrali obovato apice rotundo.

Synops. Hepat. p. 750. n. 11 b.

Liebmam fandt denne Art i de tætte Urskove, som bedække Siderne af Cerro de Sempaltepec, voxende sammen med flere Hepaticae, i Juni, med fuldkommen Frugt, (♂ et ♀, Hb. Liebmam. n. 170 b).

Caules pollicares, fuscantes, inter alias Hepaticas repentes, flexuosi, inordinate ramosi, versus apicem subfasciculati. Folia ovata, acuta, apice oblique reflexa; lobulus magnus, margine libero depresso versus folii discum, margine complicato in conum oblongum inflatus; angulus lobuli externus dente (e cellula unica vel duabus prominulo) semper notatur, cui saepissime posterior alter similis accedit. Amphigastria fere triplicem caulis latitudinem habent, lobulorum interstitia expletia, alterius lobuli partem minorem tantummodo obtegentia, rotunda. Perianthia piriformia margine supero et laterali usque ad angulum simpliciter ciliato-cristata, dentibus retroversis varie curvatis utrinque 9—10 lanceolatis e duabus seriebus cellularum confectis, ventre obtuse unicarinata, carina plus minus conice elevata, omnino nuda. Capsula e duobus cellularum stratis composita est, quorum exterius cellulis majoribus tabulatis flavescentibus subquadratis marginibus subaequaliter et angulis fortius incrassatis componitur, dum interius cellulis duplo triplove minoribus hyalinis inaequaliter fortiusque incrassatis (incrassationibus e parietibus introrsum valde prominentibus) conformatur. Semina permagna, 0,09 millim. longa, granulosa, ambitu valde variantia, e sporis adjacentibus impressiones multas in superficie monstrantia vel interdum emarginata; ita polymorpha, ut propter singularem formam eorum dubites, sitne in hac planta sporarum genitura eadem, quae in aliis Hepaticis ex paucissimis observationibus statuitur, hoc est, reverane quatuor semina ex una cellula matricali prodeant, an cellulae matricales ipsae spora fiant, cui tamen sententiae sporodermis granulosa obstat, quae secundum communem botanicorum opinionem in cellula matricali formari debet. Elateres unispiri, apice tubaeformes, basi valvulis affixi; praeterea inveniuntur nonnulli liberi, utroque fine subattenuati; in omnibus autem fibra spiralis decolor, quae praeparatione nota violacea fit, dum tubulus colorem hyalino-violaceum accipit. Foliorum structura vulgaris; incrassatio angularis et intermedia parietalis, postremum totum fere parietem invadens, et in cellulis majoribus disci marginem violaceum latiore ostendens; saccus primordialis coctione in grumulos subrotundos flavescentes coagulatur.

Lejeunia Loxensis differt colore flavo-rufescente et statura robustiore, ceteroquin nostra est simillima, foliorum lobulus margine libero denticulos duos minutissimos quoque ostendit; sed quia fructificatio hucusque ignota est cum nostra fertili conjungi non potest.

7. *Lejeunia axillaris* Nees ab Es.

L. caule ramoso, ramulis apicem versus bi-trifidis patulis, foliis subverticalibus imbricatis decurvis ovatis apice bi-tri-(pluri-)dentatis margine integerrimis basi decurrenti-saccatis, lobulo oblique truncato, amphigastriis folio dimidio minoribus ovalibus obtusis integerrimis margine subreflexis, fructu in dichotomia subsessili et lateralii, foliis involucralibus aequae atque amphigastrio apice spinoso-dentatis lobulo minimo rotundo, perianthio obovato vel obcordato compresso dorso postremum convexo ventre obtuse unicarinato margine lateralii et ore ciliato-dentatis.

Synops. Hepat. p. 317. n. 13.

Liebmann fandt denne Plante i Skovene omkring San Antonio de Huatusco (4500') i November; Leibold sandsynligviis i Omegnen af Plantagen Zacuapan (2500—3000'), og Fr. Müller i Skovene paa Vulkanen Orizaba, og i dens Omegn ved Rio blanco og Aserradero de Santa Cruz i Juli med udstøvet Frugt.

Specimina Mexicana omnino cum exemplaribus originalibus convenient. Foliorum textura vulgaris; cellularum incrassatio angularis et intermedia parietalis, ita ut paries communis duarum cellularum nodosum praebeat adspectum. Capsula e duobis stratis componitur; stratum externum cellulas majores subquadratas tabulatas parietibus fere aequaliter incrassatas ostendit, stratum interius cellulas habet minores, sed parietum incrassationes in cavum cellulae tamquam excrescentiae prominent. Capsulae cum liquore kali caustici coctae et zinco bijodato tinctae egregiam imaginem, similem fere atque in *Lejeunia serpyllifolia* nostrate, praebent. Valvulae ovato-lanceolatae usque ad locum conjunctionis serie cellularum minorum transverse-quadratarum marginatae sunt, quam utrinque series cellularum multo majorum sequitur, quarum singulae ubique binas cellulas marginales latitudine aequant; versus medium valvulam magnitudine cellulae crescent, sed tamen ita dispositae sunt, ut parietes laterales tractu parallelo cum marginibus valvularum decurrant. Hae cellulae majores colore saturatiore imaginem linguae formant et fere ad medium valvae longitudinem descendunt, ita ut apex hujus linguae fere puncto, ubi valvulae inter se coalescunt, respondeat; cellulae aliter formatae, margine non incrassatae, colore pallidiores, 3 vel 4 seriebus positae, spatium inter apicem linguae et margines explent. In valvularum apicibus haerent elateres monospiri, fere $\frac{1}{6}$ lin. longi, cuius fibra decolor est cujusque tubus tota longitudine utrinque alternatim repandus et contractus versus fibram spiralem in imagine microscopica appareat; sistit igitur elater columnam spiraliter tortam. In exemplaribus coctis et tinctis fibra spiralis fusco-violacea est, dum tubulus hyalinus etiam levissime tinctus fere columnam solidam sistit, cum canalem spiralem aeriferum fere capilli crassitie, si $\frac{3}{1}$ augetur, monstrat. Semina magna, angulosa, polymorpha, granulosa, parietibus crassis inclusa, sporis

Lejeuniae serpyllifoliae similia, sed majora. Inter has sporas nonnullos elateres triplo vel quadruplo minores, utroque fine subcoaretatos (nec apice tubaeformi) unica fibra spirali decolori percursos, inveni. In capsulis nondum effoetis semina in columnas deposita et angulis ita se invicem excipientia apparent, ut pro cellulis matricalibus habeas, quae nondum in sporas solutae sunt. Num forte cellulae matricales in hoc genere non amplius dividuntur, sed tantum solvuntur et sporodermide granulosa obducuntur?

8. *Lejeunia aberrans* Lindbg. et Gottsche.

L. monoeca, caule intricato ramoso, foliis imbricatis ovato-acutis integerrimis vel apice ventrem versus reflexo uno altero dente armato subintegerrimis, margine ventrali sinuato-complicatis, lobulo magno ovato-quadrato truncato sulco longitudinali medio exarato, amphigastriis subimbricatis subrotundis integerrimis, perianthio laterali pentagono compresso, angulis subalatis cristato-dentatis, foliis involucralibus minoribus subconformibus lobulo parvo, amphigastro majore conformi. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 751 n. 18 b.

β , *conferta*, foliis arctius imbricatis, perianthii crista dorsali obsoleta vel nulla.

Phragmicoma acuminata Synops. Hepat. p. 745. n. 19 b.

Liebm. fandt begge Former i Nærheden af San Antonio de Huatusco (4500') i Departementet Vera Cruz i Marts, voxende sammen med flere andre Hepaticae (Hb. Liebm. n. 395 ex parte (var. α) og n. 347 e. p. (var. β). Fred. Müller samlede ogsaa nogle Grene mellem andre Hepaticae i Districtet Orizaba, paa Sierra de San Cristobal.

Frustula pauca, 6-9 lineas longa, ex aliis Hepaticis decerpta. Caulis flexuosus, inordinate fasciculato-ramosus. Folia ovato-acuta vel oblique cordata, apice recurva reflexave, vel interdum hamato-reflexa, margine ventrali basi sinuato-complicata; lobulus magnus ovato-quadratus, apice truncatus vel angulo inflexo plerumque in folium transiens, sulco longitudinali plus minus exaratus. Color viridis vel viridi-flavescens. Textura, qualis in *Lejeunia phyllorrhiza*; in foliis praeparatis rete hyalinum exactissime hexagonum; series marginalis ex more cellulas quinquangulares minores, interpositis quadratis, monstrat. Cellularum anguli triangulo sphaericō incrassati; praeterea incrassatio intermedia parietalis adest, ita ut paries communis duarum cellularum vicinarum nodulosa appareat. Cum parietes cellularum laterales (nec apicales nec basales) praeparatione praecipue colorentur, observatori folium lineis violaceis e media basi divergentibus depictum videtur. Amphigastria caule triplo latiora, lobulum dimidium fere tegentia, orbicularia vel transverse rotunda, margine subreflexa, medio gibba et toro haustorio praedita. Folia involucralia

minora, angustiora, margine repanda vel apice subcrenato-dentata; lobulus parvus oblongus; amphigastrium majus caulinis subconforme. Perianthium obovato-prismaticum, apice pentagonum, carinis et angulis cristato-dentatum; interdum inter binas carinas ventrales unum alterumve tuberculum solitarium conspicitur. Semina magna, oblonga, angulosa, sporodermide granulosa obducta. Spicae masculae parvae laterales, in ramulo brevi inter ramulos feminineos insidentes, e tribus foliorum paribus compositae, unicum vel bina antheridia in gremio cuiusvis folii perigonialis foventes.

Var. β . habitu paullum aliena, folia dense imbricata, magis convexa habet flavofusca; lobulus margine libero sub lente forte subrepandus vel etiam prominentiam maiorem ante angulum productum ostendit. Perianthium obovato-prismaticum, quadrangulare, dorso concavum carina obsoleta vel nulla, ventre bicarinatum, angulis et carinis dentato-cristatis. Sporae ejusdem formae atque in α . Spicarum muscularum dispositio et foliorum structura omnino varietati α convenient.

9. *Lejeunia Mexicana Lindbg.*

L. caule repente dichotomo, ramulis superioribus fasciculatis, foliis imbricatis ovato-acuminatis integerrimis flaccidis basi complicatis lobulo vel minore vel majore quadrato, margine libero minutissime bidentulo exterius truncato, amphigastriis distantibus rotundis integerrimis, perianthiis in dichotomia sessilibus dorso laevibus planis ventre obtuse unicarinatis, carina sublaevi (subalatâ vel lacinulâ una alterave armata) marginibus lateralibus oreque parce spinosis, foliis involucralibus ovato-lanceolatis subintegerrimis, amphigastro integerrimo rotundo apice subrepando.

Synops. Hepat. p. 325. n. 30.

Den fandtes iblandt *Hypnum tamariscinum* paa Træer i Mexico (Hb. Nees.) uden nærmere Angivelse af Findestedet.

Habitus *Lejeuniae axillaris*. Folia adulta lobulum minutissime bidentulum margine libero monstrant, si trecenties augentur; juniora lobulum angulatum habent. Cellulae in angulis incrassationem punctiformem et intermedium parietalem monstrant; in foliis coctis et tinctis striae violaceae subrectae juxta parietes laterales conspicuntur, unde folia lineis violaceis depicta apparent, quod tamen in adultis tantummodo locum habet. Incrassationes punctiformes primariae tamquam puncta saturatius colorata perlurent, praesertim si a latere conspicuntur. Rete hyalinum hexagonale membranae primariae proprium elegantissime striis violaceis distinguitur; in serie marginali paries hyalinus inter cellulas extrorsum rotunde prominet. Folium involucrale, plerumque alterum, minute parceque repando-dentatum. Perianthii venter carina plus minus elevata, laevi vel subarmata variat; vidi

semel cristulam laciniolis tribus ornatam, saepius autem dens unus vel duo discreti inveniuntur.

Differt a *Lejeunia axillari* forma et perianthio parum armato, foliis integerrimis involucroque diverso.

10 *Lejeunia dubiosa* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente ramoso, foliis imbricatis cordatis (vel ramulorum ovato-acutis) apice 2—3-dentatis vel bidentulo-truncatis plus minus reflexis basi sinuato-complicatis, lobulo ovato-quadrato apice truncato (ramulorum minore), amphigastriis contiguis dissitusculis rotundis integerrimis margine subreflexis, fructu . . .

Synops. Hepat. p. 752. n. 30 b.

Liebmann fandt denne Plante i de skyggefulde Skove, som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec, uden Frugt i Juni. (Hb. Liebmann. n. 200 ex parte.)

Caules aliis Hepaticis irrepentes, 1— $1\frac{1}{2}$ pollicares, parce ramosi, flavescentes. Folia laxius imbricata, interdum contigua, cordata, basi dorsali caulem transgredientia, integerima, apice decurva vel reflexa, bidentula vel angulose truncata, vel praesertim in novellis ramis tridentata, margine ventrali arcuato descendente sinuata et in lobulum majorem subquadratum (sub fortioribus lentibus $\frac{3}{1}$ margini libero subbidentulum) transeuntia. Amphigastria fere orbicularia; ab altero latere majorem lobuli partem obtegunt, quadruplo caulis latitudinem superantia, basi media ad tertiam partem exsecta utrinque decurrentia; in media parte gibbositatem piriformem ostendunt. Textura foliorum vulgaris, incrassatio angularis cellularum et intermedia parietalis, nodulis circumscripte rotundis in pariete communi cellularum adjacentium; exinde interior cellulae ambitus crenulatus apparel. Cellulae disci tabulatae, planatae, ita ut in margine folii complicato haud rotunde promineant, sed interdum parietes laterales subprominentes ostendunt.

11. *Lejeunia Crescentiae* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente ramoso, foliis imbricatis ovato-ellipticis integerrimis apice rotundis basi sinuato-complicatis, lobulo magno ovato-subquadrato convoluto apice subbidentato transeunte, amphigastriis dissitusculis subrotundis (in ramulo florali emarginatis bifidis), fructu in ramulis longioribus brevioribusve lateralibus terminali, perianthio ovato-triquetro compresso laevi brevimucronato ventre alte carinato, foliis involucralibus elliptico-lanceolatis integerrimis, amphigastrio involucrali obovato-lanceolato carinato margine integerrimo apice bifido.

β , *minor*, statura duplo minore, ceteroquin conformis.

Synops. Hepat. p. 752. n. 32 b.

Liebmam fandt denne Plante voxende paa et Blad af *Crescentia* i Marts i Omegnen af Hacienda de Mirador (3000') (Herbar. Liebmam. n. 242 et 273); β ved Aguas santas i November med udstøvede og nye Perianthier og ♂ Blomster (een eneste mørkgrøn Stængel krøb paa en Hypnum).

Caulis (in α) folio arcte irrepens, ramosus, fere bi-pollicaris; rami utrinque ramulos flexuosos flaccidos 3—6-lineares pinnatum edentes, cum foliis fere $1\frac{1}{2}$ lin. lati. Folia $\frac{1}{2}$ lin. longitudine excedentia apice vel dimidio apicali devexa, subflexuosa, linguiformia, apice rotunda interdum inflexa, basi in lobulum majorem elongatum complicata; lobulus forma variabilis, apice transiens in folii marginem ventralem (praesertim in foliis superioribus), vel oblique truncatus vel emarginatus, interdum medio margine libero sinum faciens aut subinvolutus. Color foliorum flavescens (in α) vel saturate viridis (in β). Textura sat notabilis; cellulæ folii limitibus crenulatis et viridi-lineolatis circumdatae apparent, dum media areola hyalina est; adhibito acido sulphurico concentrato per lentes fortius augentes ($\frac{3}{1}$ 00) chlorophyllum coagulatum in angulis et inter incrassationes parietales intermedias coacervatum videas, dum limites cellularum hyalini recti apparent. Folia cum liquore kali caustici cocta et liquore zinci bijodati tincta membranam primariam cellularum hyalinam limitesque cellularum in connexu praeclare monstrant; in angulis apparent puncta incrassata obscure violacea, quibus accedunt aliae similes incrassationes intermediae, in quove pariete singulae vel binae, quae — quod apparet si cellula a latere conspicitur — lora violacea ejusdem magnitudinis ad basin dimit-tunt margine prominentia, unde cellulæ singulæ 12—14 puncta prominentia in circuitu habent. Levi ictu nucleus totus violaceus, modo cum his incrassationibus, modo hisce partibus secundariis relictis membranaeque primariae adhaerentibus, e cellula solvi potest. Amphigastria $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ lin. longa, usque ad $\frac{1}{4}$ lin. lata, distantia vel versus inflorescentiam femineam crescentia et subimbricata, ovalia vel ovato-rotunda, integra, apice retusa vel leviter emarginata, dorso subgibbosa, torum radicularum rarius protrudentia. Inflorescentia mascula in ejusdem plantae ramulo speciali insidens, haud longe a ramis femineis distans; spica mascula terminalis, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. longa, 5—6 paribus foliorum perigonialium saccatorum in gremio antheridium unicum foventium componitur. Perianthia superiora juniora marginibus versus carinam ventralem reflectuntur et quasi apice convoluta apparent, quod tamen foliis involucralibus erectis vel erecto-patentibus non efficitur, sed perianthii proprietas est, qualis in variis generibus e. g. *Thysananthi* etc. observatur. Perianthia adulta apice $\frac{1}{2}$ lin. lata, basi ad $\frac{1}{6}$ lin. latitudinem contracta, $\frac{2}{3}$ lin. longa, piriformia, carinam angustum medium ventrale monstrarunt, dorso depressiuscula, in sectione transversa compressa videntur. Folia involucralia $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{5}$ lin. lata, caulinis conformia sed acuminata, lobulum longius

angustiusque involutum habent; amphigastrium involucrale $\frac{7}{12}$ lin. longum, ovatum apice bifidum, segmentis lanceolatis; amphigastrium subinvolucrale jam minus profunde incisum; itaque sensim sensimque in amphigastriorum caulinorum formam apice leviter emarginatam vel retusam amphigastria floralia transeunt.

Perianthii et foliorum forma similitudinem quandam habet cum *Phragmicomma Bongardiana*, sed tamen toto habitu, foliorum lobulo elongato et apice integerrimo (nec denticulato) etiam sterilis statim distinguitur.

12. *Lejeunia lunulata* Nees ab Es.

L. caule repente vage pinnatimque ramoso, foliis subimbricatis divergentibus oblique ovatis subacutis dentato-subspinulosis basi complicatis lobulo inflato dentato, amphigastriis subrotundis basi dentatis superne integerrimis margine reflexis, perianthiis lateralibus sessilibus obovatis compressis ventre obfuse carinatis apice oreque spinuloso-dentatis, foliis et amphigastrio involucralibus conformibus serrato-dentatis.

α , *pallida*, minor, foliis brevioribus minus inflexis, amphigastriis subrotundis.

α^* , *lobulata*, caule pinnato, foliis margine ventrali non inflexis, lobulo magno basi valde inflato longius in folium transeunte apice plano subintegerrimo appresso, amphigastriis plerisque minus dentatis.

β , *fusca*, foliis plerisque elongatis subfalcatis margine inferiore magis inflexis et dentatis, amphigastriis subrotundis.

γ , *calcarata*, major, fuscescens, amphigastriis rotundo-reniformibus contiguis.

δ , *pinnata*, caule pinnato, foliis ejusdemmodi, qualia in α , sed cum amphigastriis brevius minusque arcte spinuloso-dentatis, pluribus integerrimis.

ϵ , *major*, foliis undulatis, margine ventrali inflexo-subconvolutis integerrimis, amphigastriis subreflexis integerrimis subangulatis, perianthio elongato.

Synops. Hepat. p. 326 et 752. n. 35.

ζ , *lobulata*, caule pinnato, foliis margine ventrali non inflexis lobulo magno basi valde inflato longius in folium transeunte apice plano subintegerrimo adpresso, amphigastriis plerisque minus dentatis.

Liebmann fandt de forskjellige Former i Nærheden af Plantagen Hacienda de Mírador. (Hb. Liebmann. n. 73, 113, 115, 202, 207, 208, 209, 375.)

N. 73 (in *Trophide ramoso*) et n. 115 b (in folio Aroideae cujusdam) varietati β similiores sunt, sed caulem pinnatum habent; n. 113 ad folia Piperis et Lauri duas continet formas, quarum

minor et pallidior forma intermedia est inter varietates α et β ; major forma congruit cum n. 73; n. 202 (in folio *Ardisiae*) et n. 207 (in folio *Chamaedoreae Sartorii*) praesertim propter amphigastria convenit cum varietate γ calcarata. Omnes autem formae modo recensitae statura majore sunt, caulem habent pinnatum, folia acuta, margine dorsali brevius denticulata, ventrali valde inflexa, amphigastria rotunda vel subreniformia basi dentata. Magis autem recedunt n. 209 (in folio *Piperis* ejusdam), secundum quam varietatem γ *lobulatam* proposuimus, et n. 375, quae varietati ϵ *majori* subjecta est.

Foliorum textura vulgaris Lejeuniarum; incrassatio angularis et intermedia parietalis unica (rarius duplex) rotunde circumscriptae sunt, unde rete moniliforme in foliis conspicitur. Linea hyalina membranae primariae in omnibus incrassationibus violaceis elegantissime observari potest. Capsula e duobus stratis constat; alterum, exterius, validum, in valvulis imaginem linguiformem depingit, qualis in *L. axillari* descriptus; valvularum margo serie unica cellularum quadratarum componitur; cellulae seriei insequentis duplum latitudinem habent; etiam in hac capsula cellulae intermediae inter marginem et linguae apicem aliter formatae sunt et paries haud incrassatos habent. Stratum internum tenuissimum partim ex coctione cum liquore kali caustici solvitur et membranam flavescentem relinquunt, quam pro cuticula habeas; sed haerent in hac membrana residua elateres, quare hoc stratum tenuissimum alterum interius capsulae ad normam vulgarem Lejeuniarum habeo. Semina majora, fere qualia in *L. serpyllifolia*, oblongo-quadrata, granulosa; sporodermis valida; elateres altero fine tubaeformes, columnas contortas fibrâ unicâ spirali percursas sistentes tantummodo in valvularum apicibus nec sparsos liberos inveni.

13. *Lejeunia xanthocarpa* *Lehm. et Lindbg.*

L. caule repente ramoso, ramulis brevibus subfastigiatis, foliis arce imbricatis subverticalibus rotundis convexis integerrimis margine ventrali toto apiceque inflexis basi complicatis, lobulo majore apiculato minoreque ventricoso-convolutis, amphigastriis rotundo-reniformibus contiguis integerrimis, perianthiis lateralibus obovatis dorso uni-, ventre bicarinatis, angulis lateralibus ventrem versus devexit, foliis involucralibus conformibus (altero semper in margine complicato subalato) lobulisque latius explicatis, amphigastrio obovato apice retuso.

Synops. Hepat. p. 330. n. 44.

Liebmann fandt af denne Art nogle Planter med Perianthier iblandt andre Hepaticae i de dybe Skove, som omgive Plantagen Hacienda de Mirador (3000').

Plantae Mexicanae speciminibus originalibus omnino similes sunt. Folia cum li-
quore kali caustici cocta et zinco bijodato tinteta nullam incrassationem ad modum *Leje-*

niarum praecedentium in cellularum angulis ostendunt, sed tamen levi ictu totus nucleus i. e. membrana secundaria cum sacculo primordiali coagulato, e cellula dirupta (nunc ex sola membrana primaria hyalina constante) ejici potest; nullum trigonum interstitium in conjunctionis puncto ternarum cellularum in hisce cellulis disruptis conspicitur. Capsula e duobus stratis constat; stratum externum crassius e cellulis tabulatis aequaliter incrassatis componitur, quae in exemplaribus coctis et tinctis singularem linguae imaginem, spatium pallidius intermedium et seriem unicam cellularum marginalium duplo minorum ostendit; stratum interius flavescens, tenuius, e cellulis interrupte incrassatis constat. Incrassationes a parietibus tamquam tubera rotundata in cellulam interiore prominent ejusque cavitatem omnino defigurant et cum incrassationes cellularum adjacentium secundum normam vulgarem (ut videtur, omnium plantarum) semper sibi oppositae sint, maeandrica pictura, ut ita dicam, in facie valvularum interna observari potest; praeterea hoc stratum interius non coloratur illa præparatione, qua stratum externum violaceum fit, (quae lex omnibus Lejeuniis communis videtur); nec elaterum fibram spiralem tingere mihi contigit.

14. *Lejeunia unciloba* Lindbg.

L. caule repente vage pinnatimque ramoso, foliis imbricatis subverticalibus oblongo-orbiculatis apice rotundatis integerrimis margine ventrali sinuato-complicatis lobulo magno ovali-quadrato infexo extrosum truncato subunitento dente saepe uncinato, amphigastriis contiguis rotundis integerrimis, perianthiis lateralibus obovatis dorso medio subelevatis ventre bicarinatis, involuci foliis minoribus conformibus, amphigastrio elongato apice truncato retusove.

Synops. Hepat. p. 331 et 753. n. 46.

Liebmann samlede nogle Planter af denne Art med Perianthier iblandt andre Hepaticae i Omegnen af Colipa (5—800') og paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000'). (Hb. Liebmann. n. 146 b, et n. 53 et 348 e. p.).

Plantae Mexicanae exemplaribus originalibus omnino similes sunt. Lobuli excisura, qua in folii marginem transit, sub lentibus fortioribus visa, inaequalis, varians, prominentia obtusa dentiformi interdum armata, ut lobus subbidentulus evadat. Textura qualis in *L. xanthocarpa*. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta nullam cellularum incrassationem in angulis ostendunt; levi ictu etiam in hac *Lejeunia* nuclei violacei e cellulis disruptis, nunc e sola membrana primaria consistentibus, ejiciuntur. Si coctionis experimentum cautius perficitur, saccus primordialis flavescens coagulatur quidem, sed remanet, totam cellulae cavitatem explens et angusto margine violaceo membranae secundariae cinctus.

15. *Lejeunia conferta* *Meissner.*

L. caule repente pinnato ramulis supremis elongatis subfasciculato, foliis arcte imbricatis ovato-subrotundis integerrimis basi subsinuato-complicatis, plerisque in lobulum magnum cucullato-reflexum apice transeuntem basi inflatum convolutis, amphigastriis adproximatis obovato-cuneatis reniformibusve integerrimis, perianthiis lateralibus obovatis margine compressis ventre bicarinatis dorso ad apicem carina angusta instructis, foliis involucralibus conformibus lobulo explicato (altero semper subalato), amphigastro ovali apice retuso.

Synops. Hepat. p. 333. n. 50.

β . *Liebmenniana*, minor, foliis basi ventrali magis sinuatis lobulis fornicatis et majusculis paene nullis, amphigastriis plerisque retusis vel emarginatis, amphigastro involucrali emarginato vel lunulatum retuso.

Synops. Hepat. p. 753. n. 50.

Liebmenn fandt Hovedformen og Varieteten β paa Træer af de forskjellige Skove, som omkrandse Plantagen Hacienda de Mirador.

Folia formae typicae lobulum majorem in folium transeuntem ostendunt in ramis sterilibus; in fertilibus autem promiscue in eadem planta inveniuntur lobuli mere conduplicati angustiores et latores, et lobuli fornicatim cucullati mox subglobose inflati et margini folii ventrali quasi impositi, mox apice attenuato in marginem folii transeuntes, basi magis ovati, a caule plus minus discreti. Folia cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta cellulas regulares sexangulares et quinquangulares hyalino-marginatas omnino non incrassatas vel angulorum incrassationem punctiformem ostendunt. Saccus primordialis in omnibus in grumulos subrotundos vel in discum flavescentem coctione coagulatus est. Si levi ictu contra laminam vitream cellularum membrana primaria dirumpitur, totus nucleus violaceus, angulis sub prominulis saturatus coloratus, ejicitur, omnino nihil in cellula primaria relinquens, quae tamen in angulis, ubi cum membrana primaria cellularum adjacentium cohaeret, punctum hyalinum monstrat, quod margini parietis reliquo praelucet; sin autem cellulæ primariae marginem solutum examines, angulus et margo eadem pelluciditate frui videntur.

Amphigastrium involucrale, in exemplaribus originalibus apice leviter retusum, in speciminibus Mexicanis plerumque emarginatum in utraque forma invenitur.

16. *Lejeunia Sullivanti Gottsche.*

L. caule repente inordinate ramoso, ramis flaccidis, foliis imbricatis ovali-subacutis hyalino-viridescentibus repando-subintegerrimis (sc. cellularum prominentia sub lentibus fortioribus, centies augentibus, subcrenulatis) apice decurvis reflexisve, basi subtus in lobulum ovatum inflatum apice subtruncatum convolutis, amphigastriis imbricatis folia aequantibus subreniformibus apice obtuse emarginatis, fructu laterali, perianthio semimmerso turbinato apice quinquangulari-alato angulis rotundis, foliis involucralibus usque ad angulos perianthium cingentibus, lobulo explanato majore ovato, amphigastrio angustiore obovato emarginato.

β. Mülleriana, foliis paullo majoribus; in statu florente, perianthio nondum exculto, inventa. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Hovedformen fandt Fendler*) i Nærheden af Valencia i Venezuela med Perianthier i Juli; Fred. Müller fandt den lidt større Form i Mexico i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Saugmøllen Aserradero de Santa Cruz i blomstrende Tilstand blandt andre Hepaticae.

Plantae Mexicanae aliis Hepaticis intricatae, pollicares et ultra, virides, cum foliis humectis $\frac{2}{3}$ lin. latae, flaccidae. Folia apice plerumque deflexa, ovalia, pellucida, $\frac{2}{3}—\frac{1}{2}—\frac{8}{15}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, basi in lobulum parvum $\frac{1}{15}$ lin. longum convoluta; apex folii repando-acutus vel obtusiusculus plerumque reflexus, interdum involutus. Amphigastria magna, folia aequantia $\frac{2}{3}—\frac{1}{2}$ lin. lata, parte laterali $\frac{1}{3}$ lin., medio propter emarginaturam, $\frac{1}{4}$ lin. alta, transversalia, subreniformia. Folia involucralia ovato-subacuta, $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{3}{10}$ lin. lata; lobulus $\frac{1}{3}$ lin. longus, fere $\frac{1}{5}$ lin. latus. Amphigastrium involucrale angustius, rotundo-quadratum vel subobovatum, $\frac{1}{3}$ lin. latum et aequo longum. Perianthium (in planta Venezuelana) turbinatum, $\frac{1}{2}$ lin. longum, apice $\frac{1}{3}$ lin. latum, in quinque alas rotundas $\frac{1}{6}$ lin. longas abiens; apice ipso subdepressum, basi ad $\frac{1}{10}—\frac{1}{15}$ lin. contractum, subteres.

Habitu flaccido et tota conformatione proxima *Lejeuniae reflexistipulae*, quae tamen etiam in statu sterili amphigastriis apice reflexis diversa est; a reliquis Lejeuniis perianthio turbinato quinquealato et amphigastriis magnis reniformibus obtuse emarginatis facile distingui potest.

*) Splendidissimam Fendleri collectionem Hepaticarum prope Valenciam Venezuelae inventarum illustrissimi botanices cultoris et fautoris Sullivanti benevolentia possideo.

B) Amphigastriis bifidis.

a) Perianthiis obcordatis depressis ciliatis denticulatisve.

17. Lejeunia microdonta Gotsche.

L. monoeca, caule repente subpinnatim ramoso, foliis contiguis oblique ovatis et ovato-oblongis acutis obtusisve margine breviter subaequaliterque crenulatis raro integerimis basi angustata decurrente complicatis lobulo rotundato nonnumquam obsoleto, amphigastriis remotis ovatis profunde bifidis integerrimis laciniis acuminatis erectis, fructu laterali sessili vel in ramulo brevissimo, involucro conformi, perianthio obcordato compresso ventre obtuse carinato ore dentato-crenulato vel laciniato-cristato.

Synops. Hepat. p. 337. n. 60.

ε. Zazuapan, foliorum apice acuto, amphigastriorum lobis latioribus paulloque obtusioribus sinuque latiore paullo diversa.

Liebmman samlede denne Plante iblandt flere andre Hepaticae i November paa Plantagen Zazuapan, 5 Leguas Østen for Byen S. Antonio Huatusco, uden Frugt; under n. 536.

Folia praeparata insignem praebent imaginem, quia membrana secundaria cum eo, quod continet, coarctatur in hexagonum nucleum violaceum, angulis incrassationem punctiformem majorem ostendentem, unde rete satis latum album, lineâ tenuissimâ mediâ cellularum limites indicante percursum, membranâ primariâ confectum, folii discum in areolas violaceas ad speciem partitur. Cellulae marginales plerumque quinquangulares apice acuto, dimidiam cellulae altitudinem aequante, prominentes, ut margo sub lentibus fortioribus serrato-crenulatus appearat. Nucleus e membrana secundaria constitutus e cellula dirupta ejici potest; succus cellulae in discum flavescentem coctione coagulatur.

Obs. In diagnosi, quae in Synopsi proponitur, perianthia ore dentato-crenulata plantae originalis Vincentinae, cuius iconem delineavi, tantummodo citantur; in planta Brasilensi, sub α laudata, os perianthii laciniato-cristatum est. (In calce hujus speciei Synops. Hepat. p. 338 l. 10. a summo litera A. tollenda est).

18. Lejeunia Raddiana Lindbg.

L. caule repente ramoso, foliis laxe imbricatis semiovatis acuminatis acutisve flaccidis subinflexis margine subrepandis integerrimis basi sinuato-complicatis lobulo inflato transeunte, amphigastriis distantibus minutis patentibus rotundo-ovatis bifidis laciniis obtusiusculis, fructu in ramorum basi sessili, foliis involucralibus conformibus, perianthio obovato elongato superne breviter pentagono, apice rotundato minute denticulato.

Synops. Hep. p. 342. n. 73.

? β major, perianthio evidenter ciliato-dentato.

Liebm. fandt denne Plante paa Plantagen Hacienda de Mirador i Marts 1842.
(Hb. Liebm. n. 236 ex parte.)

Planta mihi ignota; e schedis beati Lindenbergii transscripta.

19. *Lejeunia stricta* *Lindbg. et Gottsche.*

L. caule repente vage ramoso stricto, foliis laxe imbricatis semiverticaliter patentibus ovato-acuminatis integerrimis convexis apice ventrem versus reflexis, basi ventrali sinuato-complicatis, lobulo e basi inflata sinuato-attenuato et in apicem rotundum transente (si angulus inflectitur) vel (angulo explicato) apice emarginato unidentato, amphigastriis minutis obovato-cuneatis emarginato-bilobis lobis rotundis, fructu laterali sessili vel in ramis terminali, perianthio obovato ad apicem quinquangulari, angulis prominentiis binis ternisve obsolete dentato, foliis involucralibus majoribus subconformibus bilobis, lobulis altius in carinam alatam coalitis, lobuli ventralis apice obtuso, amphigastrio elliptico apice bilobo vel rarius emarginato. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 756. n. 75 b.

Liebm. fandt denne Plante paa flere Steder i Mexico; den samlede paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i October, i Januar og i Marts (med moden Frugt) (Hb. Liebm. n. 40 (?), 94, 105 (?), 239, 248, 261, 349); ved Ranchoen Cabrestros ved Rio Nautla i September og ved San Antonio Huatusco (4500') i Departementet Vera Cruz (n. 449 og n. 345) og i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca i Mai (n. 418).

Caules ad corticem arborum repentes, caespitosi, stricti (praesertim cum sicci sunt) irregulariter ramosi, lineas 4-8 longi; rami breviores elongative rarius ramulo iterum instructi; tota planta angustissima, cum foliis deflexis $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{6}$ lin. lata. Folia laxius imbricata, ovato-acuminata, aliquantum obliqua, integerrima, apice longius producto et utrinque repando plerumque ventrem versus reflexa, nonnumquam vero explanata, margine ventrali basi sinuato-complicata, lobulo subquadrato (si explicatus est) majore basi inflato, plerumque margine libero involuto, ita ut angulus omnino inflexus sit, et attenuato apiceque rotundo in marginem folii ventralem transeunte; in foliis superioribus autem saepius angulus lobuli emergit et tamquam dens apicalis exstat, dum apex truncatus plica longitudinali depressus incisuram lunulatam ludit. Folia praeparata cellulas roseas membrana primaria albomarginatas ostendunt sine angulorum incrassatione, sacculum primordiale colore obscuriore notatum includentes; ubi ternarum cellularum membranae primariae convenient, minutissimum

triangulum hyalinum ($\frac{4}{1}00$) videtur, quale etiam in *Radula complanata* appareat, ubi cl. Schacht (Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der Gewächse I. p. 118. tab. III. fig. 7 x) illud trigonum e materie intercellulari constare docet. Fructus in ramulis laterales, sessiles, rarius terminales, innovatione sub iisdem prodeunte. Involucrum perianthium ad medium cingens; folia involucralia magna, amplectentia, biloba, margine ventrali carinato-alata, quia lobulus ventralis longius cum lobo dorsali acuto coalescit; apex lobuli ventralis obtusus et subrotundus; amphigastrium oblongum apice lunulato-emarginatum vel ad quartam partem bilobum, lobis ovato-lanceolatis, integerrimum. Perianthium $\frac{1}{4}$ lin. longum, obovatum, ad apicem pentagonum, dorso uni-, ventre bicarinatum, angulis ad apicem dentibus vel tuberculis 2—3 prominulis obsolete dentatis; jam in perianthio juvenili hae protuberantiae videntur ad speciem majores, quia reliqua pars perianthii minus exulta est. Semina prismatico-oblonga, angulosa, flava, granulata. Capsula e duobus stratis cellularum constat, quorum exterius celulas tabulatas parietibus undulatim incrassatas monstrat.

Lejeunia Leiboldiana, quae ejusdem fere statuae est, foliorum acumine et lobulo et amphigastriorum forma differt; *Lejeunia patentissima* (Linnaea t. 25. p. 355) foliis minus acuminatis recedit; *Lejeunia Cinchonae* perianthio alato ciliato-cristato diversa est.

20. *Lejeunia tenuistipula* Lindbg. et Gottsche.

L. monoeca, caule repente inaequaliter pinnato, ramis confertis, foliis arce imbricatis oblique ovatis acutis crenulato-denticulatis apiceque deflexis, basi ventrali sinuato-complicatis, lobulo ovato involuto anguloque parum prominulo in apicem truncatum trans-eunte, amphigastriis parvis approximatis subrotundis ad medium bifidis, laciinis acutis subinflexis, fructu ad basin ramorum sessili, perianthio obovato-pentagono, carinis et margine subcrenulatis, foliis involucralibus majoribus ceteroquin conformibus aequae ac lobulo et amphigastrio ovali subserrulatis. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 757. n. 100 b.

Liebmann fandt denne Plante i de fugtige skyggefulde Bjergskove ved San Pedro Tepinapa (2000') i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca med Perianthier og Antherer i Juni Maaned. (Hb. Liebmann. n. 315 ex parte.)

Caules caespitose repentes, 3—4 lineas longi, pinnatim ramosi, ramis confertis inaequalibus. Folia arce imbricata, oblique ovata, acuta, devixa apiceque reflexa, ut a dorso visa semiteres appareat plantula et foliorum denticulatio minus animadvertisatur; margo dorsalis totus cellularum singularum prominentia crenulato-serrulatus, ventralis ab apice oblique decurrens laevior vel subrepandus, basi sinuato-complicatus; lobulus majusculus inflatus

subquadratus apice oblique truncato lunulatove in marginem transiens. Textura tenera, subhyalina; folii discus e cellulis inaequalibus 5-, 6-, 7- et 8-gonis componitur; in foliis coctis et tinctis cellulæ roseæ margine hyalino — membranā primariā — cinguntur et in angulis internis incrassationem saturatiore colore notatam punctiformem monstrant, dum sacculus primordialis in discum coagulatus est. Amphigastria foliis quadruplo minora, approximata, caule duplo latiora, subrotunda, ad tertiam partem vel ad medium bifida laciniis subinflexis, appressa, ut apices aegrius discernantur. Fructus versus basin ramorum sessiles. Involucrum perianthium ad medium longitudinis circumdans; folia crenulato-serrulata, apice obtuse lanceolata, lobulus planus, apice libero acutus denticulatusque; amphigastrium involucrale oblongum, bifidum, apice solo subserrulatum. Perianthium $\frac{1}{4}$ lin. longitudine vix excedens, obovatum, sectione transversa pentagonum, dorso uni-, ventre bicarinatum, margine carinisque subcrenulatis. Spica mascula ex ipso caule vel e ramulis proveniens, lateralis, ramulum sistit e 6—8 paribus perigonialium foliorum compositum, basi plerumque amphigastrio normali rameo et subsequente ovato-lanceolato integro (nec fisco) minore vestitum (amphigastriis reliquis inter folia perigonalia obsoletis). Folia perigonalia superiiora bina antheridia in quoive sinu fovebant.

Proxima est *Lejeunia crenata*, sed nostra omnibus partibus multo minor et perianthii angulis non in alas liberas excurrentibus differt; a *Lejeunia lobulata* statura minore et foliis crenulato-dentatis diversa.

21. *Lejeunia undulata* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente elongato subsimplici, foliis contiguis oblique ovatis devexis saepe subundulatis, apice inflexis acuminatis apiculatisque integerrimis et ad apicem repandis basi subtus sinuato-complicatis lobulo inflato, amphigastriis magnis approximatis cordatis ad tertiam partem bifidis, laciniis obtusis integerrimis angulatove repandis, fructu . . .

Synops. Hep. 768. n. 219. — *Lejeunia Delessertii* Synops. Hep. p. 757. n. 91.

Confer. *Lejeunia cuspidata* Synops. Hep. p. 351. n. 96.

Liebmann fandt denne Plante tæt sammenvoxen med *Lejeunia cerina* i Departementet Vera Cruz i Misantlas Kystskove i Marts (Hb. Liebm. n. 463 ex parte) og paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') uden Frugt.

Caulis $1\frac{1}{2}$ pollic. longus, repens, angustus, pauciramosus, ramis elongatis ramulis brevioribus pinnatim instructis. Folia contigua vel subimbricata, oblique ovata, subundulata, dorsali margine basi rotundata, ventrali basi decurrente sinuato-complicata, ad apicem subrepanda ceterum integerrima, deflexa, apice plerumque in acumen longius producto inflexo, nonnumquam apiculata, rarissime obtusiuscula magisque plana; lobulus parvus

inflatus subtruncatus. Color fusco-hyalinus, retis maculae subaequales, marginales minores. Folia praeparata discum folii roseo-violaceum albo-reticulatum ostendunt, in quo reti candido lineae subtilissimae cellularum limites veros depingunt. Illud rete candidum e membrana primaria cellularum adjacentium componitur; maculae roseo-violaceae sistunt membranam secundariam cum utriculo cellulae primordiali et levi ictu tamquam nucleus ejici possunt. Incrassatio angularis nulla. In illis locis, ubi lineae subtilissimae decussantur, id est, in angulis, ubi cellulae 3 vel 4 conjunguntur, trigona minutissima vel puncta tantum hyalina emicant secundum microscopii elevationem vel depressionem. In foliis praeparatis praeterea multae disci cellulae decolores huc et illuc dispersae apparent morbosae, fungi cuiusdam semina nidulantia foventes. Amphigastria approximata, vix duplo minora, appressa, pleraque cordata, nonnulla transversalia, alia subrotunda, ad tertiam partem bifida, laciniae latiusculae erectae obtusae, margine integerrimae vel repando-angulatae. Fructus deest.

Proxima *Lejeuniae involutae*, sed amphigastriis constanter majoribus ab ea diversa; simillima autem est *Lejeuniae cuspidatae* et forsitan eadem, quamquam in diagnosi in Synopsi Hepaticarum nostra p. 351 data »amphigastria laciniis acutiusculis» repugnare videntur. Tamen iterata examinatione amphigastria utriusque plantae forma convenient, lobi in utraque obtusi et rotundati sunt, ita ut apex lobuli incisura plus minusve hiante formetur. In *Lejeunia cuspidata* involucrum dentatum tantummodo notum est; in *Lejeunia undulata* fructificationem nondum inveni.

Obs. Locus, quem planta nostra in Synopsi Hepaticarum tenet inter Ceratanthaceas, nullo charactere diagnostico stabilitur.

22. *Lejeunia cordistipula* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente subsimplici, foliis subimbricatis contiguisve subhorizontalibus oblique ovato-acutis longiusque apiculatis planiusculis subintegerimis, basi sinuato-compli-catis lobulo parvo inflato vel obsoleto, amphigastriis distantibus duplo triplove minoribus cordatis ad medium bifidis laciniis acuminatis, fructu laterali in caule vel in ramis sessili, foliis involucralibus minoribus subconformibus bilobis lobulo lanceolato, amphigastrio oblongo, perianthio . . . Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 758. n. 104. c.

α , *latior*, foliis subimbricatis paullo longioribus ovato-lanceolatis.

β , *laxior*, foliis contiguis paullo minoribus saepe longius apiculatis.

β^* *minor*.

Liebmann samlede denne Plante paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000'), ved

Huitamalco (2500') og ved Jicaltepec ved Rio Nautla. Varieteten β fandtes rigeligt paa Plantagen Hacienda de Jovo (1800—2000') i Nærheden af Sta Maria Tlapacoyo i Departementet Vera Cruz, og β^* sammestedes paa et Blad af en Melastoma-Art. (Hb. Liebm. n. 1, 127, 410, 457, 540.)

Caules ad ramos arborum, ad folia, vel ad terram inter muscos repentes $\frac{1}{2}$ —2 pollices longi, angusti, cum foliis semilineam latitudine vix excedentes, strictiusculi, plerumque simplices, ex apice innovantes vel ramulo brevi instructi. Folia approximata (β) in planta adulta saepe basi brevi spatio imbricata vel subimbricata (α), semiverticalia, paullo oblique ovata, elliptico-lanceolata vel longius apiculata, plana, rarius apice aliquantum ventrem versus reflexa, ante apicem nonnumquam repando-angulata, margine ventrali basi paullo decurrente sinuato-complicata; lobulus involutus, in superioribus foliis haud raro obsoletus. Folia praeparata cellularum membranam primariam tenuiorem ostendunt, secundariam violaceam margine hyalino circumdantem, et limites cellularum elegantissime definitos; angulorum incrassatio nulla vel punctiformis. Amphigastria approximata, foliis duplo vel triplo minora, e basi cordata ovata, basi utrinque dilatata, rotundata ad apicem multo angustiora, margine integerrima, usque ad medium bifida sinu angusto, laciniis lanceolatis acutis conniventibus vel erectis. Forma minor (n. 410) folia habet minora subdistantia, lobulo saepius parentia et amphigastria minora. Fructus lateralis in ramo principali vel in ramulis sessilis. Folia involucralia biloba, minora, lobo utroque lanceolato, amphigastrium oblongum ad $\frac{1}{5}$ partem fere bifidum, lobis lanceolatis.

Proxima est *Lejeuniae Caripensi*, sed foliorum forma paullo longiore diversa est; longius distat a *Lejeunia acuminata*, a qua differt foliis longius apiculatis et amphigastriis majoribus basi cordatis.

23. *Lejeunia flaccida* Lindbg. et Gottsche.

L. monoeca, caule repente caespitoso ramuloso, foliis imbricatis semiverticalibus ovato-cordatis flaccidis caulem subcingentibus acutis vel breviter apiculatis subintegerrimis margine ventrali basi non complicatis vel in plicam minutam complicatis, amphigastriis subdistantibus ovato-cordatis ad tertiam partem bifidis, fructu laterali sessili, perianthio obovato prismatico pentagono, angulis rotundatis, dorso uni-, ventre superne bicarinato, foliis involucralibus ovato-acutis angustioribus lobulo minore dentiformi instructis. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 758. n. 104 d.

Liebm. samlede denne Plante paa Mexicos Østkyst i en Baranka neppe 500 Fod

over Havet ved Ranchoen Cabrestros i Nærheden af Rio Nautla i Departementet Vera Cruz i April med Antheridier og Perianthier. (Hb. Liebm. n. 476.)

Caules 6—12 lineas longi, caespitose repentes, ramulis brevibus parce ramosi. Folia imbricata, semiverticalia vel subhorizontalia, cordato-ovata, flaccida, in statu sicco cauli circumvoluta, madida quoque minus explanata, rarius obtusa, pleraque acuta vel breviter apiculata, integerima, rarius ad apicem angulata, margine ventrali haud raro inflexa sed basi nonnihil decurrente non complicata vel in plicam minutam inflexa, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{8}$ lin. lata. Textura laxior, cellularum limites crassi et chlorophyllo et trigonis albis variegati; folia praeparata in cellularum angulis et medio pariete incrassationem punctiformem ostendunt, ut parietes a latere visi (exempli gratia in apice folii devexo) variegati appareant. Color luride viridis. Amphigastria remotiuscula, foliis duplo vel triplo minora, cordato-ovata, ad tertiam partem bifida, rima plus minus angusta, lobis acutis erectis vel paullum inflexis. Involucrum perianthium ad medium cingens, apice patulum; folia angustiora acuta apice ventrem versus reflexa, margine ventrali in lobulum oblongum apice dentiformem complicata; amphigastrium ovatum ad quartam partem in lobos acutos fissum. Perianthium obovatum prismaticum, $\frac{3}{8}$ lin. longum, dorso uni-, ventre bicarinatum, angulis rotundatis, in perianthio juvenili margines compressi et carinae altius prominentes, in adulto margines et carinae obtusiores perianthio habitum Omphalanthi dant.

24. *Lejeunia assimilis* Lindbg. et Gottsche.

L. monoeca, caule repente flaccido parce ramoso, foliis imbricatis late ovatis subdeflexis integerimis acutis, margine ventrali in plicam angustam complicatis vel (superioribus praesertim) toto margine inflexis subundulatis, amphigastriis distantibus quadruplo minoribus rotundo-ovatis ad medium bifidis laciniis rectis acutis, fructu laterali sessili vel ad speciem in dichotomia ramulo novello sub eo proveniente, perianthio obovato-prismatico pentagono angulis rotundis, ad apicem dorso uni-, ventre bicarinato, foliis involucralibus angustioribus acutis lobulo subovato plano. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 759. n. 105 b.

Liebmann samlede denne Plante paa Træbark iblandt andre Lejeunier under en Collema-Art paa Plantagen Hacienda de Jovo (1800—2000') i Departementet Vera Cruz i April med fuldkommen Frugt og Antherer (Hb. Liebmann. n. 429 c. ex parte).

Caules ad arborum corticem repentes, fere pollicares, parce subpinnatim ramosi, ramulis brevibus, nonnullis paullo longioribus semilineam ad 2 lineas longis. Folia imbricata, semiverticalia, late ovata, convexiuscula, subdeflexa, integerima, pleraque acuta, non-

nulla obtusa, $\frac{3}{8}$ lin. longa, basi $\frac{1}{4}$ lin. lata, rarius toto margine ventrali inflexa, subundulata, plerumque basi solummodo in plicam angustam complicata vel etiam margine solo paullum incrassata, lobulo obsoleto. Textura laxior, maculae retis majusculae, parietibus crassisculis; folia praeparata rete album — membranà primarià constitutum — distincte cellularum limites lineà medià percurrente manifestans, et areolas roseo-violaceas ostendunt, quae cellularum cava membranà secundarià, in angulis et in medio pariete elegan-
tissime incrassatà, inclusa sistunt. Cellularum parietes incrassationem interruptam, punctiformem majorem, in cellulis vicinis contiguam et aequalem habent, unde praesertim a latere visi (exempli gratia in dorso folii deflexi) moniliformem adspectum praebent. Amphigastria distantia vel approximata, foliis multo minora, rotunda vel ovata, rarius subcordata, ad tertiam partem vel ad medium bifida laciniis rectis acutis. Folia ramulorum et amphigastria minora, angustiora, patula. Fructus laterales sessiles; perianthium junius prismaticum marginibus et carinis angulo rotundis compressiusculum ore initio emarginatum tubuloque mucronatum; adultum post capsulae egressum basi angustatum et carinis magis obsoletis piriforme. Seta brevis. Capsula magna, oviformis, ultra medium fissa.

Perigonia brevia formà pyramidali, ad latera caulis, plerumque e 3 paribus decrementibus constantia, quorum par infimum folia maxima, secundum par minora et summum par minutissima ostendit, ut forma totius rami masculi obtuse triquetra sit. In singulis foliis perigonialibus bina vel terna antheridia inveniuntur.

Maxime affinis *Lejeuniae Caracensi*, differt vero colore haud laete viridi sed fuscescente, amphigastriis majoribus, perianthio breviore et involucro integerrimo, quod in *Lejeunia Caracensi* foliis subserratis praeditum invenio. *Lejeunia Neumanniana* distinguitur colore, textura, amphigastriorum et involueri forma; *Lejeunia conformis* foliis angustioribus longius cuspidatis hyalinis diversa est.

25. *Lejeunia lanceolata* Gottsche.

L. caule ramoso repente, foliis contiguis vel remotiusculis oblongo-lanceolatis subdecurvis integerrimis basi sinuato complicatis, lobulo magno rotundo ventricoso subundentato, interdum nullo, amphigastriis distantibus minutis obovato-rotundis usque ad medium bifidis, laciniis acutis subconniventibus, fructu lateralí sessili, foliis involucralibus magnis integerrimis, amphigastrio cordato margine eroso alteri folio involucrali coalito, perianthio...

Synops. Hepat. p. 353. n. 102.

β , forma minor.

Fred. Müller samlede denne Art paa Barken af et Træ i Districtet Orizaba (n. 2249 og 2334) uden Frugt.

26. *Lejeunia Leiboldiana* *Gottsc.*

L. caule repente irregulariter ramoso, foliis subimbricatis ovato-lanceolatis subfalcatis integerrimis apice decurvis, margine dorsali subrepando, ventrali a medio inflexo basi in lobulum apice exciso-unidentatum complicato (vel ad speciem transeuntem, si magis convolvitur), amphigastriis remotis obtuse cuneatis ad medium bifidis sinu obtuso rotundo, laciniis divaricatis, fructu laterali, involucro integerrimo, perianthio quinquangulari obovato, angulorum carina repanda. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Leibold har taget denne Plante voxende paa en Frullania, sandsynligviis paa Plantagen Zazuapan. Jeg forefandt kun et eneste Exemplar.

Caulis fere trilinearis, irregulariter ramosus. Folia fere $\frac{1}{5}$ lin. longa, versus basin cum lobulo explicato $\frac{2}{15}$ lin. lata, margo ventralis inflexus fere $\frac{1}{10}$ lin. (cum lobulo) metitur. Dens angularis lobuli saepe non appetet, si lobuli margo liber magis versus folii cavitatem involvit, unde lobulus in marginem ventralem limbo angusto transire videtur. Amphigastria $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longa, laciniis apice fere $\frac{1}{10}$ lin. divergentibus. Perianthium adultum $\frac{1}{3}$ lin. longum, $\frac{1}{6}$ lin. latum, obovato-prismaticum, quinquangularatum, apice truncatum tubulo sublongiore mucronatum; angulorum carinae apicem versus repandae, interdum prominentiam dentiformem ostendentes. Folia involucralia fere dimidiam perianthii longitudinem attingentia, integerrima, subconformia, lobulus planiusculus quadratus apice repando-truncatus; amphigastrium involucrale ovale, integerrimum laciniis lanceolatis rectiusculis (sinu angusto medium folii haud attingente).

A *Lejeunia lanceolata* foliorum, lobuli et amphigastriorum forma distinguitur; fere iisdem notis a *Lejeunia Neesii* diversa est; a *Lejeunia hamatifolia* β *falcifolia* longius distat.

27. *Lejeunia flavicans* *Gottsc.*

L. caule elongato procumbente flaccido parce ramoso, foliis contiguis ovato-acuminatis subrepando-integerrimis apice deflexo incurvato, basi in lobulum parvum ovatum apice excisum complicatis, amphigastriis remotis cordato-ovatis ad medium fere bifidis (sinu plerumque acuto) laciniis lanceolatis subconniventibus, fructu . . . Gottsche Hepat. Icon. inedit.

Frederik Müller fandt denne Plante i Districtet Orizaba ved Rio blanco og i Sierra de San Cristobal i Januar uden Frugt.

Caules bipollicares et ultra, flaccidi, pauciramei, caespites flavescentes basi magis fuscantes formant. Folia ovato-acuta in apicem longiorem protracta, $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ lin. longa, versus basin $\frac{1}{3}$ lin. lata, plerumque in lobulum, $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{6}$ lin. longum, complicantur. Amphigastria $\frac{1}{6}$ lin. longa et parte latissima fere aequa lata sunt. Foliorum cellulae incrassationem punctiformem angularem et lateralem medium ostendunt.

A *Lejeunia Osculatiana De Notaris* proximā differt foliis brevioribus latioribusque, lobulo et amphigastriis minoribus, quorum laciniae breviores et latiores sunt.

28. *Lejeunia cerina L. et Lindbg.*

L. caule procumbente flexuoso subramoso, foliis imbricatis semiverticalibus dimidiato-cordato-orbiculatoe-ovatis acuminatis apiculatisve basi decurrenti-complicatis lobulo minuto inflato truncato, amphigastriis folia subaequantibus contiguis reniformi-peltatis anguste bifidis laciniis acutiusculis rectis, fructu laterali subsessili, perianthio oblongo obovatove compressiusculo quinquangulari dorso uni-, ventre bicarinato, involucri foliis integrerrimis.

Synops. Hepat. p. 391 et 768. n. 202.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Vera Cruz paa forskjellige Steder, ved Zazuapan (2500—3000') i November 1841 (n. 537, 539 b), i Nærheden af Santa Maria Tlapacoyo paa Hacienda de Jovo (1800—2000') i April 1841 (n. 515, 517 b), og i Kystskoven ved Misantla i Marts 1841 (n. 463). Frederik Müller fra Bern fandt denne Art uden Frugt i Nærheden af Vulkanen Orizaba i Januar 1854 ved Rio blanco.

Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta egregiam praebent imaginem, quia in omnibus cellulis maculam crenulatam violaceam hyalino-marginatam ostendunt, in cuius medio grumuli sacci primordialis soluti haerent. Levi ictu contra laminas vitreas cellulae dirumpuntur et nucleus totus violaceus ejicitur, qui membranam secundariam cum incrassationibus conicis prominentibus interdum non minus 15 sistit; fortius igitur in hac planta cellularum membrana primaria inter se cohaeret, nec trigona hyalina interstitialia conspicuntur. Cellulae marginales minores sub lentibus fortioribus rotundo-prominentes, aequa atque omnes cellulae disci in margine folii complicato.

29. *Lejeunia concava Lindbg. et Gottsche.*

L. monoeca, caule repente vage ramoso, foliis laxe imbricatis verticalibus ovatis obtusis concavis integerrimis (ramulorum pluribus heteromallis), margine ventrali sinuato-complicatis lobulo magno subquadrato medio plica depresso basi inflato apice plano et

rotundato, si angulus inflectitur, vel angulo explicato levi incisura in folium transeunte, amphigastriis remotis ovato-rotundis ad tertiam fere partem bifidis, sinu latiusculo, laciniis erectis acutis, perianthiis lateralibus obovato-pentagonis, dorso obtuse uni-, ventre acute bicarinato, margine compresso, foliis involucralibus minoribus subconformibus. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hep. p. 759. n. 123 b.

Fandtes i de dybe Urskove, som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec, i Juni med moden Frugt og uddannede Antherer. (Hb. Liebmann. sub n. 170.)

Caulis 6—8 lineas longus, repens, sub amphigastriis toris radicellarum palmatisidarum vestitus, flexuosus, irregulariter ramosus. Folia verticalia, concava, ovata, obtusa, integerrima a caule aliquantum patenti-divergentia, ramulorum plerumque paullo longiora adscendentia, heteromalla, margine ventrali sinuato-complicata; lobulus magnus quadratus medio sulco longitudinali depressus anguloque inflexus, ut basi inflatus appareat et apice plano rotundato in folium transeat, sed si angulus explicatus est, forma vera lobuli appareat et apex lobuli aut obliquus est aut leviorem excisuram mentitur secundum plicam longitudinaliem lobuli plus minusve depressam. Ramulorum folia superiora nonnulla toto fere margine inflexa, orbiculata, rarius ad apicem paullo angustiora. Textura laxior, in foliis coctis et tinctis cellulae reti albido, linea tenuissima percurso, ad speciem cinguntur; appareat enim membrana primaria hyalina limitesque cellularum; intra membranam primariam appareat nucleus roseo-violaceus, angulis et mediis parietibus puncto obscurius violaceo eleganter variegatus, qui nucleus levi ictu e cellula dirupta, nunc e sola membrana primaria consistente, ejici potest. Nucleus, margine plerumque punctis 12 eleganter depictus, sistit membranam cellulae secundariam cum eo, quod continet. Amphigastria quadruplo minora, distantia, ovato-rotunda, patula, sinu latiore ad $\frac{1}{3}$ fere bifida, laciniae erectae acutae. Fructus lateralis sessilis. Folia involucralia minora, subconformia, margine ventrali inflexo, lobulo plano; amphigastrium involucrale ovatum bifidum. Perianthium involucrum superans obovato-pentagonum, margine compressum, dorso uni-, ventre acute bicarinatum in fructu juniore. Pedunculus brevis, exsiccatus nodulosus. Capsula ovata, in valvulas quatuor ovales hyalinis infra medium fissa.

Rami masculi parvi, perigonio pyramidalis brevi coronati, amphigastriis praeter basales obsoletis. Spica mascula e 4—5 paribus foliorum componitur; folia perigonalia subaequali-biloba, scaphoidea, in gremio plerumque bina (vel terna) antheridia fovent, quorum extimum antheridium pedicello longo, tres antheridii diametros fere aequante, insidet.

Maxime affinis *Lejeuniae Wallichiana*, differt foliis minus longe complicatis, amphigastriis longius incisis brevioribus sinuque latiore.

30. *Lejeunia contigua* *Nees ab Es.*

L. caule repente contexto inordinate pinnatim decomposito, foliis arctissime imbricatis suborbiculatis integerrimis subtus emarginato-subplicatis, amphigastriis foliis paulo minoribus arctissime imbricatis orbiculatis acute bifidis laciniis acutis, fructu laterali sessili, perianthiis obovatis quinquangularibus.

β , *tenerior*, laciniis amphigastriorum conniventibus.

Synops. Hep. p. 362 et 760 n. 126.

Liebmann fandt denne Plante i Skovene omkring Plantagen Hacienda de Mirador i Departementet Vera Cruz i Marts med Perianthier (Hb. Liebmann. n. 75, 94 b, 103, 361). Leibold samlede den sandsyntligvi ved Zazuapan.

Folia cocta et tincta discum albo-reticulatum et cellulas plerumque sexangulares roseas ostendunt, in quibus figura subsellata obscurius tineta appetit, quae ut etiam nucleus levi ictu ejici potest, quare cellulas roseas membranam primariam sistere patet nucleumque contractum cum eo, quod continet, esse membranam secundariam. In nucleo videoas saccum primordiale coagulatum subflavum. In cellulis diruptis et nucleo destitutis faciem internam roseam videoas; sed inter vicinas cellulas spatium album linea cellulæ limites definiente percurritur, unde haec pars hyalina certe pro membrana primaria accipienda est. Cur autem facies interna rubet? an illud stratum roseum a membra primaria omnino alienum est et potius membranae secundariae vindicari debet?

31. *Lejeunia opaca* *Gottsche.*

L. caule repente elongato inordinate pinnatim decomposito, foliis imbricatis orbiculatis planis integerrimis basi subtus sinuato-complicatis lobulo paryo bidentulo, amphigastriis folia subaequantibus subimbricatis orbiculatis ad medium usque acute bifidis, fructu ad basin ramulorum sessili, involueri foliis conformibus amphigastrio maximo, perianthio obovato quinquangulari, carinis ventralibus alte elevatis.

α^* , *intermedia*, forma inter vulgarem et γ , *geniculatam* intermedia.

β , *filiformis*, elongata, angusta, foliis inflexis, amphigastriis minus densis angustioribus.

Synops. Hep. p. 362 et 760 n. 126.

Formen α^* samlede Liebmann paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') i Marts (Hb. Liebm. n. 22, 24, 34, 43) og omkring San Antonio de Huatusco (4500') i Departementet Vera Cruz og i de fugtige skyggefulde Skove omkring San Pedro Tepinapa

(2000—2500') i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca, i Juni 1842 (n. 592). Varieteten ε fandtes paa Hacienda de Mirador og i Nærheden af Colipa (500—800') i Departementet Vera Cruz i Januar og Marts (n. 118, 138, 272, 311).

Exemplaria Mexicana paullum a forma originali recedunt, pleraque magis ad varietatem *r. geniculatam* appropinquant; folia magis convessa, apice non tam obtuse rotunda, texturā quoque paullum diversa. N. 272 habitu ad *Lejeuniam vermicularem* accedens, fortasse propria species est, sed cum perianthia non invenerim, apud *Lejeuniam opacam* relinquere malo. In n. 24 exemplaria inveniuntur, quae amphigastriis latioribus magis ad *Lejeuniam repente* Tayl. accedunt.

Folia cocta et tincta elegantissimam sane ostendunt imaginem, qualem raro inter Lejeunias invenias. Membrana cellulæ secundaria processu chemico retrahitur a primaria, unde rete album latius inter maculas violaceas conspicitur, in quo linea media cellularum limites veros notat; nucleus violaceus, qui ictu e cellula dirupta ejici potest, longos apices acuminate habet, qui angulis cellulæ respondent. Hoc modo stellæ figura egregia in quaque cellula oritur roseo-violacea, cuius medium disco coagulato sacci primordialis obscurius appet. Similem imaginem praebent foliorum Madothecarum cellulæ mediae majores, sed radiorum gracilitate figura nostræ plantæ elegantior est et oculis magis placet.

Capsula ultra medium fissum e duobus stratis componitur, alterum exterius cellulas tabulatas quadratas majores versus basin medio in apicem decurrentes, intermedias minores et marginales quadratas secundum legem ostendit, praeparatione violaceas; alterum interius flaccidius est, praeparatione flavescit et cellulas longiores habet; strata fere integra inter se separari possunt.

32. *Lejeunia amoena* *Gott sche.*

L. caule repente inordinate pinnato, foliis arce imbricatis subrotundis convexis subinflexis integerrimis basi subtus decurrente-complicatis lobulo parvo subsaccato bidentulo, amphigastriis magnis arce imbricatis cordato-rotundis margine angulatis convexis acute bifidis laciniis saepe inaequalibus, fructu in basi ramorum laterali sessili, involuero conformi integerrimo, perianthiis elongatis oblongo-ovatis acute pentagonis.

Synops. Hepat. p. 363 et 760. n. 128.

Liebmann fandt denne Art paa Plantagen Hacienda de Jovo (Hb. Liebmann. sub n. 562) uden Frugt.

33. *Lejeunia parvistipula* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente irregulariter ramoso, ramis elongatis flexuosis, foliis laxe imbricatis ovato-oblongis obtusis integerrimis subtus sinuato-complicatis, lobulo inflato emarginato-unidentato, amphigastriis parvis subdistantibus ovato-rotundis patulis bifidis laciniis erectis sinuque acutis, fructu laterali sessili, perianthio obovato-pentagono, dorso convexo, ad apicem uni-, ventre acute bicarinato, foliis involucralibus majoribus subacutis lobulo oblongo apice libero lanceolato, amphigastrio ovali ad $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ partem fere bifido.

Synops. Hepat. p. 761. n. 131 b.

Liebmman samlede denne Plante i Skovene omkring Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i August med Perianthier og ved San Antonio de Huatusco (4500') i Marts. (Hb. Liebmman. n. 37, 130 b, 345 f, 352 a).

Planta tenera, angusta. Caules inter muscos repentes, lineas 6—12 longi, irregulariter ramosi. Rami elongati, flexuosi, ob folia decidua (lobulis amphigastriisque solis residuis) saepe nudiusculi. Folia fere $\frac{1}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{8}$ lin. lata, laxe imbricata vel contigua, subsemiverticalia, ovalia vel oblique ovata apice paullo basin versus deflexa, obtusa, rarius vel subrotunda vel oblonga, integerrima vel obsolete repando-crenulata, flava, nonnihil devexa, margine ventrali sinuato-complicata, lobulo inflato inflexo apice emarginato-unidentato. Textura fere qualis in *Lej. opaca*; folia cocta et tincta discum late albo-reticulatum maculasque roseas sacculum primordiale coagulatum continentes monstrant. Membrana secundaria processu chemico magis contrahitur in nucleum subrotundum roseo-violaceum; igitur membrana primaria hyalina latiore tractu (linea media cellularum limites notante) apparet. Nucleus violaceus levi ictu e cellula dirupta, nunc sola membrana primaria consistente, ejici potest. Amphigastria quadruplo minora, remotiuscula, ovato-rotunda, patula, integerrima, ad medium bifida, laciniis erectis sinuque acutis. Fructus laterales sessiles. Folia involucralia majora, apice subacuta, $\frac{2}{3}$ longitudinis perianthii cingentia, patula, biloba, lobulo minore angusto oblongo adnato, apice libero acuto. Amphigastrium involucrale ovatum, vix ad $\frac{1}{4}$ partem bifidum. Perianthium obovato-pentagonum, dorso convexum, ad apicem plerumque uni-, ventre acute bicarinatum.

Amphigastriis parvis patulis a plerisque affinibus diversa est; foliis longioribus, textura, perianthio longiore a *Lejeunia duriuscula*, foliis non orbiculatis, omnibus evidenter lobulatis denique differt a *Lejeunia phyllobola*, ad quam habitu et foliis saepe deciduis accedit.

34. Lejeunia pallida Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente inordinate subpinnato, foliis imbricatis subsemiverticalibus ovalibus integerrimis, basi ventrali complicatis lobulo subventricoso infexo, amphigastriis imbricatis duplo minoribus rotundis adpressis ad tertiam partem bifidis laciniis suberectis acutis, fructu laterali sessili, foliis involucralibus perianthium subaequantibus inaequaliter bilobis, perianthio late obovato-quinquangulari.

Synops. Hepat. p. 762. n. 138 c.

Liebmman samlede denne Plante i Skove omkring Sta Maria Tlapacoyo (2—3000') i Departementet Vera Cruz i Januar med Perianthier. (Hb. Liebmman. n. 577).

Caulis ad corticem arborum arcte repens, bilinearis-pollicaris, irregulariter ramosus, subpinnatus, ramis brevibus parvis vel elongatis subfasciculatis, his saepe iterum pinnulis instructis. Folia imbricata, semiverticalia vel subverticalia, ovalia, apice angustato subdeflexa, basi dorsali supra caulem protracta, integerrima, $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ lin. lata, laxe texta, pallide virescentia fere hyalina; margo ventralis basi in lobulum inflatum complicatus leni curvatura versus apicem angustatum adscendit. Folia cocta et tincta discum albo-reticulatum maculasque violaceo-fuscas exakte angulatas ostendunt, quae levi ictu e cellula dirupta hyalina, nunc e sola membrana primaria consistente, ejici possunt; tamen plerumque in angulis membranae primariae pars parva incrassationis membranae secundariae, quam maculae violaceae sistunt, adhaeret; sunt autem multae cellulae, e quibus nucleus perfecte solutus a membrana primaria omnino integer ejicitur et incrassationem angularem vulgarem et intermedium parietalem ostendit; sed in plerisque cellulis singula puncta incrassata confluunt et intra membranam secundariam limbum repandum violaceum conficiunt. Sacculus primordialis in grumulos numerosos solvit. In foliis junioribus (praesertim basi versus marginem dorsalem) cellulae elegantissime violaceo-punctatae sunt. Amphigastria imbricata, plana, adpressa, rotunda vel ob basin utrinque paullum dilatata subcordata, integerrima, foliis duplo minora, bifida, sinu obtusiusculo, laciniis acutis erectis vel subconniventibus; textura eadem atque in foliis. Folia involucralia majora, lobulus planus, angustus, apice solum libero; amphigastrium involucrale rotundum subemarginatum. Perianthium breve, vix involucrum superans, late obovatum, margine compressum, dorso ad apicem uni-, ventre acute bicarinatum.

Diffr. a *Lejeuniae sordidae* varietate β amphigastriis minoribus, foliis et perianthio brevioribus.

35. *Lejeunia deplanata* Nees ab Es.

L. caule repente pinnatim ramoso, foliis subhorizontalibus oblique ovatis decurvis obtusis integerrimis basi subtus cucullato-complicatis lobulo inflato truncato, amphigastriis folio quadruplo minoribus distantibus orbiculatis integerrimis acute ad medium bifidis laciniis rotundatis subconniventibus, perianthio obovato tetraptero, carina dorsali obtusa vel obsoleta.

Synops. Hepat. p. 368. n. 142.

β , *Mexicana*, amphigastriorum laciniis paullo acutioribus.

Liebmann samlede denne Plante paa Barken af Træerne paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') i Marts med Blomst. (Hb. Liebmann. n. 27. ex parte).

36. *Lejeunia Huitamalcensis* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente intricato subpinnatim ramoso, foliis subimbricatis oblique ovato-oblongis ovatisve, margine dorsali arcuatis, ventrali rectiusculis basi sinuato-complicatis, lobulo inflato vel nullo, amphigastriis minutis orbiculato-ovatis ad medium bifidis laciniis subacutis, fructu laterali sessili, foliis involucralibus majoribus bilobis, lobulo ventrali magno apice libero obtuso, perianthio . . . Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hep. p. 762. n. 142 b.

Fandtes paa Barken af et Træ ved Huitamalco (2500—3000') i Districtet Puebla i Mai i Blomstringens Begyndelse. (Hb. Liebmann. n. 458 b).

Caulis 3—4 lineas longus, ad arborum corticem repens. Folia media imbricata, inferiora et suprema approximata vel remota, semiverticalia, margine dorsali arcuata, ventrali paullum rotunda et sinuata, si lobulus adest, vel rectiuscula, si lobulus deest. Lobulus parvus, ovatus, inflatus, apice oblique lunulato anguloque libero prominente; saepe lobulus nullus et margo ventralis basi tantum paullum incrassatus. Amphigastria minuta, caulis latitudinem paullo excedentia, nonnumquam obsoleta. Folia involucralia erecta, in caule principali, paullo majora, apice paullo acutiora quam caulina; lobus oblongus, apice obtusus. Folia praeparata discum albo-reticulatum et maculas violaceas ostendunt, interdum cum incrassatione punctiformi angulari obscurius violacea, praesertim in foliis superioribus. Spica mascula parva pyramidalis, e 3 paribus foliorum composita, in apice rami sita; antheridia jam evanuerunt. Perianthium non visum.

Lejeuniae deplanatae affinis, sed differt foliorum forma eorumque margine ventrali ante lobulum sinuato, lobulo saepe nullo amphigastriisque minoribus.

37. *Lejeunia phyllobola* *Nees ab Es.*

L. caespitosa, caule repente stellatim irregulariterque ramoso, ramis patentibus (ob folia decidua) nudis, foliis orbiculatis subsemiverticalibus imbricatis integerrimis subtus complicatis, lobulo ventricoso emarginato saepe unidentato, amphigastriis subdistantibus ovato-orbiculatis bifidis laciniis acuminatis sinuque obtusis, perianthio breviter piriformi ore pentagono angulis lateralibus inferioribusque acutis, dorsali obtuso.

Synops. Hep. p. 369. n. 146.

?var. *γ. major*, foliis amphigastriisque paullo majoribus.

Gottzsche Icon. Hep. inedit.

Liebmman samlede denne Art paa Barken af et Træ paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Marts uden Frugt.

38. *Lejeunia spiniloba* *Lindbg. et Gottzsche.*

L. caule repente parce ramoso, foliis subimbricatis ovatis obtusis integerrimis basi in lobulum complicatis longum linearem cauli approximatam, amphigastriis oblongo-ovalibus ad medium bifidis, laciniis angustis lanceolatis erectis, fructu laterali, perianthio brevi fere immerso oblongo-prismatico, dorso medio elevato, ventre bicarinato, foliis involucralibus conformibus. Gottzsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hep. p. 770. n. 236 b.

Liebmman fandt denne Plante i Nærheden af Colipa (500—800') i Departementet Vera Cruz i Marts med Antheridier og Perianthier. (Hb. Liebmman. n. 143 ♂ et ♀).

Caules caespitose repentes, virides, 6—8 lin. longi, cum foliis humectis $\frac{5}{6}$ lin. lati, ramulis nonnullis instructi. Folia laxius imbricata, semiverticalia, paullum oblique disticha, breviovata, $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{5}$ lin. lata, apice rotundata, convexiuscula, integerrima, nonnulla apice aliquantum deflexa, basi ventrali angusto spatio in lobulum sublinearem $\frac{1}{5}$ lin. longum, $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{10}$ lin. latum apicem versus angustatum complicata; lobulus in apice ramorum interdum subulatus, cauli approximatus, nonnumquam, sed rarius apice paullum incurvatus. Amphigastria contigua $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{2}{5}$ lin. lata, ovalia, apice ad medium fere ($\frac{1}{10}$ lin.) bifida, sinu plerumque acuto, laciniis lanceolatis erectis. Retis maculae majusculae, lobuli foliorum e seriebus cellularum 3—5 compositi. Inflorescentia mascula in ramulo proprio, monoeca, e paucis perigonii inflatis, antheridia bina pedicellata in axilla foventibus, composita. Perianthium fere immersum, $\frac{1}{3}$ lin. longum, apice fere $\frac{1}{6}$ lin. latum, dorso versus apicem carinam paullum elevatam, ventre carinas duas ostendens; folia involucralia caulinis con-

formia, sed minora, $\frac{3}{10}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ lin. lata, in lobulum $\frac{1}{4}$ lin. longum, $\frac{1}{5}$ lin. latum complicata.

Lobuli formà, quae nonnullarum Madothecarum speciem aemulatur, a reliquis Lejeuniis etiam sterilis facile distinguitur; hac parte tamen similis est *Lejeuniae oxylobae* varietati β , *minori*, quae formam intermedium inter utramque speciem sistit.

39. *Lejeunia oxyloba* *Lindbg. et Gottsche.*

L. caule repente inordinate ramoso, foliis imbricatis ovatis integerrimis basi in lobulum oblongo-quadratum angulo externo in dentem subincurvum productum complicatis, amphigastriis distantibus ovatis ad medium bifidis, laciniis lanceolatis obtusiusculis, fructu laterali, foliis involucralibus bilobis majoribus, lobulo oblongo-lanceolato, amphigastrio conformi majore. Gottsche Icon. Hep. inedit.

? β . *minor*, lobulo minore lanceolato-subuliformi, perianthio (juniore) compresso piriformi dorso et ventre obtuse unicarinato.

Synops. Hepat. p. 770. n. 236 c.

Liebmann fandt Hovedformen paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 10,000 Fod i September. Var. β fandtes blandt Hepaticae fra Iicaltepec.

Caules semipollulares et ultra, cum foliis humectis $\frac{5}{6}$ lin. lati. Folia viridia, brevi-ovata, $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ lin. lata, basi in lobulum (formà fere *Radulae complanatae*) oblongo-quadratum, $\frac{1}{6}$ lin. longum, $\frac{2}{5}$ lin. latum, angulo externo in dentem lanceolatum obtusiusculum incurviusculum complicata. Amphigastria ovata, ad medium bifida, laciniis lanceolatis plerumque divergentibus, $\frac{1}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ lin. lata. Florem femineum tantum vidimus. Folia involucralia $\frac{2}{5}$ lin. longa, cum lobulo explanato fere $\frac{1}{3}$ lin. lata; amphigastrium involucrale $\frac{1}{3}$ lin. longum, $\frac{1}{5}$ lin. latum.

Varietas β forma ambigua est; quae primum in Hepaticis Brasiliensibus e Rio Janeiro Hb. eissneri, cum perianthio juniore, dein in caespite Hepaticarum in Cuba insula apud Bejucal a beato Liebmanno Aprili collecta, denique inter Hepaticas apud Iicaltepec a Liebmanno collectas visa est. Folia angustiora, $\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{5}$ lin. lata, lobulus fere $\frac{1}{5}$ lin. longus, dens externus $\frac{1}{10}$ lin. longus; amphigastria ovata, $\frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{10}$ lin. lata. Planta monoeca in apice stirpis principalis inflorescentiam masculam subglobosam, e 6 paribus foliorum perigonialium, unum antheridium in axilla foventium, compositam ostendebat, dum in ramulo laterali (latitudine 8 parium foliorum interjecta) basin versus flos femineus observabatur. Potius hanc formam ad speciem praecedentem adjungeremus, nisi amphigastriorum forma magis ovata contraria esset.

40. *Lejeunia adnata* *Kunze.*

L. caule repente subpinnatim ramoso, foliis arcte imbricatis oblongo-rotundis integrerrimis margine ventrali rectis basi subtus complicatis, lobulo inflato truncato subunidentato, amphigastriis minutis adpressis cordato-ovatis bifidis, lobis divergentibus obtusiusculis, fructu . . .

Synops. Hepat. p. 370. n. 147.

Var. β . *Mexicana*, foliis et amphigastriis paullo majoribus.

Gottzsche Icon. Hepat. inedit.

Fandtes paa Barken af et Træ paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000'), voxende sammen med *Lejeunia phyllobola*, uden Frugt.

41. *Lejeunia seriata* *Lindbg. et Gottsche.*

L. monoeca, caule repente parce ramoso, foliis imbricatis oblongis ovalibus apice rotundatis integerrimis, margine ventrali subrectis basi non decurrente complicatis, lobulo parvo cucullato in folium transeunte, amphigastriis distantibus parvis rotundis ad medium acute bifidis, lobis erectis acutis, fructibus lateralibus sessilibus secundum caulis longitudinem seriatis, foliorum involucralium minorum lobulo angusto plano apice lanceolato, perianthio obovato prismatico pentagono breviter emergente marginibusque compresso. Gottzsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hep. p. 762. n. 147 c.

Liebmman samlede denne Plante i Skovene omkring Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Marts med moden Frugt og udstøvede Antherer. (Hb. Liebm. n. 236 ex parte).

Caulis 4-linearis-semipollicaris, toris radicularum suctoriis sub amphigastriis ad folia arcte repens, parce ramosus. Folia imbricata, distiche patentia, ovalia, margine ventrali rectiuscula, basi complicata, lobulo parvo inflato in folium transeunte, $\frac{1}{4}$ lin. longa, medio $\frac{1}{6}$ lin. lata; retis maculae plerumque sexangulares, mediae majores, marginales minores; cellulae rarissime angulis vel etiam medio pariete paullum incrassatae. Amphigastria minuta, distantia, subrotunda, ad medium acute bifida, laciniis latis erectis acutis. Fructus frequentes laterales, in ramis ramulisque altero vel utroque latere seriatim dispositi. Folia involucralia foliis multo minora, paullo angustiora, adpressa, lobulo oblongo plano apice libero lanceolato; amphigastrium involucrale oblongum reliquis subconforme. Perianthium $\frac{1}{4}$ lin. longum, obovato-prismaticum, involucrum haud multum superans, margine compressum, dorso uni-, ventre bicarinatum. Capsula ad medium fere quadrivalvis ex unico strato

constare videtur. Capsula ante dehiscentiam cocta cum liquore kali caustici et zinco bijodato tincta egregiam praebet imaginem, dignam, quam fusius describamus. Si enim basi abscissa inter vitra explanatur, apicem capsulae adhuc cohaerentem signo crucis elegantissime depictum videas, quod e cellulis marginalibus oblongo-quadratis quatuor valvularum adhuc conjunctis componitur; cellulae apicem versus aequaliter decrescunt, sed basin versus 3—4 tantum cellulae minores inveniuntur ante punctum vulgare concretionis. In media valvula 4 cellulae oblongae sexangulares maximae observantur recta fere linea descendentes; spatium inter cellulas marginales et medias cellulis magnitudine (et praesertim latitudine) crescentibus et obliquo tractu dispositis expletur. His cellulis majoribus valvula fere dimidio in partem superiorem et inferiorem divisa est; pars superior cellulis majoribus medio in processum quasi extenditur, quem pars inferior (cellulis minoribus et utrinque diagonaliter dispositis exakte notata) ad speciem excisurā suā excipit. Hac cellularum dispositione valvulae ellipticae apice basique acutae apparent; apices conjunguntur in capsulae apicem ooideum subattenuatum; sed basi quasi cuneus novus cellularum inter valvulas interponitur, unde tractus cellularum in dimidio inferiore valvulae anfractuosus appetit. Accedit, quod in capsula praeparata non solum cellularum directio huc illuc obliquata et magnitudo earum insigniter diversa observatorem capit, sed coloris violacei varietas admirationem adhuc auget.

Semina flava, oblonga, angulosa, sporodermide granulosa ($\frac{10}{1}$) obducta; nucleus interior viridi-flavescens.

Spiae masculae breves triquetrae, 3 fere foliorum perigonialium paribus constitutae, ad caulem principalem inter ramos fructiferos inveniuntur.

Lejeunia adnata, proxima, distinguitur colore, textura, amphigastriorum forma.

42. *Lejeunia xanthophylla* Lindbg.

L. caule irregulariter pinnato repente, foliis imbricatis semi-subverticalibus subrotundis deflexiusculis integerrimis basi subtus plica brevi vel omnino non complicatis, lobulo (si adest) apice vel in folium transeunte vel emarginato-truncato, amphigastriis approximatis foliis triplo minoribus ovato-oblongis margine subangulatis ultra medium bifidis laciniis acuminatis, fructu . . .

Synops. Hepat. p. 370. n. 148.

?var. **β.** colore praecipue diversa.

Fandtes paa Træbark paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000'), voxende sammen med flere Lejeunier (Hb. Liebmann. n. 414 e. p.) uden Frugt.

Cum *Lej. xanthophyllae* exemplaria mihi desint, e notatis beati "Lindenbergii" hanc schedulam transcripsi.

43. Lejeunia Magnoliae Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente subpinnatim ramoso, ramis brevibus, foliis imbricatis distichis ovalibus integerrimis apice rotundatis, basi subtus complicatis lobulo inflato apice lunulato-emarginato subunidentato, amphigastriis distantibus obovato-cuneatis profunde bipartitis sinu latissimo, laciniis lanceolato-subulatis erecto-divergentibus, margine externo repando-angulatis subunidentatisve, fructu . . . Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hep. p. 763. n. 148 b.

Liebmam samlede denne Art i Skovene paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') paa Magnolia-Blade i Marts med modne Antherer. (Hb. Liebmam. n. 246).

Caulis semipollucaris, foliis adpressus iisque haustoriis adhaerens, parce ramosus; rami breves. Folia imbricata distiche patentia, inferiora minora, ovalia, obtusissima, integerrima, plana vel modice convexa, apice deflexa, $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ lin. lata, lobulus brevis, inflatus, apice lunulato-excisus vel angulo inflexo in folium transiens. Textura laxa, areolae magnae, plerumque sexangulares, marginales minores, subtransversae; in foliis praeparatis incrassatio punctiformis angularis et intermedia parietalis cellularum marginem variegatum facit, quod etiam in foliis non praeparatis, sed minus eleganter cellularum parietes triangulis albis variegati indicant. Color albescens. Amphigastria triplo vel quadruplo minora, distantia, obovata, ultra medium bipartita, laciniis lanceolatis vel subulato-lanceolatis, erectis, subdivergentibus vel apice rarius conniventibus, margine externo repando-angulata medioque interdum prominentia fortiore subunidentata. Rami masculini parvi caulis lateri insidentes, spicam parvam pyramidalem triquetram habentes, e duobus paribus foliorum compositam, cum amphigastrio basali; folia perigonalia inflata subaequali-biloba, unicum antheridium maturum continentia. Fructificatio non visa.

A *Lejeunia pacifica* consimili statura paullo majore, foliis paullo longioribus imbricatis et amphigastriis majoribus, a *Lejeunia xanthophylla* et aliis affinibus textura laxiore, foliis pellucidis, amphigastriis profunde partitis et laciniis angustis differt.

44. Lejeunia Melastomatis Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente pinnatim ramoso subbipinnatove, foliis imbricatis brevi-ovalibus divergentibus obtusis basi subtus complicatis, lobulo parvo inflato, amphigastriis approximatis majusculis cordato-ovatis adpressis ad medium bifidis sinu angusto, fructu laterali sessili, foliis involucralibus angustioribus in lobulum oblongum apice libero rotundatum complicatis, perianthio vix emergente obovato-piriformi pentagono, dorso uni-, ventre bicarinato. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 763. n. 148 c.

Fandtes paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Departementet Vera Cruz paa Blade af en Melastoma-Art. (Hb. Liebm. n. 77).

Caulis 6—8 lineas longus, pinnatim ramosus vel bipinnatus, ramis brevioribus longioribusve. Folia imbricata, divergentia, breviter ovalia, integerrima, margine ventrali basi in lobulum complicata parvum ventricosum, apice lunulato-emarginatum vel angulo inflexo in folium transeuntem. Color pallide viridis. Textura laxior, areolae plerumque sexangulares, marginales maculae 4—5-angulares minores. Folia praeparata discum albo-reticulatum maculasque violaceas e membrana cellulae secundaria constitutas ostendunt, quae in angulis tantum incrassationem punctiformem colore saturatiore violaceo depictam habent vel latiore tractu repando incrassatae sunt. Amphigastria approximata, duplo vel triplo foliis minora, cordato-ovata et subrotunda, appressa, ad medium anguste bifida, lacinis acutis, rarius obtusiusculis, apice paullum inflexis. Folia involucralia angustiora, lobulo plano oblongo, apice libero rotundo. Perianthium vix emergens, obovato-piriforme, dorso uni-, ventre bicarinatum.

Lejeunia xanthophylla affinis differt foliis brevioribus et amphigastriis minoribus.

45. *Lejeunia thymifolia* Nees ab Es.

L. caule repente subdichotomo subpinnatove, foliis imbricatis ovalibus apicem versus angustatis obtusis integerrimis amoene luteis, subtus convoluto-complicatis, lobulo rotundato extrorsum truncato, amphigastriis magnis imbricatis cordato-ovatis bifidis lobis rectis acutis integerrimis lobulos foliorum omnino tegentibus, fructu terminali et laterali ad basin ramorum, perianthio obovato acute pentagono involucro subimmerso, foliis subinvolutilibus ovato-lanceolatis obtusis lobulo linguaeformi, amphigastrio magno oblongo-cordato ad medium bifido.

Synops. Hep. p. 372. n. 156.

?var. ε, caule subsimplici, foliis nonnullis subobliquis, ramulorum erecto-patulis, textura laxiore.

Liebmann fandt denne Art paa Træbark i Nærheden af Sta Maria Tlapacoyo paa Plantagen Hacienda de Jovo (1800—2000') i Departementet Vera Cruz i Mai 1841 med ♀ Blomst. (Hb. Liebm. n. 564).

Ex sententia beati Lindenbergii magis huic quam sequenti speciei adnumeranda; ex mea sententia *Lejeunia thymifolia* Synops. Hepat. ita expurganda est, ut exemplaria Javanica et Indica solummodo hoc nomine salutentur; varietatem ?γ in Serra de Estrella a Bey-

richio collectam inter formas *Lejeuniae pulvinatae* removerim et varietatem ♂ majorem ex insula Madeira inter formas *Lejeuniae flavae* receperim; fortasse tum etiam nostra forma Mexicana (Hb. Liebm. n. 564), si fructificatio perfecta innotuerit, merito ad sequentem speciem numerari poterit.

46. *Lejeunia flava* Sw.

L. caule ramoso repente, foliis subimbricatis oblongo-ovalibus integerrimis apice rotundatis vel subangulatis basi subtus subsinuato-complicatis lobulo convoluto, amphigastriis duplo minoribus ovatis cordatisve ad medium usque acute bifidis laciniis ovato-lanceolatis, fructu laterali ad basin ramorum sessili, foliis involucralibus conformibus paullo minoribus bilobis lobulo quadrato magno, perianthio obovato exerto acute pentagono.

Synops. Hepat. p. 373. n. 157.

β, *laxior*, ramis elongatis foliisque distantioribus. Sterilis.

Fred. Müller fandt denne Art (α) med Perianthier iblandt *Frullania hians* og *Bryopteris flaccida* i Districtet Orizaba; iblandt andre Hepaticae fra den samme Localitet fandt jeg den laxere Form β.

47. *Lejeunia ambigua* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente inordinate ramoso, foliis imbricatis oblique ovatis obtusis vel acutiusculis apice deflexis, margine ventrali sinuato-complicatis, lobulo inflato majusculo apice (plerumque angulo inflexo) rotundo in folium transeunte, amphigastriis remotis minutis ovato-rotundis acute bifidis (saepe radicellis haustoriis obrutis), fructu in ramulo brevissimo laterali, foliis involucralibus parvis perianthii basin tantum cingentibus, lobulo piano acuto patulo, perianthii elongato obovato compresso acute pentagono. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 764. n. 160 b.

Liebmann samlede denne Plante i Frugt paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Marts. (Hb. Liebmann. n. 14, 28, 29, 42, 44, 55, 82 ex parte, 122, 320, 327, 334).

Caulis 4—6 lineas longus, vage (nonnunquam substellatum) ramosus, haud raro quoque longior, simpliciusculus, radicellis haustoriis plus minusve longis muscis, quibus irrepit, aut cortici affixus. Folia caulis primariae imbricata, oblique ovata, pellucida, distiche patentia, superiora et ramorum haud rara magis distantia, ovata, suberecta, pleraque obtusa vel apice angustata et acutiuscula, convexa, margine ventrali basi sinuato complicata, lobulo

inflato satis magno apice rotundo in folium transeunte, si angulus inflectitur, sed angulo evoluto apice lunulato-emarginato truncatove, in foliis rameis paullo longiore, raro obsoleto. Textura laxa, cellularum incrassatio nulla nec angulorum nec parietum; color pallide viridis. Amphigastria distantia, minuta, vix caulem latitudine excedentia, orbicularia vel ovato-rotunda fere ad medium bifida, laciniis acutis, haud raro radicellis haustoriis ita obruta, ut difficilius videantur. Folia involucralia parva, basin perianthii ad $\frac{1}{3}$ totius longitudinis cingentia, conformia, sed lobulo plano brevi acuto patulo. Perianthium elongatum, obovatum vel ad apicem tantum, vel, quod saepius accidit, profundius quinquangulare, dorso uni-, ventre bicarinatum, margine carinisque compressum. Pedicellus duplice perianthii longitudinem habet, siccus geniculatus. Capsula ooidea ad medium quadrivalvis.

Affinis *Lejeuniae serpyllifoliae* et *laxae*, sed foliis nonnullis praesertim ramorum acutiusculis, amphigastriis minutissimis et perianthio elongato distinguitur.

48. *Lejeunia diversistipa* *Lindbg. et Gottsche.*

L. monoeca, caule repente flexuoso subpinnatim ramoso, foliis laxe imbricatis vel contiguis subhorizontalibus ovatis apice rotundatis vel oblique acutis integerrimis deflexiustculis basi subdecurrente non complicatis vel plica minuta obsolete vel etiam in lobulum parvum subinflatum complicatis, amphigastriis minutis suborbiculatis bifidis laciniis acutis inflexis, fructu in ramulo lateral, perianthio elongato ovato-piriformi, dorso anguste vel obsolete uni-, ventre bicarinato, foliis involucralibus minoribus acutis, lobulo oblongo apice libero lanceolato. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 765. n. 176 b.

Liebm. samlede denne Plante voxende sammen med flere andre paa Hacienda de Mirador (3000') i Marts Maaned med udstøvede Antherer og Frugt. (Hb. Liebm. n. 81 og 85 ex parte).

Caules inter muscos repentes, haustoriis fibrillosis affixi, lineas 6—12 longi, flexuosi, subpinnatim ramosi, ramulis flaccidis. Folia laxe imbricata vel contigua, in ramis magis distantia, semiverticalia vel fere horizontalia, ovata, basi paullo angustata, apice rotundata vel oblique acuta, paullum deflexa, rarius ventrem versus reflexa, flaccidula, $\frac{1}{4}$ lin. longa, medio et apice $\frac{1}{6}$ lin. lata, margine ventrali levi curvatura basi paullum decurrente in lobulum parvum subinflatum complicata vel absque lobulo plica minuta solummodo paullum incrassata. Color flavo-fuscus. Textura parietibus cellularum ad speciem latioribus validior videtur; sed folia cocta et tincta nullam nec angulorum nec parietum incrassationem ostendunt; cellulae majores, praesertim mediae, plerumque sexangulares, versus marginem minores, marginales plerumque quinquangulares, minores, subtransversae. Am-

phigastria erecto-patula vel patentia, minuta, vix caule latiora, suborbiculata, bifida, convexa, laciniis acutis incurviusculis, unde sinus eorum tamquam emarginatura interdum appareat; interdum radicellis ramosis suctoriis quasi obruta. Folia involucralia parva, patula, acuta, lobulo apice lanceolato solummodo libero, oblongo; amphigastrium involucrale ovale, ad $\frac{1}{4}$ bifidum, laciniis acutis, margine angulato-repandum. Perianthium elongatum, ovato-piriforme, dorso anguste carinatum vel laeve, ventre acute bicarinatum, maturitate varium in modum dehiscens. Spicae masculae in caule principali ejusdem stirpis laterales, ovatae, longitudine variantes, e paribus foliorum perigonialium 4—8 compositae; folia perigonalia subaequiloba, ad apicem spicae decrescentia.

Affinis *Lejeuniae commutatae* etc., sed lobulo foliorum saepe obsoleto, amphigastriis minutis et perianthio longiore distingui potest. A *Lejeunia glaucescente*, proxima, foliorum forma et perianthio elongato differt.

49. *Lejeunia laevicalyx* Gottsche.

L. monoeca, caule repente flexuoso ramoso, foliis subimbricatis ovatis apice rotundatis, margine ventrali sinuato-complicatis, lobulo majusculo inflato apice emarginato-unidentato vel (angulo inflexo) transeunte, amphigastriis remotis ovato-rotundis ad medium bifidis laciniis rectis acutis, fructu laterali, perianthio obverse oviformi, carinis angulisque nullis, foliis involucralibus subconformibus majoribus, lobulo oblongo angusto apice libero obtuso. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Frederik Müller samlede denne Plante iblandt andre Hepaticae i Districtet Orizaba.

Caulis unici exemplaris trilinearis. Folia pallide viridia, pellucida, integerrima. Amphigastria caule 2—3plo latiora, ad medium bifida sinu plus minus angusto, laciniis rectis acutis apice incurviusculis; basi toro radicularum praedita. Perianthium perfecte oviforme sine plica et carina, sectione transversa orbiculare, apice retusum tubulo premiente, tertia parte superiore ex involucro emergens, ejusdem longitudinis ac folia involucralia patentia.

Proxima est *Lejeuniae Lindbergiana* e Brasilia, quae statura majore et foliorum et involucri forma diversa est.

50. *Lejeunia laeta* Lehm. et Lindbg.

L. caule repente vase ramoso, foliis approximatis subhorizontalibus ovato-ellipticis obtusis et acutiusculis planis integerrimis basi non complicatis vel obsolete plica angustissima compli-

catis, amphigastriis remotis minutissimis ovatis profunde bifidis laciniis obtusis vel acutiusculis, perianthiis in ramulis brevissimis lateralibus obovatis pentagonis, angulis compressis, foliis involucralibus conformibus.

β , magis ramosa, amphigastriis saepe obsoletis.

Synops. Hepat. p. 380 et 765. n. 178.

Liebm. fandt Hovedformen (n. 47, 293) paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') tilligemed Varieteten β (n. 7); han samlede den ogsaa ved Rio Nautla i Nærheden af Jicaltepec i Departementet Vera Cruz. (Hb. Liebm. n. 414 b).

Nr. 293 maxime convenit cum exemplaribus originalibus; n. 7 (var. β) minor est, magis ramosa, forsan propter fructificationem uberiorem. Exemplaria, qualia monstrat n. 47, inter specimina quoque Brasiliensia inveniuntur.

51. *Lejeunia angusta* Lehm. et Lindbg.

L. caule repente ramuloso, foliis distantibus subverticalibus brevibus orbiculato-ovatis ellipticisve basi angustata complicatis lobulo polymorpho ovato apice emarginato-unidentato (saepe inflato magno, nonnunquam minuto vel obsoleto), amphigastriis distantibus minutis ovatis apice bifidis, fructu laterali sessili, foliis involucralibus binis, altero semper apice acutiore altero obtuso instructo, bilobis lobulo oblongo-lanceolato, amphigastrio involucrali a forma amphigastriorum caulinorum recedente ovato usque ad medium fere bifido laciniis lanceolatis.

β , *tenuis*, gracillima, foliis ellipticis magis hyalinis, amphigastriorum laciniis acutioribus.

Synops. Hep. p. 384. n. 187.

Dr. Schiede fandt Hovedformen paa Blade i Nærheden af Jalapa (4500'); Var. β fandt Hampe blandt Mosser fra Mexico.

Var. β , teneritate et colore luteo insignis, status potius est plantae juvenilis.

A *Lejeunia thymifolia* et *serpyllifolia*, affinibus, differt caule angusto, foliis brevioribus, lobulo magno apice saepe unidentato, compage firmiore, amphigastriis minutis nonnunquam obsoletis.

52. Lejeunia radicans Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente radicante subpinnatim ramoso, foliis contiguis distiche patentibus ovato-oblongis obtusis basi decurrente subtus sinuato-complicatis, lobulo inflato vel parvo quadrato plano (rarius obsoleto), amphigastriis minutis distantibus ovatis profunde bifidis, lacinii acutis, fructu laterali, perianthio obovato compresso dorso obtuse uni-, ventre acute bicarinato, foliis involucralibus margine ventrali toto fere complicatis, lobulo plano apice solummodo libero obtuso, amphigastrio conformi. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 766. n. 187 c.

Liebmann fandt denne Art i Departementet Vera Cruz paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Marts med halvmoden Frugt (n. 236, 329, 366) og paa Plantagen Zacuanpan (2500—3000') 5 Leguas Østen for Byen S. Antonio de Huatusco. (Hb. Liebm. n. 536 ex parte).

Caulis 3—6 lineas longus, flexuosus, repens, subpinnatim ramosus, rami vel procumbentes radicantes in modum stolonum vel adscendentes. Folia contigua vel approximata, ramulorum saepe subdistantia semiverticalia, patenti-divergentia, suprema subverticalia, ovato-oblonga, obtusa, integrerima, $\frac{1}{8}$ — $\frac{3}{16}$ lin. longa, $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{8}$ lin. basi lata, basi ventrali paullo decurrente plerumque sinuato-complicata in lobulum vel inflatum truncato-unidentatum vel parvum quadratum planum. In foliis nonnullis plica minuta tantum adest vel lobulus omnino nullus. Textura crassa, maculis angulatis aequalibus, limitibus ad speciem crassis; sed in foliis coctis et tinctis nulla incrassatio nec angulorum nec parietum appetet; membrana secundaria paullum contrahitur et violaceum induit colorem, dum membrana primaria rete album, linea media cellularum limites notante percursum, sistit. Cellulae disci pleraequae sexangulares, marginales minores, quinquangulares. Amphigastria foliis quintuplo vel sextuplo minora, distantia, ovata, profunde bifida, lacinii acutis vel strictis vel conniventibus. Fructus laterales vel ramuli apici insidentes sub eo innovantis. Folia involucralia reliquis quidem conformia, sed margine ventrali altius inflexa, complicata parte angusta, apice brevi spatio libero obtuso. Perianthium dimidio involucrum superans, obovatum, fere $\frac{1}{4}$ lin. longum, margine compressum, pentagonum, carina dorsali obtusa.

Affinis *Lejeuniae angustae*, sed differt ramificatione, foliis brevioribus magis rotundatis et involuci foliis aequalibus.

53. Lejeunia perigonialis Gottsche.

L. corticicola, caule repente irregulariter ramoso, foliis albicantibus imbricatis ovato-ellipticis apice angustato obtusis integerrimis, basi plerumque in lobulum magnum inflatum

apice unidentatum vel minutissimum subquadratum apice exciso-unidentatum complicatis, amphigastriis remotis ovato-obcuneatis bifidis laciniis lanceolatis basi plerumque prominentia dentiformi armatis vel margine laterali toto laevibus, perianthio obovato-prismatico quinquangulari semiimmerso, involucro integerrimo; inflorescentia ♂ perigonis majoribus sat notabilis. — Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Liebmman samlede denne Plante paa Plantagen Mirador (3000') paa Træbark med flere andre Lejeunier i Marts. (Hb. Liebmman. n. 329 e. p.).

Plantae albidae, minutae, subcaespitose cortici irrepentes, irregulariter ramosae ramisque intertextis difficulter extricabiles. Caules 2—3-lineares, fragiles. Folia laxius imbricata; pellucida, ovata vel ovato-elliptica, basi plerumque in lobulum magnum ovatum inflatum angulo libero unidentatum complicata vel rarius in lobulum minutissimum basi inflexa. Textura clara; folia cocta pleraque nullam cellularum incrassationem ostendunt; in nonnullis vidi incrassationem angularem punctiformem et lateralem intermedium in cellulis apicalibus. Membrana primaria hyalina album limbum cellularum format. Amphigastria margine laterali integerrimo, vel prominentia dentiformi armato, qua parte lacinia in discum amphigastrii transit. Folia involucralia majora, perianthium junius aequantia, adultum supra medium circumdantia, integerrima, fere aequiloba, utroque lobo in apicem obtuso-lanceolatum angustato; amphigastrium involucrale caulinis duplo majus, ad $\frac{1}{3}$ partem bifidum laciniis acutis latioribus integerrimis. Perianthium prismatico-obovatum quinquangulare. Inflorescentia mascula terminalis vel in medio ramo perigonis majora inflata habet et plerumque 2 vel 3 paria ostendit.

A *Lejeunia lepida* foliorum forma, apice obtusiore et amphigastriis angulo prominentibus, a *Lejeunia glaucophylla* G. foliorum forma, apice acutiore et amphigastriorum dente lateralii diversa est.

54. *Lejeunia lepida* Lindbg. et Gottsche.

L. caule repente inordinate subpinnatim ramoso, foliis contiguis ovato-lanceolatis distiche patentibus ad apicem angustatis acutis (interdum obtusiusculis) integerrimis margine ventrali rectiusculis basi in lobulum ventricosum complicatis, amphigastriis distantibus minutis ovatis integerrimis ad medium bifidis laciniis lanceolatis obtusiusculis, fructu laterali, foliis involucralibus majoribus subaequilobis acutis, perianthio late obovato margine compresso, dorso uni-, ventre acute bicarinato. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 766. n. 187 d.

Liebmman samlede denne Plante ved Huitamalco (2500—3000') i Departementet

Vera Cruz i Juni med unge Perianthier og paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') i Marts (Hb. Liebmann. n. 479, n. 23 og 227).

Plantula angusta, cum foliis $\frac{1}{4}$ lin. lata. Caulis vel caespitose ad arborum corticem repens vel aliis Hepaticis intermixtus, parce et inordinate ramosus. Folia laxe imbricata, superiora et ramorum magis distantia, ovato-acuta, distiche patentia, planiuscula, apice angustato pleraque acuta, rarius obtusa, fere triangularia, margine dorsali rotundata, ventrali rectiuscula et basi in lobulum complicata. Lobulus magnus ventricosus inflexus apice truncato-subunidentatus (angulo scilicet explicato); nonnunquam lobulus obsoletus vel nullus, foliis tum angustioribus nonnihil decurrentibus. Amphigastria distantia foliis triplo vel quadruplo minora, ovato-rotunda, ad medium bifida, laciinis rectis lanceolato-subacutis apice obtusiusculis, angulo sinus plerumque rotundo. Folia involucralia majora, subaequaliter biloba, acuta, lobulo plano apice rotundiore, margine libero subreflexo; amphigastrium magnum ovato-rotundum, appressum. Textura foliorum vulgaris; folia praeparata ne minimam quidem angulorum incassationem ostendunt; cellularum limites in reti albo optime apparent. Perianthium breve, ad dimidium emergens, rotundo-ovatum, margine compressum.

Proxima huic est *Lejeunia perigonialis*, quae tamen foliorum forma et amphigastrorum laciniis acuminatis margineque plerumque angulato-unidentato differt; *Lejeunia glaucocephylla* G. (Annal. d. sc. natur. 1857. p. 345. n. 35) foliis brevioribus latioribusque et amphigastriorum laciniis angustioribus et acutioribus diversa; *Lejeunia proboscidea* G.* e Brasilia foliorum forma et amphigastriorum laciniis angustioribus margine subangulatis differt.

55. *Lejeunia piriformis* Lindbg. et Gottsche.

L. caule caespitoso reptante stolonifero flexuoso inordinate ramoso, foliis subimbricatis subverticalibus ovato-rotundis convexiusculis patulis erecto-appressis, margine ventrali vel toto inflexis vel planis decurrentibus, lobulo nullo, amphigastriis ovatis patulis ultra

*)

Lejeunia proboscidea Gottsche.

L. caule repente ramoso, foliis patentib[us] subimbricatis oblique ovato-acutis triangularibus integerrimis, apice angustato deflexis vel ventrem versus reflexis, margine dorsali arcuatis, ventrali emarginato-complicatis in lobulum magnum inflatum apice emarginato-unidentatum (angulo in dentem uncinatum producto), amphigastriis remotis erecto-patentibus ovatis ad medium bifidis sinus angulo rotundo latiore, laciinis angustis e dupli cellularum serie confectis, basin versus cuneato-angustatis margine angulato, fructu . . . Gottsche Icon. Hep. inedit.

In Setae Catharinae insula (Brasiliae) legit Pabst.

medium bifidis, fructu laterali sessili, foliis involucralibus conformibus a perianthio distantibus, perianthio clavato basi valde attenuato, apice margine compresso ventre bicarinato, dorso laevi vel obtuse unicarinato.

Synops. Hep. p. 767. n. 197 b.

Liebmann fandt denne Art paa Barken af et Træ i August paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') i Departementet Vera Cruz.

Caulis ad corticem arborum caespitose repens, stolones emittens et fibrillis radicibus longis praeditus, laxe cellulosus, flexuosus, irregulariter ramosus, ramis subadscendentibus. Folia subimbricata, ramorum distantia, subverticalia, ovato-rotunda et oblonga, concava, patula, nonnulla magis plana erecto-appressa vel subconniventia, integerrima, margine ventrali inflexa vel plana et basi aliquantum decurrentia, aut plane non aut in plicam minutam complicata, viridia, in caule fructifero et ramis minora. Amphigastria distantia, ovata, patula, ultra medium bifida, lacinias acuminatis incurviusculis. Fructus creberrimi, laterales, sessiles. Folia involucralia conformia, patentia, a perianthio distantia. Perianthium pro ratione plantae magnum, $\frac{1}{3}$ — $\frac{3}{8}$ lin. longum, clavatum, basi valde attenuata, teres, apice incrassato dilatato, margine compressum, ventre bicarinatum, dorso obtuse unicarinatum vel laeve, vetustiore statu nonnumquam latius obovatum.

Affinis *Lej. Lhotzkianae* *Hpe*, sed caule reptante, colore laete viridi, textura laxiore et amphigastriorum praesentia haud aegre distinguenda.

56. *Lejeunia cucullata* *Nees. ab Es.*

L. caule pusillo filiformi subpinnato repente parasitante, foliis verticalibus orbiculato-oblongis integerimis vel basi ventrali cellulis prominentibus crenulatis, basi producta cucullata inflata laevi sinu a lobo subjecto subaequali divisa, amphigastriis distantibus foliis multo minoribus ovalibus bifidis, fructu in ramis brevibus terminali vel in ramulorum basi sessili, foliis involucralibus conformibus planiusculis, perianthio emerso obovato compresso dorso obtuse carinato ventre convexo ad apicem acute bicarinato.

α, major, caule filiformi subpinnato semipollicari et majore, foliis adproximatis saepe contiguis lobulo suo vix dimidio majoribus rotundatis, lobulo ad sinum unidentato.

Synops. Hep. p. 389. n. 198.

Hovedformen fandt Liebmann voxende sammen med andre Hepaticae paa Plantagen Hacienda de Mirador i Marts 1842 (n. 67, 101, 130, 370, 580).

Cum exemplaribus Mexicanis caream, accuratius hanc formam cum exemplaribus Javanicis originalibus denuo comparare nequeo.

57. *Lejeunia diversifolia* *Gott sche.*

L. corticicola, caule filiformi inordinate ramoso, foliis verticalibus contiguis ovalibus ovatisve pellucidis integerrimis, majoribus magnilobulatis cum minoribus fere elobulatis promiscue in uno eodemque ramulo provenientibus, lobulo magno inflato apice retuso anguloque libero in dentem producto plerumque versus folii cavitatem reflexum, vel lobulo minutissimo subquadrato apice exciso-unidentato, amphigastriis caule paullo latioribus ultra medium bifidis, laciniis angustis sinu latoe rotundo (hic inde obsoletis), fructu laterali, foliis involucralibus multo majoribus subconformibus lobulo explicato oblongo acutiusculo, amphigastrio laciniis lanceolatis acutis bifido, perianthio . . . Gottsche Icon. Hep. inedit.

Lejeunia cucullata ♂ stricta Synops. Hep. p. 767. n. 198. var. ♂.

β, *ambigua*, foliis paullo latioribus lobuloque minus inflato, amphigastriis rotundioribus laciniis latioribus, involucro minore, amphigastrio involucrali laciniis lanceolatis acutis bifido. (Hb. Liebmann. n. 120. ex parte).

Liebmann samlede begge Former paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') i Marts, Hovedformen kun i Blomst (Hb. Liebm. n. 50. e. p.).

Caules semipollicares, ramulos trilineares et ultra sine ordine producentes, siccii strictiorum habitum prae se ferentes. Folia forma variabili modo lobulum minutissimum, modo magnum inflatum ostendunt, qui in nonnullis disci folii dimidium nondum attingit, in aliis, praesertim si explicatur, discum totum aequat. Amphigastria remota, caule aut non aut paullo tantum latiora, ultra medium bifida, sinu rotundo obtuso plerumque interjecto, laciniis 2 cellulas latitudine, 3 cellulas altitudine ostendentibus, interdum rudimentaria vel obsoleta. Folia involucralia caulinis multo majora, lobulus dorsalis apice rotundo obtuso, sed angustiore quam in *Lej. cucullata* Javanica gaudet, lobulus oblongus apice obtuso-lanceolatus; amphigastrium involucrale aequae longum ac folia, bifidum, laciniis lanceolato-acuminatis.

Differt a *Lejeunia cucullata* forma foliorum et amphigastriorum tam caulinorum quam involucralium, textura clariore et tota ramificatione. *Lejeunia crenulifolia* G. ex insula Trinitatis, foliorum forma accedens, foliis margine crenulatis diversa est.

58. *Lejeunia unidentata* *Lehm. et Lindbg.*

L. caule repente caespitoso irregulariter pinnatim decomposito, foliis imbricatis semiverticalibus orbiculatis integerrimis subtus subsinuato-complicatis, lobulo maximo ovali in folii marginem subtranseunte subtruncato subunitentato, amphigastriis ad singula folia dispositis imbricatis obtriangularibus profunde bifidis lacinis ovatis obtusiusculis subdivergentibus, fructu laterali sessili, foliis involucralibus conformibus subacuminatis, amphigastrio ovato breviter bifido lobis obtusis, perianthio oblongo compresso acute pentagono carinis latiusculis.

Synops. Hep. p. 392 et 768. n. 203.

Liebmann fandt denne Art i Departementet Vera Cruz i Nærheden af Santa Maria Tlapacoyo paa Hacienda de Jovo (1800—2000') paa et Blad af Vanilla sylvestris i April 1841 (Hb. Liebm. n. 409. e. p.).

59. *Lejeunia marginata* *Lehm. et Lindbg.*

L. caule repente ramoso adplanato, foliis imbricatis subverticalibus cordato-orbiculatis integerrimis basi subtus late complicatis, lobulo planiusculo magno integerrimo unidentato et subbidentato, patellis suctoriis ovatis margine radicellis ornatis in ventre caulis juxta singula folia positis, fructu

Synops. Hep. p. 393. n. 207 (reformat.).

β , *Liebmanniana*, foliis ovalibus ($\frac{1}{3}$ lin. longis, $\frac{1}{4}$ lin. latis) plerisque apice cellulatis hyalinis elongatis coronatis, lobulo magno planiusculo subbidentato, perianthio obcordato subcompresso, ventre obtuse unicarinato (maturo $\frac{1}{3}$ lin. longo, $\frac{1}{4}$ lin. lato). Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Liebmann samlede denne Form med flere andre Lejeunier paa forskjellige Blade paa Plantagen Mirador.

Icon nostra in Synopsi Hepaticarum citata secundum plantam in folio exotico una cum *Lejeunia trematode* crescentem Herbarii Neesiani delineata est. Folia hujus exemplaris margine hyalino e cellulatis oblongis majoribus confecto circumdata sunt; lobulus magnus apice libero inter marginem ventralem et dentem angularem prominentiam plus minus notabilem ostendit, saepius etiam alteram pone dentem angularem in margine libero habet. In nostra forma β (et eandem conditionem invenio in planta Venezuelana) apex lobuli magis contractus est et dens ibi conspicitur, ubi prominentia primaria inter marginem ventralem et dentem angularem in α sita est; prominentia pone dentem quoque adest.

Crescit unā cum insequente specie, sed foliorum forma et lobulo majore aliterque conformato plerumque satis diversa videtur; negari tamen nequit, hanc plantam saepius formam alienam vel mixtam ostendere, quae transitum ad speciem sequentem parat.

60. *Lejeunia cardiocarpa* Mont.

L. caule repente vage ramoso, ramis confertis brevibus, foliis subhorizontalibus ovato-oblongis contiguis aut subimbricatis planis basi subtus inflexo-complicatis, lobulo angusto vel rotundato, apice crispato-palmulatis, amphigastriis obsoletis, perianthio sublateralis late obcordato pentagono, capsula ovata.

Synops. Hep. p. 394 et 768. n. 209.

β . *Liebmanniana*. Forma intermedia inter *Lej. marginatam* et *cardiocarpam*.

Liebmann samlede disse Planter paa Blade af Amonum, Melastoma og Magnolia Arter i Departementet Vera Cruz i Nærheden af Santa Maria Tlapacoyo paa Plantagen Hacienda de Jovo (1800—2000') og paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') omkring i Skovene. (Hb. Liebm. n. 179. 246 e. p., 573.)

61. *Lejeunia Brasiliensis* Gottsche.

L. caule repente subpinnato rigidiusculo, foliis imbricatis oblique ovatis subacuminatis apiculatisve inflexis ad apicem apiceque ipso inaequaliter serrato-spinulosis, basi complicatis lobulo parvo subtruncato, amphigastriis magnis subimbricatis cordatis margine repando-subdenticulatis ad tertiam partem bifidis laciniis acutis, fructu in basi ramulorum sessili, involucro grosse serrato, perianthiis obovato-obconicis apice tetragonis quadricornibus, cornibus longioribus divergentibus.

β , colore dilutiore, foliis inflexis apice serrato-dentatis, amphigastriis ovali-rotundis laciniis obtusis, perianthiis evidenter tetragonis cornibus longis reflexis. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 398. n. 217.

γ , *minor*, colore brunneo, amphigastriis ovali-rotundis planis integerrimis minoribus, perianthio breviore medio inflato cornibus brevioribus divergentibus. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 468. n. 217.

Liebmānn fandt denne Art paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador i Marts

1842. Varieteten β blev samlet under n. 35, 79 b, 91, 302 (med mellemliggende Former), og Varieteten γ under n. 94, 211, 217, 223. e. p.)

Formae paullo inter se variantes, maxime foliis majoribus et perianthii cornibus longioribus altera ab altera diversa, fere pollicares, $\frac{3}{5}$ lin. latae in statu humido. Folia ovali-acuta $\frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{3}{10}$ lin. lata, apice angulato-repando-reflexa; amphigastria (n. 35) $\frac{3}{10}$ lin. lata, parte longissima $\frac{1}{3}$ lin. longa, medio propter incisuram apicalem et basalem $\frac{1}{5}$ lin. longa; in var. γ (n. 211) $\frac{4}{15}$ lin. lata, parte altissima $\frac{1}{4}$ — $\frac{4}{15}$ lin. longa, medio $\frac{2}{15}$ — $\frac{1}{6}$ lin. aequantia. Folia involucralia in β $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{3}{10}$ lin. lata; lobulus $\frac{1}{4}$ lin. altus, $\frac{1}{5}$ lin. latus; amphigastrium $\frac{2}{5}$ lin. altum, $\frac{1}{3}$ lin. latum. In varietate γ folia involucralia $\frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{3}{10}$ lin. lata, lobulus $\frac{1}{3}$ lin. longus, $\frac{2}{15}$ lin. latus, amphigastrium $\frac{1}{3}$ lin. longum, $\frac{7}{30}$ lin. latum. Perianthium $\frac{2}{5}$ lin. longum, medio parte latissima $\frac{1}{5}$ — $\frac{7}{30}$ lin. latum, cornua fere $\frac{1}{5}$ lin. aequantia.

62. *Lejeunia Guianensis* Nees. et Montgn.

L. caule procumbente repente rigidiusculo angusto vage ramoso ramisque curvatis, foliis imbricatis ovato-subrotundis obtusis apiceve subrepandis decurvatis integerrimis apiceve bicrenatis basi subtus cucullato-complicatis, lobulo inflato truncato, amphigastriis foliis multo minoribus distantibus rotundo-ovalibus ad tertiam partem anguste bifidis laciniis rectis acutis, fructu in ramulorum basi laterali, foliis involucralibus subserratis, perianthio obovato-ventricoso apice cornibus 4—5 breviter mucronato.

Synops. Hepat. p. 397. n. 213.

β . *Liebmanniana*, amphigastriis paullo majoribus, perianthii cornibus paullo longioribus.

Liebmann fandt denne Plante β paa Plantagen Zazuapan i November med enkelte Perianthier (Hb. Liebmann. n. 544 a, 536, 537 e. p.). Mere afvigende Former fandtes paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (n. 6 og 376) i ufrugbar Tilstand.

Has formas conjungendas esse beatus Lindenbergius quoque credidit, sed non ad amussim cum *Lejeunia Guianensi* in omnibus partibus conveniunt, exempli gratia n. 544, quae simillima, amphigastria paullo majora habet et in perianthiis paucis laesis, quae videre contigit, cornua longiora videntur quam in specie originali. Hanc plantam a grege reliquo tamquam varietatem β separavimus; plantae inter n. 536 et 537 steriles huic simillimae videntur. Magis distat n. 376 b., quam ad *L. ceratantham* referres, sed differt textura, foliis minus denticulatis apice subinflexis acutioribus, lobulo majore et amphigastriis minoribus. Huic similior est n. 16, sed folia non tam inflexa sunt.

63. *Lejeunia variabilis* *Lindbg.*

L. caule repente inordinatim subpinnatimve ramoso, ramis brevibus patentibus elongatisque subfasciculatis, foliis imbricatis subrotundo-ovatis decurvis obtusis acutis acuminateis integerrimis apiceve bi-tricrenatis pluridentatisque basi subdecurrente complicatis, lobulo et parvo truncato et magno turgido, amphigastriis vel magnis cordato-reniformibus contiguis vel minoribus remotiusculis cordato-ovatis integerrimis bifidis laciniis obtusis, fructu in ramulorum basi sessili, involucro serrato-dentato, perianthiis piriformibus quadri-quinquecornibus, cornibus longioribus vel erectis vel divergenti-reflexis.

$\beta.$ *minor*, foliis rotundatis vel integerrimis vel apice pluridentatis, amphigastriis plerisque cordatis, perianthiis ventricosis, cornibus subreflexis.

Liebmman samlede denne Form iblandt andre Hepaticae paa Plantagen Hacienda de Mirador (n. 70 e. p.) og omkring San Antonio de Huatusco i Marts uden Frugt.

Plantae steriles formam intermedium, ad *Lejeuniam cornutam* accendentem sistunt.

64. *Lejeunia elliptica* *Lehm. et Lindbg.*

L. caule arcte repente inordinate ramoso, foliis subhorizontalibus subdistantibus ellipticis planis integerrimis basi attenuata subtus breviter complicatis perforatis, lobulo subinflato saepe obsoleto, amphigastriis distantibus profunde bipartitis laciniis subulatis subdivergentibus integrisve, fructu laterali sessili, foliis involucralibus elongatis integerrimis, perianthio obovato superne 4—5-alato, alis plerumque in cornua elongatis.

Lindenberg in Lehmann nov. et min. cogn. stirp. Pug. V. 1833. p. 13. n. 13.

$\alpha.$ *confertior*, brevior, foliis approximatis subplanis latioribus ubique perforatis, amphigastriis obsoletis.

$\beta.$ *laxa*, foliis angustioribus remotis margine reflexis, areolis retis majoribus in stria media collocatis, amphigastriis conspicuis.

Synops. Hepat. p. 403 n. 229.

$\gamma.$ *fusca*, foliis minoribus obtusiusculis aequitextis et perforatis, amphigastriis saepe obsoletis.

Synops. Hepat. p. 769. n. 229.

Liebmman fandt disse Former paa forskjellige Blade paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') og ved Colipa (500—800') i Departementet Vera Cruz (Herb. Liebmman. α og β paa et Blad af *Trophis ramosa* (n. 73), af *Piper aduncum* (n. 108), af *Aralia* (n. 114), af *Guettarda* (n. 153), af *Ardisia* (n. 202), af *Rhamnus* (225), af *Ocotea*

(n. 226), af Misanteca (n. 230), af Piper spec. (n. 209 et 233), af Chamaedorea repens (n. 241). Var. ♂ voxer paa et Blad af Amonum (n. 206) og af Chamaedorea Sartorii (n. 207) og med Formen α og β (n. 73, 114, 153, 209, 246). Fra Colipa er n. 143. Alle disse Exemplarer blev samlede i Marts 1842 og i Januar 1843.

Duae formae satis diversae jam nudo oculo colore et lentis ope bene distinguuntur, quarum altera hyalina folia habet longiora et acutiora, altera fusca, magis ramosa, folia habet breviora et obtusiora et *Lejeuniae polyrhizae* simillima est (praesertim illa forma, quae apud Colipam collecta est). Sunt autem tam multae formae intermediae longitudine et apice foliorum nunc obtusiore nunc acutiore, colore et textura, ut rectius nobis videatur, omnes hac formas ad *Lejeuniam ellipticam* referre.

65. *Lejeunia stenophylla* Lindbg. et Gottsche.

L. arcte caule repente flexuoso inordinate ramoso, foliis remotiusculis semiverticalibus lanceolatis acutis integerrimis basi ventrali complicatis, lobulo inflato truncato-exciso, amphigastriis distantibus bipartitis laciniis subulatis divergenti-patentissimis, fructu in ramulo brevi e basi ramorum, foliis involucralibus patulis bilobis, lobo minore angusto acuto, perianthio obovato-piriformi ad apicem quadrangulari vel quinquangulari, angulis subcrenatis in cornua brevia divergentia productis.

Synops. Hep. p. 769. n. 229 b.

Liebmann samlede denne Plante tilligemed *Lejeunia elliptica* og flere andre smaa Lejeunier paa Blade i Skovene omkring Mirador i Marts 1842; paa Piper aduncum (n. 108), Ardisia (n. 202), Chamaedorea Sartorii et repens (207, 209), Aralia (114), Guettarda (153), Rhamnus (224), Ocotea (226), Magnolia (246).

Caules arcte ad folia repentes, 2—6-lineares, angusti, flexuosi, haustoriis et fibrillis plerumque ex amphigastriorum basi prodeuntibus affixae, irregulariter parce ramosi. Folia approximata vel remotiuscula, semiverticalia, lanceolata, $\frac{1}{4}$ lin. longa, ubi latissima sunt triplo angustiora, patentia, nonnulla (in primis statu sicco) heteromalla, acuta, integerrima vel rarius margine ventrali supra lobulum dente parvo instructa, inferiora planiuscula, superiora et ramulorum plurima margine reflexa subundulata, suprema saepius linearia, acuminata, basi subtus in lobulum complicata ovatum inflatum in folii marginem longius transeuntem introrsum truncato-excisedum. Color luteo-fuscescens. Compages crassiuscula, una alterave macula majore folia nonnulla perforata. Amphigastria distantia, minuta, bipartita, laciniis subulatis divergentibus. Fructus in basi ramorum pedicello brevi insidentes. Folia involucralia minora, perianthium ad tertiam partem tegentia, patula, biloba, lobulo

minore angusto acuto. Amphigastrium involucrale majusculum, appressum, bifidum, basi margine angulatum. Perianthium obovato-piriforme, dorso convexiusculum, $\frac{1}{3}$ lin. longum, ad apicem quadricarinatum, angulis compressis crenatis apice in cornua brevia divergentia productis.

66. *Lejeunia tenera* Swartz.

L. caule decumbente ramoso laxe, foliis distantibus horizontalibus oblique ovato-subrotundis decurrentibus flaccidis obtusis integerrimis subtus plica minutissima complicatis, amphigastriis remotis foliis triplo minoribus subrotundis integerrimis ad medium bifidis laciniis obtusiusculis, fructu

Synops. Hepat. p. 406. n. 235.

Liebmann samlede denne Plante i Nærheden af San Felipe del Agua (n. 56) og i Districtet Chinantla (n. 408, 224 b) uden Frugt.

Colore paullo magis saturato, foliis latioribus et rotundioribus, amphigastriis paullo majoribus differt a planta originali Swartzii; cum tamen utriusque plantae fructificatio adhuc lateat, in praesenti hanc nostram ad *Lejeunię teneram* Swartzii retulimus.

XXIV. *Frullania Raddi.* Synops. Hep. p. 408.

* Involucrum coalitum.

1. *Frullania gibbosa* Nees ab Es.

Fr. digyna dioeca, caule repente pinnatim bipinnatimve ramoso, pinnulis brevibus, foliis imbricatis orbiculatis repandis squarrosis, auriculis magnis confertis galeatis, stylo minore et disco basi interjectis, appendiculo parvo subquadrato obtuso obliquo basi haud producto, amphigastriis imbricatis suborbiculatis margine reflexis breviter acuteque emarginato-bidentatis, perianthiis ovato-prismaticis dorso convexiusculo carina ventrali bicostata, foliis involucralibus brevioribus bifidis integerrimis lobo ventrali acuto; inflorescentia mascula globosa, e perigoniorum 2—3 paribus, 2 antheridia in axillis foventium constituta.

Synops. Hepat. p. 411 et 770. n. 1.

$\beta.$ *major*, statura major, ceteroquin conformis.

Liebmann samlede denne Art (α) i Departementet Vera Cruz i Omegnen af Colipa (800') i Marts (Hb. Liebm. n. 147), og Fr. Müller fandt den (β) i Districtet Orizaba paa

Sierra de San Cristobal ved Ingenio paa kalkagtige Stene i October (Hb. Müller n. 2358), med Perianthier.

Plantae Müllerianae longitudine 3—4 pollic. speciosae. Semel perianthium ventre unicarinatum, sectione transversa triangulum lateribus concavis loco quadranguli ostendens, inveni. In foliis praeparatis cellulae disci plerumque hexagonales incrassationem angularem punctiformem ostendunt limbumque violaceum conjungentem, et si cellulae ictu inter se separantur, lora in angulis violacea descendentia ad limbum violaceum inferiorem optime videntur. Contignatio cellulae, ut ita dicam, ex annulo sexangulari superiore et inferiore, interjectis in angulis columellis sex, constat, quae praeparatione chemica violacea fit, unde elucet haec omnia incrassatione membranae secundariae confici; parietes laterales non colorati membrana primaria tantum obducuntur et sacci primordialis brachia ad meliorem cellularum inter se communionem excipiunt. Ubi brachia sacci primordialis apice magis dilatata sunt, cellularum adspectus elegantiā quadam distinguitur, e. gr. in basi foliorum, ubi cellulae mediae maiores sunt. Angulorum incrassatio in illis fortior magisque prominens, itaque forma nuclei substellaris appetit, sed potissimum elegantior adspectus in perianthii cellulis observatur, ubi nuclei cellularum (e membrana secundaria) in angulos acuminatos latiores protrahuntur formamque violaceam stellarem, 6—8—10 radios emitentem ostendunt, inter quos apex dilatatus sacci primordialis flavescentis prominens bene cognoscitur. Margo folii cellulis quinquangularibus transversis majoribus constat, quae versus basin diminuuntur. Folium basi dorsali in lobulum linguaeformem protrahitur, basi ventrali in lobulum cucullatum complicatur. Tubulus perianthii cellulis longioribus curvatis intus libere prominentibus clauditur. Capsula e duobus stratis conficitur; stratum externum cellulis quadratis parietibus valde incrassatis, ut in *Bryopteride filicina*, constituitur, sed stratum internum, cellulis tenerioribus subviolaceo-tinctis (in exemplaribus praeparatis) compositum, fibris reticulatis carere videtur. Semina ovali-angulata, fusca; sporodermis verruculis bruneis, quemadmodum in *Frullania dilatata*, consita.

Inflorescentia mascula in distincto individuo, terminalis in ramulo pusillo, globosa, e 2—3 paribus foliorum perigonialium, adjectis amphigastriis, componitur. In quaque axilla invenio plerumque duo antheridia, alterum altero magis excultum, stipiti longiori quam pollinarium ipsum incidentia.

2. *Frullania Sebastianopolitana* Lindbg.

Fr. digyna monoeca, caule repente pinnatim decomposito, foliis imbricatis suborbiculatis integerrimis, auricula galeiformi lunata in rostrum longius producta; stylo et disculo (interdum majore vel subnullo) interjectis appendiculo ovato-rotundo deorsum pro-

ducto integerrimo, amphigastriis foliis duplo minoribus rotundis integerrimis breviter emarginatis sinu acuto obtusove dentibusque acutis, fructu in ramis lateralibus, foliis involucralibus perianthium subaequantibus bifidis acutis integerrimis (rarissime subserratis) perianthio oblongo dorso uni-, ventre bicarinato, carina dorsali superne bitriplicato; inflorescentia mascula ovali e 4—5 paribus foliorum perigonialium, adjectis amphigastriis, composita.

Synops. Hep. p. 412 et 771. n. 4.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Vera Cruz i Skovene omkring Sta Maria Tlapacoyo (2—3000') og paa Sartorius's Plantage Mirador (3000') i Mai med ♂ Blomst og Perianthier. (Hb. Liebmann. n. 20, 570 et 578).

Folia praesertim juniora versus apicem cellulas angulis et in medio pariete incrassatas ostendunt, unde cellulae cavum crenulatum appareat, basi incrassatio angularis fortior; quae omnia in foliis praeparatis multo elegantius conspiciuntur. Margo folii cellulis quinquangularibus constituitur. Textura amphigastriorum et perianthii eadem, nucleus violaceus substellaris. Tubulus perianthii cellulis intus libere prominentibus (minoribus quam in specie praecedenti) clauditur. Capsula e duobus stratis componitur. Semina fusca, tuberculis bruneis consita.

3. *Frullania arietina Tayl.*

Fr. digyna, caule repente irregulariter subfasciculatimque ramoso, foliis imbricatis rotundatis planis integerrimis, auricula foliorum inferiorum galeata lunato-rostrata longe appendiculata, appendiculo repando deorsum producto, superiorum rameorumque plurium triangulari-lanceolata acuta margine revoluta, stylo parvo et disculo (interdum obsoleto) interjectis, amphigastriis suborbiculatis emarginato-bifidis laciniis acutis erectiusculis, fructu in ramulis majoribus terminali, foliis involucralibus amphigastrioque a medio patentibus bifidis laciniis acutiusculis serrulatis (rarius integerrimis), perianthio oblongo dorso bi-tricarinato bisulcatoque ventris carina bialata.

Synops. Hepat. p. 413 et 771. n. 5.

Liebmann fandt denne Plante i Nærheden af Colipa (800') i Departementet Vera Cruz (Hb. Liebmann. n. 146 c.? et 148) med Perianthier i Marts.

Exemplaria a Liebmann collecta quibusdam notis ad *Frullaniam Sebastianopolitanam* accedunt, plerisque vero cum *Frullania arietina* originali convenient.

4. *Frullania Ecklonii Spreng.*

Fr. digyna, caule repente pinnatim ramoso, foliis imbricatis orbiculatis integerrimis, auricula magna galeata oblique truncata subdenudata styloque parvo interjecto, appendiculo basi angustato integerrimo, amphigastriis cordato-rotundis integerrimis vel subrepandis sinu obtuso breviter emarginato-bidentatis, fructu in ramis ramulisque terminali, foliis involucralibus cum amphigastrio coalitis bifidis laciniis acutis (dorsali subserrato), perianthio oblongo vix emergente pluricarinato; inflorescentia mascula ovali, e 4—5 paribus foliorum perigonialium, in axilla plerumque 3 antheridia longe pedicellata habentium, constituta.

α. robustior, foliis latioribus, involucralibus apice longius dentatis, auriculis majoribus.

Synops. Hepat. p. 413 et 771. n. 6.

β. Huitamalcensis, Jungermanniae Arecae Spreng. simillima.

Liebmann fandt Hovedformen i de dybe Urskove, som bedække Siderne af Cerro de Sempoaltepec (Hb. Liebmann. n. 200 d), og Varieteten *β* ved Huitamalco (2500—3000') i Departementet Vera Cruz (Hb. Liebmann. n. 443).

Exemplaria originalia *Frullaniae Ecklonii* Sprengelii conveniunt cum *Frullania Mundiana* Synops. Hep. p. 772, unde patet, Sprengelium merito *Jungermanniam Ecklonii* et *Jungermanniam Arecae* diversas habuisse; *Frullaniam Mundianam* denuo a nobis separatam, nomine originali *Frull. Ecklonii* salutare et *Frullaniam Ecklonii* Synopseos *Frullaniam Arecae* nominare rectius fuisset; sed quo tempore Lindenbergius mecum genus *Frullaniae* conscripsit, nondum sciebamus, *Frullaniam Mundianam* nostram ipsissimam *Jungermanniam Ecklonii* Sprengelii sistere.

Foliorum textura fere eadem, quae in *Frullania gibbosa*, sc. incrassatio cellularum punctiformis angularis et parietalis media, unde nuclei violacei cellularum majorum basarium stellarem speciem induunt. Cellulae marginales quinquangulares, sed vicinis magnitudine aequales, unde folia non tam marginata apparent. Perianthium cellularum nucleus magis stellatum in exemplaribus praeparatis ostendit et tubulus apicis interne cellulis prominentibus coarctatur postremo, si non clauditur. Sectio transversa perianthii 12 plicas prominentes monstrabat. Capsula ex duabus stratis componitur; stratum externum cellulis majoribus quadratis, punctis 4—6—8 grossis incrassatis notatis (in exemplaribus praeparatis violaceis), constituitur; stratum interius cellulis inaequalibus tenerioribus fuscescentibus sine fibris incrassatis constat, quibus fines elaterum inhaerent. Semina fusca ovali-angulata, verruculis bruneis consita, fere ut in *Frullania dilatata*.

Inflorescentia mascula in distincti individui ramulis propriis brevibus ovalibus; folia perigonalia antheridia 3 longe pedicellata in gremio plerumque habebant.

5. *Frullania hians Lindbg. et Lehm.*

Fr. digyna monoeca, caule pinnatum decomposito, foliis imbricatis rotundis integerimis margine ventrali subundulatis, auricula fornicata lunata appendiculo magno undulato-crispo styloque parvo interjecto, amphigastriis contiguis orbiculatis magnis margine undulato-crenulatis sinu obtuso brevissime emarginato-bidentatis, fructu in ramis ramulisque terminali, foliis involucralibus cum amphigastrio coalitis bifidis, lobulo dorsali acuto inciso-serrato, ventrali longe acuminato-subulato margine reflexo, perianthio vix involucrum superante oblongo dorso et ventre pluricarinato.

Synops. Hepat. p. 414. n. 7.

β , foliis involucralibus minus dentatis (interdum dentibus 2—3 tantum armatis), caulinis et amphigastriis plerisque valde undulato-crispis.

Synops. Hepat. p. 772. n. 7.

γ , *conferta*, foliis et auriculis densioribus, his lunulatis, foliis margine ventrali amphigastriisque subintegerrimis, involucralibus serrato-dentatis.

Synops. Hepat. p. 772. n. 7.

Hovedformen fandt Schiede ved Jalapa, Varieteten α og γ samlede Leibold, sandsynligviis paa Plantagen Zacuapan (2500—3000'), Varieteten α fandt Liebmann (n. 210) paa Hacienda de Mirador (3000') i Marts, og ved Huitamalco i Mai (n. 452), β i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca i Mai (n. 430 c) og en Mellemform ved La Foya i Juli (n. 518); en liden Form, maaskee ikke udvoxen, fandtes paa Plantagen Mirador (n. 493 b). Frederik Müller samlede den i Districtet Orizaba, paa Bjergkjeden Sierra de San Cristobal, ved Aserradero de Santa Cruz og ved Borrejo i August med Perianthier.

Foliorum textura fere eadem, quae in *Fr. Ecklonii*, scil. incrassatio cellularum angularis punctiformis et parietalis media, sed margo folii cellulis obtuse quinquangularibus aequemagnis constituitur. Perianthium cellulas nucleo membranae secundariae violaceo magis stellatas ostendit. Capsula e duobus stratis componitur; exterius cellulis quadrangularibus punctis grossis prope parietes 4—8 incrassatis notatis constituitur; stratum interius tenerius cellululas fibris angustis rectiformibus percursas, quibus inhaerent elateres, monstrat. Semina ovali-angulata, fusca, tuberculis bruneis verruculosis consita.

Inflorescentiam masculam in eadem stirpe cum perianthiis inveni, lateralem, ovali-globosam, e quinque paribus foliorum perigonialium compositam, et in cujusque perigonii axilla antheridia bina pedicellis longioribus fulta. Amphigastria tantum in basi inveniuntur, deinde angustiora fiunt et postremo omnino evanescunt. Inflorescentias masculares longiores videre non contigit, sed punctum vegetationis nondum exhaustum videbatur in nostris exemplaribus.

6. *Frullania squarrosa* Nees ab Es.

Fr. digyna dioeca, caule procumbente pinnatim ramoso decompositoque, foliis subverticalibus confertis squarroso-patulis suborbiculatis obtusis integerrimis, auriculis obovato-cucullatis aut galeatis compressiusculis (rarius in lobulum ovato-lanceolatum evolutis) profunde discretis styloque parvo interjecto, amphigastriis cordatis rotundisve sinuato-subdentatis breviter emarginato-bifidis laciniis acutis subconniventibus, fructu in ramulo laterali brevi, involuci lobulo amphigastrioque ab altero latere coalito subdentato-lacinulatis, perianthio oblongo prismatico-triquetro dorso convexo medio leviter sulcato ventre alte unicarinato carina angulisque papillis conicis tuberculato.

Synops. Hepat. p. 416. n. 10.

Maximopere variat haec species, perianthio fere laevi, margine carinisque magis minusve crenato-tuberculatis et tota superficie fere tuberculato-villosis, foliis brevioribus longioribusve. Tres praesertim formae distinguuntur, intermediis vero connexae:

- α , *vulgaris*, robustior, perianthiis carina angulisque evidentius tuberculatis;
- β , *laevior*, perianthiis laevis una alterave lacinula vel papilla solummodo margine instructis;
- β^* , *Mülleri*, forma intermedia, foliis confertioribus margine ventrali latius inflexis;
- γ , *laxa*, caule elongato, foliis magis distantibus, amphigastriorum laciniis obtusiusculis, perianthiis carina angulisque minute tuberculatis;
- γ^* , *gracilior*, ad *Frullaniam ericoidem* quodammodo accedens. (Hb. Liebm. n. 493).

Liebmann fandt Hovedformen α paa Vulkanen Pico de Orizaba (n. 389 ♀ og ♂) og i Chinantla; Varieteten β (n. 593) ved Ranchoen Cabrestos ved Rio Nautla (Departem. Vera Cruz) i en Baranka neppe 500 Fod over Havet; Varieteten γ i Districtet Chinantla (n. 430), og γ^* i Nærheden af Hacienda de Mirador (n. 493). Varieteten α og β samlede Leibold ligeledes sandsynligvis i Nærheden af Plantagen Zazuapan. Fred. Müller fandt den i Districtet Orizaba paa Bjergkjeden Sierra de San Cristobal i Januar med Perianthier, ved Borrejo i Juni ♂ og ♀, og ved Escumala i Juli ligeledes med Perianthier, og desuden en Mellemform (β^* Müller). (Hb. Müller. n. 2343.)

Folia praeparata cellulas angulis et medio pariete incrassatas ostendunt, unde nucleus violaceus stellatam figuram habet, quod versus folii basin augetur et praesertim in perianthii parte inferiore elegantissime eluet; eadem structuram etiam amphigastria habent. Tubulus perianthii interne laevis nec cellulis libere prominentibus exasperatur. Capsula e duabus stratis componitur; stratum alterum interius e cellulis tenerioribus constans flave-

scentibus, quibus inhaerent elateres annulis fuscis, nec sine attenuato. Cum hisce annulis fibra spiralis elaterum conjuncta est. In cellulis hujus strati versus basin capsulae nunquam fibram reticulatam invenire potui, sed versus apicem valvularum fortissimae lentes praeter parietum incrassationem fibram reticulatam demonstrare videntur. Stratum exterius cellulis majoribus validioribusque 4—5—6-angularibus constitutum, prope parietes puncta grossa incrassata 4, 6, 8 et ultra, saturatius violacea, columnarum ad instar cellularum lacunaria fulcientia ostendit. Semina majora, ovali-angulata, fusca; sporodermis verruculis multis bruneis consita.

Planta mascula plerumque inflorescentias masculas uberrime proferens globosas, si juniores sunt, dein in spicas cylindricas subcompressas sesquilineares excrescentes, e paribus 16—20 foliorum perigonialium compositas; interdum hae spicae apice in ramum novellum transeunt, in quo 5 inflorescentias masculas alternantes numeravi. In gremio cujusque perigonii antheridia duo pedicellata inveni Amphigastria tantum in basi nonnulla (2—3) inveniuntur, in ipsa spica evanescunt.

7. *Frullania ericoides* Nees ab Es.

Fr. digyna, caule procumbente pinnatim ramoso decompositoque, foliis imbricatis subverticalibus squarroso-patulis ovato-oblongis auriculis plerisque in lobulum ovalem aut ovato-lanceolatum evolutis marginibus reflexis interjectoque stylo parvo, amphigastriis ovatis vel obovatis margine angulato-dentatis usque ad medium acute bifidis, fructu in ramulo laterali brevi, perianthio oblongo tuberculato ventre leviter carinato, foliorum involucralium lobulo ventrali amphigastrioque margine dentatis.

Synops. Hepat. p. 417. n. 11.

α^* auriculis foliorum omnibus fere galeato-cucullatis, ceteris notis omnino conveniens formae vulgari.

Synops. Hepat. p. 773. n. 11.

Liebmann samlede denne Plante paa Hacienda de Mirador og imellem La Isleta et Maloapam (Hb. Liebmann. n. 2 et 419) i Marts (δ et δ).

8. *Frullania aeolotis* Nees ab Es.

Fr. digyna, caule procumbente irregulatiter vage ramoso subpinnatove, foliis semi-verticalibus subsquarrosois oblique cordato-orbiculatis ovalisque, auriculis vel galeiformibus vel in lobulum ovato-lanceolatum canaliculatum evolutis styloque parvo interjecto, amphigastriis ovatis obovatisque integerrimis vel margine superne angulato-dentatis acute bifidis,

involueri lobulo ventrali acuto margine ab altera parte hinc lacinulato, amphigastrio bifido laciinis integerrimis vel margine subdentatis, perianthio . . . (nimis juvenili).

Synops. Hepat. p. 417 et 773. n. 12.

Liebmann fandt denne Plante i Nærheden af Hacienda de Mirador og imellem La Isleta og Maloapam i Departementet Vera Cruz uden Frugt.

** Involucrum haud coalitum.

9. *Frullania semivillosa* Lindbg. et Gottsche.

Fr. tetragna, caule repente inordinate ramoso, ramis brevibus iterum pinnatis fasciculatis, foliis ovatis concavis arcte imbricatis integerrimis, auriculis galeatis conico-oblongis subcompressis (floralibus tantum evolutis), amphigastriis ovato-quadratis bifidis margine angulato-crenatis subunidentatisve (floralibus ciliato-dentatis), perianthio semiimmerso triangulari angulis carinaque cilia recurvata habente ventre semivilloso, foliis involucralibus bilobis, dorsali lobo ovali, lobulo ventrali ovato-lanceolato intus lacinula denticulata aucto subdentato, amphigastrio involucrali laciniato-dentato. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

? β *glabra*, perianthio (juniore) carina et angulis ciliis subrectis armato, ventre glabro, foliis involucralibus et amphigastrio magis denticulatis.

Synops. Hepat. p. 774. n. 20 b.

Liebmann fandt begge Former i Nærheden af Hacienda de Mirador i Marts.

Diffrerit stirps originalis (α) a *Frullania Hilariana* Mont. (Sylloge p. 87. n. 268), ad quam denticulatione perianthii accedit, laciniæ magis exultæ lobuli folii involucralis aequæ atque amphigastrio bifido lobis laciniato-dentatis et praesertim perianthio ventre inferne semivilloso. A *Frullania Lindbergiana* G.*), quae perianthii conditione et amphigastriis simillima est, differt statura minore, habitu et auricularum conformatione.

*)

Frullania Lindbergiana G.

Fr. caule repente inordinate ramoso, ramis elongatis flexuosis laxe subpinnatis, foliis subrotundis imbricatis integerrimis, auriculis cylindricis majoribus fere $\frac{2}{3}$ altitudinis folii attingentibus caule paullo latioribus eique parallelis (rarius in ramulis explicatis) styloque interjecto subulato ei conjunctis, amphigastriis ovali-obcuneatis bifidis, margine angulato-dentatis medio tuberculato-gibbis, perianthio ovato-triquetro dorso et ventre marginibusque ciliis curvatis laciniisque viloso; foliis involucralibus majoribus, lobo dorsali elongato-ovato margine repando-crenato (rarius apiculato) toto ventrali magnitudine subaequali ovato-lanceolato margine externo uno alterove dente, interno laciniis 1—3 dentiformibus praedito, amphigastrio aequæ magno ovato-elongato ad medium fere bifido marginibus parce laciniato-dentatis. Gottsche Icon. Hep. inedit.

In Brasilia apud Caldas (G. A. Lindberg) et prope Petropolin collecta.

Plantae sub n. 373 collectae, ramos fere $\frac{3}{4}$ poll. longos et cum ramificatione expansa $\frac{1}{2}$ poll. latos habent, cortici arctius irrepunt, ut planta tota non sine laesione solvi possit. Folia fere $\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ lin. parte latissima aequantia, margine levissime subrepanda, basi auriculam conico-cylindricam, galeiformem, $\frac{1}{6}$ lin. longam, basi $\frac{1}{8}$ lin. latam styloque intermedio $\frac{1}{20}$ lin. longo cum caule conjunctam ostendunt. Amphigastria minutam auricularum partem tegentia, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{6}$ lin. metiuntur.

Folia involucralia majora, lobum dorsalem ovalem fere $\frac{1}{2}$ lin. longum et parte latissima $\frac{1}{3}$ lin. latum, lobulum ventrale ovato-triangularem $\frac{1}{2}$ lin. longum, $\frac{1}{4}$ lin. latum ostendunt; lobus dorsalis integerrimus, ventralis lanceolatus, acuminatus, ad basin versus externe denticulis nonnullis armatus, interne lobulo (sc. stylo intermedio foliorum caulinorum) pluridentato auctus. Amphigastrium involucrale $\frac{1}{2}$ lin. longum, $\frac{1}{4}$ lin. latum bifidum, margine laciniato-dentatum. Perianthium apice tantummodo emergens, $\frac{3}{5}$ lin. longum, $\frac{1}{4}$ lin. latum, obovatum, margine et carina ventrali dentibus vel ciliis brevibus ($\frac{1}{15}$ lin.) incurvis articulatis 5—9 cellulas longis praeditum, maxime basi ventrali ciliis similibus curvatis subvillosum, dorso parum elevatum basi plerumque ciliis nonnullis hispidulum.

Forma β perianthium basi ventrali magis glabrum, ceteroquin conforme monstrat; amphigastrium et folia involucralia lobulo paullo magis dentata. Folia caulina paullo majora, rotundiora, $\frac{1}{2}$ lin. longa, fere aequa lata; auricula $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{5}$ lin. basi lata.

Folia cocta et tincta marginem latiorem album linea (sc. finibus cellulæ) percursum inter areolarum nucleos violaceos, qui e cellulis ejici possunt, ostendunt, nec a vulgari Frullaniarum typo, quod ad cellularum confectionem pertinet, recedunt.

10. *Frullania Mexicana Lindbg.*

Fr. caule repente laxo dichotomo-divaricato, foliis imbricatis oblique orbiculatis convexis basi complicata in auriculam transeuntibus magnam cucullato-galeatam compressiusculam, amphigastriis parvis ovatis medio cauli adnatis apice patulis emarginato-bifidis laciniis obtusis, foliis involucralibus patentи-divergentibus, perianthio oblongo compresso dorso et ventre pluri- (plerumque tri-) carinato laevi.

Synops. Hepat. p. 425. n. 29.

Denne Plante fandtes i Mexico paa Gaylussacia buxifolia.

Frullaniae Eboracensi similis, sed ramificatione, auriculis maximis foliis connexis, amphigastriorum laciniis patulis obtusis, involucro patente et perianthii forma facile distingueda.

11. *Frullania Hutchinsiae Nees ab Es.*

Fr. digyna, subpinnatim ramosa, sub fructu divergenti-furcata, foliis ovatis acutis dentato-serratis (subintegerimis), auricula marginali ovata externe calcarata, involucralibus bifidis serratis, amphigastriis subrotundis planis bifidis subserratis, perianthio ob innovationes ad speciem dichotomiae imposito oblongo compresso ventre unicarinato laevi.

Synops. Hepat. p. 426. n. 32.

β , *Mexicana*, auriculis rarissime calcaratis minoribus, foliis uni-bispinosis (rarius pluridentatis qualis in specie *Anglica*).

Synops. Hepat. p. 775. n. 32.

Liebmann fandt denne Art i Departementet Vera Cruz paa Plantagen Hacienda de Jovo (1800—2000') uden Frugt i Mai. (Hb. Liebmann. n. 575 et 579 b.)

Foliorum textura vulgaris; cellularum incrassatio nulla; in foliis coctis cuticula folii subgranulosa sub lentibus fortissimis appareat.

12. *Frullania semiconnata Lindbg. et Gottsche.*

Fr. monoeca, caule procumbente irregulariter pinnato, foliis contiguis vel imbricatis suborbiculatis convexis margine subinflexis in auriculam basi sinuato-complicatis galeatam oblique truncatam stylo parvo subuliformi interjecto, amphigastriis magnis late ovato-rotundis vel obovato-decurrentibus emarginato-bidentulis sinu dentibusqne obtusis et acutis, fructu in ramis ramulisque terminali, foliis involucralibus patentibus utrinque amphigastrio coalitis, perianthio elongato dorso laevi, ventre bicarinato. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 776. n. 38 b.

α . foliis imbricatis;

β . laxior;

γ . tenella.

Liebmann samlede denne Plante i Districtet Chinantla blandt andre Hepaticae. (Hb. Liebmann. n. 430.)

Rami primarii sesquipollicares, innovationibus interdum geniculati. Folia in caule sicco contigua, saepe in ramis alternatim contigua, in ramis fertilibus magis imbricata, suborbiculata, vel brevi-ovata, sordide viridia, $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. alta, basi ventrali in cucullum galeatum deorsum hiantem et stylo parvo triangulari cum caule conjunctum trans-euntia; auriculae $\frac{1}{10}$ lin. latae, $\frac{1}{8}$ lin. fere altae. Amphigastria fere $\frac{1}{3}$ lin. parte latissima

lata, $\frac{1}{4}$ lin. alta, media gibbositate elongata, basi plica utrinque notata. Involucrum vel omnino coalitum, vel folium et amphigastrium perichaetiale saltem. Lobus dorsalis folii $\frac{3}{5}$ lin. longus, $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ lin. latus, ovalis, apice acutio, interdum apiculato, integerrimus; ventralis aequa longus triangularis, plerumque utrinque margine convolutus, basi lacinia dentiformi (quae stylus est foliorum caulinorum) auctus, cum amphigastrio involucrali late ($\frac{1}{4}$ lin.) coalitus. Amphigastrium involucrale $\frac{2}{5}$ lin. longum, loco concretionis $\frac{1}{4}$ lin. latum, brevi bifidum ($\frac{1}{10}$ lin., semel inveni semilunariter excisum) subintegerrimum. Perianthium prismaticum, 1 lin. et quod excurrit longum, quadrangulum, dorso subdepressum vel ad apicem versus media carina parum prominentem ornatum; tubulus apicis cellulis prominulis fatus, ut in *Frullania gibbosa*. In foliis coctis et tinctis cellularum imago splendida, cum membrana secundaria a primaria soluta in nucleus violaceum angulis prominulis stellatum contrahatur, qui levi ictu e cellula nunc membranâ hyalinâ primariâ tantum constituta ejici potest; in cellulis longioribus basalibus ad 10 nuclei prominentias spiniformes numeravi. Ex hisce prominentiis pendet, quod cellularum margo etiam in foliis non praeparatis speciem quasi subcrenulatam prae se fert.

Differt a *Frullania trinervi* & *elongata* statura majore, foliis majoribus rotundioribus (dum *Fr. trinervis* folia magis obovata habet), auriculis latius in folium transeuntibus, amphigastriis majoribus minus profunde divisis, involucro majore et folii involucralis lobo dorsali aliter conformato; a *Frullania tetraptera* differt statura majore, foliis planioribus majoribus minus acuminatis (apice sc. magis rotundis) et involucro.

13. *Frullania turfosa* Lindbg. et Gottsche.

Fr. caule repente bipinnato gracili, foliis orbiculatis obtusis rarius apiculatis integerrimis, auriculis denudatis cylindricis a caule distantibus eidemque parallelis vel obliquis (lamina minuta dentiformi inter caulem et auriculam interjecta) rarissime lanceolatis evolutis acutis amphigastriis distantibus parvis orbiculatis ovatisve integerrimis bifidis laciinis acutis, foliis amphigastrioque involucralibus bifidis acutis grosse serrato-dentatis, perianthio exerto oblongo ventre unicarinato. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 779. n. 71 b.

Liebmann fandt denne Art paa Træer i Omegnen af Hacienda de Mirador (3000').

Simillima *Frullaniae gymnoti*, a qua differt involucri foliis magis serratis et lobo dorsali quoque serrato, perianthio longiore. Auriculae explanatae rariores. Sed quamvis a stirpe originali Montagnei hisce characteribus distingui possit, tamen tacere nolo, jam in Hb. meo formam exstare e Surinamo, quae viam conjunctionis quasi paret, et tempus docebit, utrum nostra *Frullania turfosa* tamquam varietas serrata *Frullaniae gymnoti* adjungenda sit necne.

Perianthium $\frac{1}{2}$ lin. longum, $\frac{1}{4}$ lin. latum; folia involucralia $\frac{2}{5}$ lin. longa, amphigastrium involucrale $\frac{1}{3}$ lin. longum. Folia caulina $\frac{1}{6}$ lin. longa, $\frac{1}{8}$ lin. lata; stirps cum foliis in statu humido $\frac{1}{3}$ lin. lata.

14. *Frullania Lindenbergii Gottsche.*

Fr. monoeca, digyna, caule bipinnato ramoso, pinnis brevissimis microphyllis, foliis ovatis integerrimis, auriculis parvis cylindrico-clavatis distantibus, plica triangulari notabili, amphigastriis ovato-cordatis bifidis subintegerimis, foliis involucralibus acuminatis subintegerimis, perianthio compresso piriformi dorso sulcato ventre late unicarinato.

Synops. Hepat. p. 447. n. 79.

$\beta?$ *fusca*, confertior, amphigastriis majoribus imbricatis transverse cordatis.

Synops. Hepat. p. 780. n. 79.

Liebmann samlede denne Plante i Nærheden af Hacienda de Mirador. (Hb. Liebm. n. 228 a, 15, 95.)

Folia dense imbricata, orbiculata, convexiuscula, integerrima; auriculae parvae, ovali-cylindricae, subobliquae, distantes, denudatae vel in caule ob amphigastria majora subtectae; lamina plana, triangulari-rotunda saepe reflexa inter caulem et auriculam interjecta. Amphigastria in caule majora, contigua, transverse ovata vel subcordata, acute ad $\frac{1}{3}$ bifida, laciniis acutis integerimis vel margine subrepandis, in ramulis paullo minora, magis distantia. Fructificatio qualis in forma vulgari *Frulliae Lindenbergii*.

Frullaria obcordata differt caule breviore, foliis squarrosis, amphigastriis minoribus ovatis magis distantibus; *Frullaria Martiana* auriculis pluribus explanatis, amphigastriis minoribus angustioribus et textura magis recedit.

In Herbario Liebmanniano sub n. 40 c, 82 c, 338, plantae scrupulosae inveniuntur, quae sane ad hanc referendae sunt, sed habitu laxiore ramisque magis regulariter pinnatis proprius ad formam principalem *Frulliae Lindenbergii* accedunt; folia tamen sunt paullo longiora, interdum acuta; auriculae confertiores, longiores, angustiores, omnes denudatae; inter amphigastria integerrima saepius repando-subserrata apparent; folia involucralia integerrima, rarius subserrato-denticulata, omnia in acumen longius producta, perianthium paullo longius.

15. *Frullania triquetra Lindbg. et Gottsche.*

Fr. caule procumbente ramoso, ramis subsimpliciter pinnatis in ♂ vel bipinnatis, ramulis inaequalibus, foliis laxe imbricatis oblique ovato-oblongis apice inflexis apiculatis,

auriculis teretibus cauli adproximatis tectis (caulinis elongatis incurviusculis), amphigastriis imbricatis ovato-oblongis margine reflexis basi sinuato-decurrentibus acute bifidis, foliorum involucralium lobulo ventrali repando-subdentato dorsali amphigastriique laciniis acutis integerrimis, perianthio ovato apice valde attenuato incurviusculo, dorso ad apicem vel sulcato vel obsolete carinato ventre obtuse unicarinato; inflorescentia mascula globosa, e 3—4 paribus perigoniorum conflata. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 780. n. 102 b.

Liebmann fandt denne Art i Districtet Chinantla i Mai med Perianthier og ♂ Blomst. (Hb. Liebm. n. 453.)

Rami primarii sesquipollicares, cum foliis $\frac{2}{3}$ lin. lati, in planta ♀ plerumque bipinnati, ramulis inaequalibus. Color totius plantae siccae nigro-fuscus; planta humecta fuscescens. Folia caulina $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata, margine ad apicem versus ventrali et apice apiculato ipso inflexa, basi in auriculam cylindricam $\frac{2}{5}$ lin. longam, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ lin. latam, laminā triangulari parvā cauli conjunctam transeuntia. Amphigastria margine reflexa $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{5}$ lin. lata sunt. Folia involucralia majora, $\frac{5}{6}$ lin. longa, $\frac{1}{2}$ lin. lata; lobulus ventralis interne laciniā dentiformi auctus, illa scilicet parte, quae in foliis caulinis inter caulem et auriculam utrumque conjungens conspicitur. Amphigastrium involucrale $\frac{2}{3}$ lin. longum, $\frac{1}{3}$ lin. latum. Perianthium elongato-ovato-triquetrum, $1\frac{1}{3}$ lin. longum, $\frac{1}{2}$ lin. latum. Sectio transversa faciem ventralem altius carinatam, dorsalem subbisulcatam interjecta carina obtusa paullum elevata, monstrat. Textura omnium partium Frullaniarum vulgaris; in foliis praeparatis nucleus cellulæ violaceus e membrana primaria levi ictu ejici potest.

A *Frullania Montagnei* maxime affini differt caule minus diviso, ramis non decurvis, auriculis tectis, caulinis elongatis incurvis, evolutis fere nullis, perianthii forma. *Frullania Baptistae* differt caule multo simpliciore, foliis brevioribus pluribus obtusis, auricula minoribus plerisque denudatis, amphigastriis minoribus basi haud sinuatis, foliis et amphigastrio involucralibus inciso-laciiniatis.

16. *Frullania Deppii* *Gottsc.*

Fr. digyna, caule inordinate tripinnatim ramoso, foliis ovatis integerrimis, auricula magna cylindrico-gaieiformi rarissime evoluta, amphigastriis ovatis bifidis margine revolutis, perianthio prismatico-triquetro dorso impresso ventre unicarinato, involucro serrato-dentato.

Synops. Hep. p. 456. n. 103.

Variat binis formis, quae in eodem caule interdum inveniuntur:

- a. lobulo dorsali folii involucralis dentato, quod in speciminibus Leiboldianis praecipue occurrit, et

b. lobulo dorsali folii involucralis obsolete denticulato vel integerrimo. (Stirps Deppii, sed etiam in speciminibus Leiboldianis.)

Denne Art fandtes af Deppe i Nærheden af Xalapa (4500'), og af Leibold sandsynligviis paa Plantagen Zazuapan (2500—3000') i Departementet Vera Cruz.

17. *Frullania Brasiliensis Raddi.*

Fr. dioeca, caule procumbente irregulariter bipinnato, ramis subdecurvis, foliis imbricatis oblique rotundo-oblongis planiusculis apiceve inflexis obtusis et breviter apiculatis, auriculis oblongo-clavatis cauli contiguis parallelisque et evolutis lanceolatis canaliculatis tectis (ramulorum subdenudatis), amphigastriis rotundo-ovatis margine subreflexis basi sinuato-decurrentibus emarginato-bifidis laciniis obtusis vel acutiusculis, involuci foliis ovatis acutis lobulo amphigastriique laciniis integerrimis, perianthio semiexerto subcylindrico laevi ad apicem subplicato.

Synops. Hepat. p. 458. n. 108.

β . *Mülleriana*, foliis paullo brevioribus aliterque directis diversa.

Fr. Müller fandt denne Plante i Omegnen af Vulkanen Orizaba med Perianthier (n. 2273).

Ut rectius intelligatur, quibus dubiis haec species premitur, tacere nolumus, autores Synopseos Hepaticarum plantam originalem *Raddianam masculam* tantummodo vidisse, nec femineam, quam figura Raddiana male depingit, notam habuisse. In distinguendis *Frullania Brasiliensi* et *cylindrica* folia involucralia integerrima vel subintegerrima, perianthium longius breviusve, exsertum vel semiexsertum magni momenti tunc temporis editores habebant, sed plantis undique collatis omnia fere obnubilantur et magis confluunt.

Planta Mülleriana n. 2273 inter formas *Fr. cylindricae* omnino aliena appareat, unde liceat tanquam varietatem β *Frullaniae Brasiliensi* adjungere.

Caules vel rami primarii bipollicares, foliis fuscis (apice viridescentibus) vestiti, cum foliis humectis fere $\frac{2}{3}$ lin. lati. Folia in statu sicco cauli subconvoluta, contigua, apiculata et apice inflexa, rarissime mutica, auriculis modo explanatis modo cylindrico-galeatis. Perianthia semiimmersa $\frac{5}{6}$ —1 lin. longa, parte latissima $\frac{2}{5}$ lin. metientia, tubulus apicalis $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{10}$ lin. longus. Folia involucralia $\frac{2}{3}$ lin. longa, cum lobulo explanato $\frac{3}{5}$ lin. lata, lobulus ventralis basi $\frac{1}{6}$ lin. latus, lobulus styli $\frac{1}{15}$ lin. basi latus, $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ lin. longus; amphigastrium involucrale altero latere coalitum bifidum, ad basin laciniarum dentem vel angulum prominentem ostendens.

18. *Frullania cylindrica* *Gott sche.*

Fr. digyna, caule regulariter alternatim pinnato, pinnis bipinnatis, foliis rotundo-ovatis decurvis mucronulatis, auriculis plerisque explanatis ovato-lanceolatis canaliculatis, supremis et ramulorum oblongo-cylindricis cauli adproximatis et parallelis, amphigastriis ovato-oblongis imbricatis toto margine revolutis sinu acuto bifidis, involuci foliis ovatis acutis apiculatisve lobulo ventrali subbifido cum amphigastrii laciniis basi repando-subdennatis coalito, perianthio exerto conico-cylindrico laevissimo rostro longo recurvo coronato.

β , involucro magis laciniato-dentato, perianthio conico-obpiriformi minus longe exerto.

γ , *minor*, foliis subverticalibus oblique ovatis, involucro subcoalito.

δ , *atro-fusca*, foliis margine ventrali superne inflexis, involuci foliorum et amphigastrii laciniis subintegerrimis, perianthio breviore crassiore.

Synops. Hepat. p. 459 et 781. n. 107.

Liebmam samlede denne Plante i Districtet Chinantla; Leibold ligeledes og med rig Frugt sandsynligvis i Omegnen af Plantagen Zazuapan i Departementet Vera Cruz, og Fr. Müller ♂ og ♀ i Districtet Orizaba paa Bjergkjeden Sierra de San Cristobal i December, ved Aseradero de Sta Cruz og ved Borrejo i Juni, ligeledes ♂ og ♀.

19. *Frullania Miradorensis* *Lindbg. et Gott sche.*

Fr. caule procumbente subtripinnato, ramis inferioribus subdecurvis indivisis vel ramulis brevibus simpliciter pinnatis, supremis patent-erectis subbipinnatis fastigiatis, foliis arcte imbricatis ovatis apiculatis apice inflexis (raro explanatis rotundatis longiusve apiculatis), auriculis cauli adproximatis explanatis lanceolatis canaliculatis acutis basi incurvis plerisque tectis (ramulorum praesertim superioribus clavato-cylindricis propter amphigastria minora subdenudatis), amphigastriis ovato-oblongis imbricatis toto margine revolutis sinu acuto bifidis, foliis involucralibus cum amphigastrio subcoalitis bilobis, lobis in acumen subulatum longius productum subintegerrimis medio lacinia dentiformi (loco styli) auctis, perianthio semiexerto late cylindrico apice attenuato in rostrum rectiusculum producto.

Synops. Hepat. p. 781. n. 107 b.

Liebmam samlede denne Plante i Skovene paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') under n. 116 i faa Exemplarer.

Plantae vel caules primarii 2 pollices longi, cum foliis viridescentibus humectis $\frac{5}{6}$ lin. lati. Folia caulina $\frac{3}{5}$ lin. longa, parte latissima fere $\frac{1}{3}$ lin. lata in auriculam triangu-

larem $\frac{1}{5}$ lin. fere longam transeuntia. Amphigastria $\frac{1}{3} - \frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{3}$ lin. lata (sc. margine revoluto). Perianthium $1\frac{1}{5}$ lin. longum, $\frac{2}{5}$ lin. latum; rostrum paullum incurvum $\frac{1}{6}$ lin. longum. Folia involucralia $\frac{4}{5}$ lin. longa, cum lobulo explanato $\frac{3}{5}$ lin. lata; alterum cum amphigastrio involucrali aequo longo et parte latissima $\frac{2}{5}$ lin. lato coalitum.

20. *Frullania Leiboldii* Lindbg. et Gottsche.

Fr. tetragna, caule procumbente pinnatim decomposito, ramis ramulisque divergentibus, foliis imbricatis ovatis convexis apice inflexis apiculatis raro rotundatis muticis, auriculis tectis plerisque explanatis lanceolatis canaliculatis (supremis et ramulorum saepius oblongo-cylindricis cauli parallelis), amphigastriis oblongo-ovatis imbricatis toto margine reflexis subsinuatis acute bifidis laciniis obtusiusculis, foliis involucralibus late ovatis bifidis laciniis acutis, ventrali margine dentato-lacinulata apice recurva, amphigastrio ovato bifido margine repando-subdentato, perianthio semiexerto cylindrico laevi ore rostrato.

Synops. Hep. p. 782. n. 107 c.

Leibold samlede faa Exemplarer af denne Plante, sandsynligviis paa Plantagen Zazuapan i Departementet Veru Cruz.

Plantae fuscescentes, ad apicem versus viridescentes; caules vel rami primarii bipollares, cum foliis humectis $\frac{2}{3}$ lin. lati. Folia ovalia, $\frac{1}{2}$ lin. longa (sc. apiculo $\frac{1}{30}$ lin. longo incurvo), medio $\frac{1}{3}$ lin. lata, in auriculam triangularem explicatam marginibusque subconvolutam $\frac{1}{5}$ lin. longam, basi stylo triangulari auctam transeuntia. Amphigastria $\frac{1}{3}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ lin. fere lata. Perianthium $1\frac{1}{2}$ lin. longum, medio $\frac{3}{5}$ lin. latum.

21. *Frullania Moritziana* Lindbg. et Gottsche.

Fr. dioeca, caule procumbente regulariter bi-tripinnato, foliis imbricatis oblique rotundis obtusis integerrimis rarius apiculatis margine inflexis, auriculis subexplanatis cauli approximatis tectis longissimis incurvis margine convolutis acutis, amphigastriis cordato-rotundis ovato-oblongis obovatissime margine reflexis bifidis obtusiusculis, foliis involucralibus inaequaliter bifidis, lobulo dorsali magno acuminato integerrimo patenti-divergente, lobulo ventrali angustiore marginibus revolutis subcanaliculato ad apicem versus dentato-serrato, subtus lacinia styli biloba vel bidentata repanda aucto, amphigastrio ovato convexo bifido laciniis acutis dentato-lacinulatis margine revolutis, perianthio Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 782. n. 108 b.

β. Mexicana, lobulo dorsali foliorum involucralium et floralium apice subintegerim denticulatove, lacinia styli lobuli ventralis majore; digyna. Gottsche Icon. Hep. ined.

Fr. Müller fandt denne Plante i Omegnen af Vulkanen Orizaba, uden Frugt. (Hb. Müller. n. 2326 et 2324).

Plantae fuscescentes, rami primarii vel caules ad 4 pollices longi, cum foliis humectis $\frac{1}{2}$ lin. lati. Folia ovalia, obtusa apiculatave, $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{4}{5}$ — $\frac{3}{10}$ lin. lata, in auriculam plus minus explicatam, $\frac{1}{5}$ lin. longam, marginibus recurvo-conniventibus abeuntia. Amphigastria subimbricata, $\frac{3}{10}$ — $\frac{1}{3}$ lin. longa, medio $\frac{1}{4}$ lin. lata (sc. margine recurvo). Folia floralia majora $\frac{1}{2}$ lin. longa, lobus dorsalis $\frac{1}{3}$ lin. latus; ventralis, si explanatur, late triangularis; amphigastrium florale altero latere coalitum, $\frac{1}{2}$ lin. longum, $\frac{1}{3}$ lin. latum. Folia involucralia juniora tantummodo vidi, apice lanceolato serrato-dentata, pistilla bina, quae e perianthio minutulo emergunt, circumdantia.

22. *Frullania cucullata* Lindbg. et Gottsche.

Fr. digyna, caule repente pinnatum vel bipinnatim ramoso, ramis brevioribus arcuato-decurvis, foliis imbricatis ovatis apice inflexo apiculatis integerrimis, auricula in caule principali et in ramis plerisque in laminam triangularem utrinque convolutam apice recurvam cuculliformem expansa (ramorum ovato-cylindrica), amphigastriis imbricatis obovato-quadratis ad tertiam partem bifidis, laciniis ovato-cordatis apiculatis margine toto revolutis, perianthio semiexerto ovato-prismatico dorso ad apicem versus impresso ventre unicarinato, rostro longo recurvo, foliis involucralibus amphigastrioque bilobis subintegerimis vel unidentatis, inflorescentia mascula globosa. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 782. n. 110 b.

β. Zazuapan. Caule ramosiore, foliis brevioribus nonnullis exapiculatis, auriculis pluribus clavato-cylindricis.

Liebmann samlede denne Plante i Skovene omkring Hacienda de Mirador (3000') og paa Vulkanen Orizaba i en Høide af 10,000 Fod; Var. *β* paa Plantagen Zazuapan (2500—3000') i Departementet Vera Cruz. (Hb. Liebmann. n. 94, 117, 125, 40 b, 76 b, 88, 224, 253, 352 b et *β*, n. 535 fra Zazuapan.)

Rami primarii sesquipollicares, pinas 4-lineares-semipollicares protrudentes, cum foliis flavescentibus humidis $\frac{2}{3}$ lin. lati. Folia $\frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ lin. lata, in auriculam $\frac{1}{5}$ lin. longam convolutam, $\frac{1}{30}$ lin. latam abeuntia; amphigastria $\frac{1}{4}$ lin. longa et $\frac{1}{5}$ lin. lata (sc. marginibus convoluta). Perianthium $1\frac{1}{5}$ lin. longum, $\frac{1}{2}$ lin. latum, sectione transversa tri-

quetrum lateribus concavis. Folia involucralia $\frac{5}{6}$ lin. longa et cum lobulo explanato $\frac{1}{2}$ lin. lata; amphigastrium aequo longum, $\frac{1}{3}$ lin. latum. Bis 3 pistilla inveni. Semina angulato-ovalia, majora, verruculis brunneis (in facie obversa ad 20) obsita. Elateres multi, fibra lata fusca percursi.

23. *Frullania longicollis* Lindbg. et Gottsche.

Fr. digyna, dioeca caule procumbente 2—3-pinnato, ramis inaequalibus flexuosis attenuatis, foliis arce imbricatis convexis deflexis in siccitate cauli circumvolutis oblique ovatis margine ventrali apiceque inflexis mucronulatis, auriculis cauli parallelis tectis longis omnibus explicatis lanceolatis acutis marginibus revolutis canaliculatis, amphigastriis imbricatis ovato-oblongis toto margine revolutis breviter bifidis laciniis obtusiusculis, involuci foliis bifidis acutis margine subreflexis integerrimis denticulatis, amphigastrio ovato bifido laciniis acutis subrepandis, perianthio triquetro dorso levius depresso atque ventre unicarinato apice longius rostrato rostro recurvo. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 783. n. 110 c.

Liebmann fandt denne Art i Nærheden af Sølvværket Yavesia (7—8000') i Districtet Ixtlan i Departementet Oajaca. (Hb. Liebm. n. 271 a.)

Caules vel rami primarii 2—3 pollices longi, foliis brunneis apice viridescen-tibus vestiti, cum foliis humectis $\frac{5}{6}$ lin. lati. Folia ovalia, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin. longa, $\frac{2}{5}$ lin. lata, (auricula fere $\frac{1}{4}$ lin. alta, $\frac{1}{20}$ lin. fere lata statu convoluto; stylus parvus $\frac{1}{30}$ lin. longus) apice apiculata, inflexa, in foliis subfloralibus apiculo paullo longiore; margo ventralis latius vel angustius inflexus. Amphigastria $\frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{4}$ lin. lata (sc. margine revoluto). Folia involucralia $\frac{4}{5}$ lin. longa, cum lobulo explanato $\frac{3}{4}$ lin. lata, integerrima; lobulus ovato-lan-ceolatus introrsum dentem longiorem (qui stylum foliorum caulinorum sistit) exhibens. Perianthium semimaturum paullo longius quam 1 lin., medio $\frac{2}{5}$ lin. latum; rostrum recur-vatum fere $\frac{1}{6}$ lin. aequat; dorso concavum vel depresso plicam medianam subobliquam paullo elevatam ostendens; in juniore perianthio dorsum profunde sulcatum inveni; ventre alte, sed obtuse carinatum. Pistilla bina; semel 4 inveni. Reliqua desiderantur. Textura vulgaris; cellularum parietes leviter incrassati; interdum incrassatio angularis punctiformis et intermedia parietum.

Frullania cucullata distinguitur statura minore, ramis simplicioribus decurvis auriculis haud omnibus explanatis brevioribus apice cucullatim reflexis, amphigastriis brevioribus latioribus, involuci foliis angustioribus integerrimis, dorso concavo vel laevi apice minus attenuato. A *Frullania intumescente* differt *Fr. longicollis* statura majore, auriculis omnibus

convoluto-explanatis multo longioribus acutis, involuci foliis integerrimis vel ad basin sub-serrato-denticulatis nec apice dentato-serratis, perianthio dorso leviter carinato rostro incurvo.

24. *Frullania microcephala* *Gottsche.*

Fr. digyna, dioeca, caule procumbente ramoso, ramis primariis bipinnatis foliis sub-imbricatis ovatis acutis apiculatis integerrimis, margine ventrali a medio recurvatis, apice interdum inflexis, auriculis plerisque cylindrico-galeatis cauli parallelis subnudis rarius in laminam triangularem canaliculatam evolutis, stylo dentiformi interjecto, amphigastriis sub-imbricatis erecto-patentibus ovalibus ovatisve ad $\frac{1}{3}$ bifidis, laciniis ovato-lanceolatis integerimis, margine recurvatis, perianthio ovali brevi semi-immerso dorso convexo, ventre (postremo obtuse) unicarinato, foliis involucralibus longioribus subconformibus lobulis lanceolatis introrsum unidentatis plerisque aequae atque amphigastrii basi utrinque unidenticulati recurvis. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Liebm. fandt denne Plante paa Sartorius's Plantage Hacienda de Mirador (3000') i August med Perianthier. (Liebm. in Hb. Schimperi.)

Plantae fuscescentes; rami primarii 1— $1\frac{1}{2}$ poll. longi, apice ramificatione $\frac{3}{4}$ pollic. lati; cum foliis humectis $\frac{1}{2}$ lin. latitudine metientes. Folia ovato-lanceolata, $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ lin. medio lata, in apiculum longiore brevioremve excurrentia, marginibus subrepandis integerrimisve; auricula cylindrica $\frac{1}{5}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{20}$ lin. lata, rarissime in laminam triangularem explicata. Amphigastria $\frac{1}{6}$ lin. longa, $\frac{1}{10}$ lin. lata (margine revoluto), e minore parte auriculas tegentia. Folia involucralia et floralia majora. Folia involucralia $\frac{2}{3}$ lin. longa, cum lobulo unidentato expanso $\frac{1}{3}$ lin. lata; amphigastrium $\frac{2}{5}$ lin. longum, $\frac{1}{6}$ lin. latum. Perianthium obovatum, breve, $\frac{1}{2}$ lin. longum, parte latissima $\frac{1}{3}$ lin. latum, dorso convexiusculum, ventre plus minus obtuse unicarinatum; rostrum tubulosum breve, externe, maxime basi, papillis paullo prominentibus sub lentibus fortioribus exasperatum, unde a latere crenulatum appareat.

Diffr. a *Frullania Beyrichiana* proxima involuci laciniis brevioribus et latioribus; a *Frullania macrocephala* perianthio minore et involuci forma.

25. *Frullania connata* *Lindbg. et Gottsche.*

Fr. dioeca, caule procumbente pinnatim decomposito ramis apice attenuatis, foliis laxe imbricatis ovatis acuminatis acutis margine ventrali subreflexis integerrimis, auriculis fere omnibus explanatis lanceolato-subulatis canaliculatis supremis nonnunquam cylindricis,

amphigastriis adproximatis oblongo-ovatis margine subreflexis basi sinuato-subsagittatis acute bifidis, involuci foliis amphigastro ex altero latere coalitis bifidis laciniis subulatis serratis, perianthio semiexerto triquetro, dorso laevi ad apicem concaviusculo ventre unicarinato ore longe rostrato erecto scabriusculo. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Synops. Hepat. p. 783. n. 111 b.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Vera Cruz i Nærheden af Sta Maria Tlapacoyo paa Plantagen Hacienda de Jovo (1800—2000') i Juli, og paa Hacienda de Mirador (3000') i October med Perianthier. (Hb. Liebmann. n. 406 b, 567, 571 ♂ et ♂ inter n. 572; n. 337 ♀ fra Mirador.) Leibold samlede ligeledes denne Plante, med yngre Fructification og sandsynligvis paa Hacienda Zazuapan.

Caules sive rami primarii $2\frac{1}{2}$ —3 pollices longi cum foliis humidis fuscescentibus $\frac{2}{3}$ lin. lati. Folia ovato-acuta, $\frac{2}{5}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ lin. parte latissima lata, supra caulem protracta, basi auriculam (scil. laminam triangularem utrinque margine convolutam) $\frac{1}{10}$ lin. longam, $\frac{1}{30}$ lin. latam formantia. Amphigastria $\frac{1}{8}$ lin. longa, $\frac{1}{10}$ lin. lata. Perianthium $\frac{5}{6}$ —1 lin. longum, $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ lin. medio latum, apice et basi attenuatum, rostrum tubulosum sub lentibus fortioribus papillis prominentibus scabrum, $\frac{1}{5}$ lin. longum, apice $\frac{1}{20}$ lin. hiante. Folia involucralia fere $\frac{5}{6}$ lin. longa, cum amphigastro coalita fere $\frac{2}{3}$ lin. lata; amphigastrium involucrale parte latissima $\frac{4}{5}$ lin. latum. Inflorescentia mascula ovato-globosa, e paribus 5—6 foliorum perigonialium visibilium composita. Semina ovato-angulata, fusca, verruculis brunneis consita.

Frullaniae Beyrichiana affinis, sed differt auriculis fere omnibus explanatis et involueri foliis serratis. Connubium amphigastrii involucralis cum altero folio involucrali etiam in *Frullania Beyrichiana* locum habet, quare in Synopsi Hepaticarum p. 783 in calce observatio nostra corrigenda est. Habitu tenero et foliorum forma similis *Frullaniae Breutelianae*, quae tamen differt foliis margine ventrali saepe inflexis, nonnullis apice crenulatis, auriculis pluribus cylindricis longioribus amphigastriisque longioribus imbricatis.

26. *Frullania sagittistipula* Lindbg. et Gottsche.

Fr. dioeca, digyna, caule procumbente parce ramoso, ramis brevibus decurvis vel (in planta fructifera) irregulariter subcipinnato, foliis imbricatis ovatis acuminatis acutis apiculatisve margine ventrali basi reflexis, auriculis explanatis longis lanceolato-subulatis canaliculatis subtectis et (superioribus et rameis inprimis) clavato-cylindricis basi truncatis denu-datis, amphigastriis subovatis subimbricatis (rameis minoribus magis distantibus) margine reflexis basi sinuato-sagittatis bifidis laciniis ovatis acutis, foliis involucralibus bifidis lobo dorsali ovato, ventrali lanceolato amphigastroque coalito inciso-serratis, perianthio subim-

merso triquetro ventre unicarinato apice longe rostrato rostro incurvo. Gottsche Icon.
Hepat. inedit.

β , laxior, simplicior.

Synops. Hepat. p. 784. n. 111 c.

Hovedformen fandt Liebmann i Nærheden af Jicaltepec (n. 432) ved Rio Nautla voxende iblandt Leucobryum, og paa Plantagen Hacienda de Mirador (n. 495). Varieteten β samlede han i Kystkovene ved Colipa (n. 138) og Misantla (500—800') i Departementet Vera Cruz (n. 54 b), og en Mellemform ved Hacienda de Jovo i April og Mai (n. 517 et n. 562 b).

Plantae foliis fuscescentibus et in novellis magis flavescentibus in laxo caespite crescentes; rami primarii 2—3 pollices longi, cum foliis humectis fere $\frac{5}{6}$ lin. lati. Folia ovalia vel ovato-acuta, $\frac{1}{2}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{3}$ lin. lata; auricula si cylindrico-galeata est, $\frac{1}{2}$ lin. longa, $\frac{1}{20}$ lin. lata; margo folii dorsalis basi, ut saepius fit, in lobulum rotundatum liberum excurrit. Amphigastria majora $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{5}$ lin. lata. Perianthium 1 lin. longum, parte latissima $\frac{2}{5}$ lin. latum, rostro $\frac{1}{20}$ lin. longo coronatum; sectio transversa dorsum elevatum ad utrumque angulum versus depresso et faciem ventralem carinâ alte elevatam sed lateribus depresso monstrat. Folia involucralia $\frac{5}{6}$ lin. longa, cum lobulo subexplanato $\frac{1}{2}$ lin. lata; alterum folium liberum, alterum cum amphigastrio involucrali aequo longo et $\frac{1}{3}$ lin. lato coalitum; etiam folium subinvolucrale alterum cum amphigastrio suo coailitum est; tertium demum liberum. Capsula e dupli strato cellularum composita, ut in congeneribus; semina fusca angulato-ovalia, tuberculis brunneis consita. Inflorescentia mascula ovali-globosa in distincto individuo.

Difert a *Frullania mucronata* ramificatione simpliciore, amphigastriorum laciniis acutis; a *Frullania Beyrichiana* foliis latioribus, auriculis pluribus clavato-cylindricis, amphigastriorum laciniis longioribus involucroque serrato. *Frullania connata* denique omnium proxima ab hac distinguitur caule magis irregulariter ramoso, foliis longius apiculatis, auriculis fere omnibus explanatis, amphigastriis minoribus minus evidenter basi sagittatis, foliorum involucralium laciniis angustioribus subulatis minus serratis et perianthii rostro longiore.

27. *Frullania Liebmanniana* Lindbg. et Gottsche.

Fr. caule procumbente subtripinnato, ramis attenuatis decurvatis, foliis imbricatis cauli circumvolutis oblique cordatis margine dorsali basi rotundatis ventrali inflexis acutis, et apiculatis rarius obtusiusculis integerrimis vel ad apicem obsolete repandis, auriculis oblongo-cylindricis cauli contiguis tectis (ramulorum subdenudatis basi truncatis), amphiga-

striis imbricatis ovalibus basi subsagittatis margine ad basin reflexis bifidis sinu laciniisque acutis, foliis involucralibus ovatis bifidis margine reflexis integerrimis obsoleteve maxime basi serrulatis, amphigastrio bifido subserrato, perianthio semiexerto ovato (postremum obovato) superne dorso ventreque unicarinato. Gottsche Icon. Hep. inedit.

Synops. Hepat. p. 784. n. 113 b.

Liebmann fandt denne Art i de dybe Skove omkring Plantagen Hacienda de Mirador ved Aguas Santas i Juli. (Hb. Liebmann. n. 407 b.)

Caulis 3—5 pollices longus, viridi-fuscens, humectus cum foliis $\frac{2}{3}$ lin. latus; rami $\frac{3}{4}$ pollic. fere aequantes. Folia $\frac{1}{2}$ lin. longa, parte latissima $\frac{1}{2}$ lin. lata, auricula $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{8}$ lin. longa, $\frac{1}{30}$ lin. lata. Amphigastria $\frac{1}{4}$ lin. longa, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{5}$ lin. lata. Folia involucralia longiora $\frac{5}{6}$ lin. longa, cum lobulo explanata $\frac{1}{2}$ lin. lata; amphigastrium $\frac{5}{6}$ lin. longum, $\frac{2}{5}$ lin. latum. Perianthium $\frac{5}{6}$ lin. longum, $\frac{2}{5}$ lin. parte latissima latum, demum post fructus egressionem obovatum. Semel terna pistilla inveni. Textura foliorum vulgaris; in foliis praeparatis membrana primaria rete hyalinum lineâ percursum sistit, in quo nuclei violacei membranae secundariae cum cellularum succis tamquam areolae coloratae apparent; in cellulis mediis folii majoribus incrassatio angularis adest.

Affinis *Frullania tenui*, quae differt statura multo teneriore et laxiore, foliis planis plerisque acuminatis, auriculis majoribus subdenudatis, amphigastriis ovato-oblongis basi non ampliatis. *Frullaniae atratae var. Mexicana*, foliorum forma accedens, facilius distinguitur amphigastriis angustis planis basi haud dilatatis, involuci foliis angustioribus subulatis magis serratis, perianthio magis immerso.

28. *Frullania atrata* Nees ab Es.

Fr. digyna, caule procumbente filiformi pinnatim ramoso, foliis subimbricatis verticibus oblique cordato-ovatis acutis integerrimis margine ventrali apiceque subinflexis cauli circumvolutis, auriculis oblongo-cylindricis cauli contiguis et parallelis tectis, ramulorum subdenudatis, amphigastriis ovato-elongatis margine reflexis acute bifidis, involuci foliis amphigastriique laciniis ovato-lanceolatis apice subulatis subserratis, perianthio subimmerso triquetro dorso laevi ventre concavo acute unicarinato apice longe rostrato.

β , *Mexicana*, robustior, foliis cordatis margine dorsali rotundatis magis divergentibus, ventrali apiceque inflexis obliquis, basi cum amphigastriis subsinuatis, foliorum involucralium amphigastriique laciniis latioribus subsinuatis dentato-serratis, perianthio semiexerto.

Synops. Hep. p. 464. n. 118.

Leibold samlede denne Plante, sandsynligviis i Nærheden af Plantagen Zazuapan; Prof. Miquel fandt den blandt Mosser fra Mexico, hvis Finested ikke nærmere var angivet; Fred. Müller fandt den i Districtet Orizaba og ved Dos Puentes. (Hb. Müller. n. 161. H.)

XXV. Fossombronia Raddi. — *Synops. Hepat.* p. 467.

Fossombronia carinata Lindbg. et Gottsche.

F. caule repente simplici apiceve furcato, foliis erectis arcte imbricatis concavis sinuoso-undulatis dorso plerumque bicarinatis integris integerrimisque, perianthio . . .

Synops. Hepat. p. 469. n. 6.

Liebmann fandt denne Art ved Bjergværket Yavesia (7—8000') i Districtet Ixtlan i Departementet Oajaca.

Plantae parvae, fibrillis albidis arcte repentes, 2—3 lin. longae, apice pallide virescentes. Folia quadrato-rotunda, hyalina, arctissime imbricata, integra et integerrima, summa antheridium unicum habentia, facie externa carina dupli sinuosa, dorsali concava. Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellularum incrassationem vel nullam vel angularem punctiformem monstrant; cellulæ inter se solutæ magis oviformes sunt, angulis tamen prominentias parvas hyalinæ habent. Planta junior antheridia et pistilla monstrabat; perianthium tamen nondum conformatum erat.

Propter radiculos albidas inter reliquas Fossombronias singularis, ne dicam fere suspecta videtur.

XXVI. Androcryphia Nees ab Es. — *Synops. Hep.* p. 470.

1. Androcryphia porphyrorhiza Nees ab Es.

A. foliis ovato-subrotundis.

Synops. Hep. p. 470. n. 1.

Liebmann fandt denne Plante paa Plantagen Mirador (3000') uden Frugt, i Februar.

Folia cum liquore kali caustici cocta et zinco bijodato tincta cellulas nusquam in-crassatas habent et si inter se solvuntur, angulos sub prominulos monstrant, quibus trigona pellucida »intercalaria auctorum«, quae in foliis apparent, formantur.

XXVII. *Symphyogyna Montagn. et Nees. — Synops. Hep. p. 479.*

1. *Symphynogyna Hymenophyllum Mont. et Nees.*

S. rhizomate filiformi repente ramoso, frondibus erectis bis terve bifidis nervosis, laciinis linearibus serratis apice emarginatis, fructu dichotomiae imposito, calyptre elongata cylindrica.

β. Liebmanniana, laciinis elongatis margine minute serratis, squama involucrali longius laciniata.

Synops. Hep. p. 480 et 786. n. 1.

Liebmann fandt denne Plante paa Sukkerplantagen Trapiche de la Concepcion (3000') i Districtet Chuapam i Departementet Oajaca.

E rhizomate radiculoso assurgunt stipites plures, pollicares, qui apice in frondes expansi et dichotomice divisi in ramulos bis bifidos frondosos solvuntur. Squama involucralis feminea junior simplex 2—3-bifida, 5—6 pistilla habens, adulta lacinias complures impositas monstrat. Squama mascula bidentata, sinu minore vel majore interjecto, semiacreta subalternans. Ulteriora non visa.

2. *Symphyogyna podophylla Mont. et Nees.*

S. rhizomate repente filiformi ramoso, frondibus erectis bis bifidis nervosis, laciinis subpetiolatis margine integris planis subserratis.

Synops. Hep. p. 481. n. 3.

Liebmann fandt denne Plante i det østlige Oajaca i fugtige Bjergskove omkring Tepitongo (4—5000') og imellem Totontepec og Trapiche de la Concepcion i det samme Departement ved San Yago Amatlan (henimod 6000').

E rhizomate repente assurgunt stipites semipollicares, qui ad apicem versus sensim sensimque alati fiunt et in frondes bis bifidas dividuntur. Squama involucralis feminea simplicior bi-pluridentata, nec profunde partita. Ulteriora non visa.

Lindenbergii sententiam sequor, qui hanc plantam ad *S. pedophyllum* adjungere mavult, si species in Synopsi Hepaticarum propositae conservantur. Qui perfectas plantas viderint, hunc nodum solvant.

3. *Symphyogyna sinuata* Montagn. et Nees.

S. rhizomate filiformi repente, frondibus procumbentibus dichotomis planis pinnatifidis crenatove-lobatis, laciinis rotundatis integerrimis sinibus angustis obtusis, folio involucrali lato lacero-inciso foliolis appendiculato.

forma *a*, frondibus margine pinnatifido-sinuatis (Swartz).

Synops. Hep. p. 482 et 787. n. 6.

Liebmann fandt denne Art paa Plantagen Mirador i Marts; Frederik Müller samlede den i Omegnen af Vulkanen Orizaba.

forma *b*, fronde crenato-lobata, in ramis nonnullis interdum conspicitur, dum reliqui rami ejusdem plantae frondem pinnatifidam habent.

Calyptae semipollicares et laciniae squamae involucralis fere 1 lineam longae. Capsula 3-linearis, 4 rimis dehiscens e cellulis oblongo-quadratis (parallelepipedis) incrassatis componitur; fibrae circulares vel semicirculares desunt. Semina anguloso-rotunda, flava, granulata. Elateres longi, bispiri. Swartzius complures plantas hoc nomine conjunxit, «frondibus lanceolatis planis margine integris pinnatifidoque sinuatis»; sed Weberus plantam fronde pinnatifide lobata, «quae species quasi transitum facit a Jung. foliosis ad frondosas,» potissimum nomine »Jung. sinuatae« insignivit et cum amicis suis communicauit. Planta Swartzii »margine integro« in Herbario Weberi (Lindenbergii) asservata mascula est, et *Symphyogynae Brasiliensi* vel *Blyttiae* cuidam adnumerari potest; reliquae plantae Herbarii Weberi, unde illud »crenatove-lobatis« in diagnosin Synops. Hepat. illatum est, magis ad *Symphyogynam Hochstetteri* Mont. (Synops. Hepat. p. 485. n. 15) quadrant. Cum autem plantas rariores invenerimus, in quibus frons pinnatifido-lobata in ramis nonnullis in frondem crenato-sinuatam transit, beatus Lindenbergius diagnosin mutandam esse non credidit, quia Montagneus *Symphyogynam Hochstetteri* jam a formis »Jungermanniae sinuatae« Sw. separaverat.

4. *Symphyogyna Brongniartii* Mont.

S. fronde substipitata, stipite bulboso basi repente bis dichotomo, laciinis linearibus patenti-divaricatis pinnatifido-lobatis, lobis alternis ovato-rotundatis sinu acuto obtusove discretis, involucro diphyllo flabellato-laciiniato laciinis incurvis.

Synops. Hepat. p. 483. n. 8.

Liebmann fandt denne Plante paa Plantagen Mirador (3000') i Marts med fuldkommen Frugt.

5. *Symphyogyna Brasiliensis Nees ab Es.*

S. fronde procumbente repente linear-i-dichotoma divaricata costata in ambitu subrepanda undulata, involucro lato membranaceo lacero.

β . *angustior*, fronde lineam lata.

Synops. Hepat. p. 484. n. 13.

Liebmann fandt den bredere Form α ved Huitamalco i en Høide af 2500—3000'; den smallere Form β samlede han paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') og i de fugtige Bjergskove omkring Roayaga i det østlige Oajaca.

XXVIII. *Aneura Dumort.* — *Synops. Hepat. p. 493.*

2. *Aneura pinguis Dumort.*

A. lacero-divisa aut simplex, radiculosa, sublinearis, marginibus aut lobulatis undulatisque aut denticulatis, calyptre laevi puberula.

α , *lobulata*, latior, arctius repens, marginibus magis minusve lobulatis et undulatim adscendentibus.

α' , *crassior*, tota terrae adpressa et repens, divergenti-lacera, marginibus obtusis crispulis, calyptre elongato-clavata.

Synops. Hepat. p. 493. sq. n. 1.

Frederik Müller fandt denne Plante voxende paa *Jungermannia hyalina* og med fuldkommen Frugt i Nærheden af Vulkanen Pico de Orizaba.

1. *Aneura palmata Nees ab Es.*

A. pinnatim divisa, trunco primario depresso-plano procumbente, ramis adscendentibus pinnatifido-palmatis lacinii linearibus obtusis truncatisve, fructu laterali, involucro pateriformi lacero, calyptre tuberculata.

α , trunco confertim ramoso ramisque conformibus latiusculis.

r, polyblasta, trunco abbreviato aut ramorum frequentia abolito arcte repente intricatove, ramis confertis erectis palmatisidis, laciniis angustis longiusculis quandoque acutis, fructu inter ramos ad speciem basilari.

Synops. Hep. p. 498. n. 6.

Liebmann fandt begge Varieteter med Frugt paa leeragtig Grund paa Plantagen Hacienda de Mirador i Marts; Frederik Müller samlede nogle Exemplarer iblandt andre Hepaticae i Omegnen af Vulkanen Orizaba.

XXIX. *Pseudoneura Gottsche.*

Metzgeriae § 2. *Frondes rhizomate seu trunco communi crassiore pinnatim diviso laciniis pinnatifidis.* — Synops. Hepat. p. 505.

Inflorescentia ventralis e caule lateralí vel e laciniarum axilla saepe utrinque oriunda, ut plerumque bini fructus adesse videantur. Calyptra basi involucro squamaeformi laciniato circumdata, adscendens, cellulis prominulis asperula, apice conica mucronulata. Inflorescentia mascula in laciniolis discretis lateralibus plerumque duplice serie disposita, vel monoeca vel dioeca.

Nervus frondis (i. e. fasciculus cellularum elongatarum incrassatarum, qualem videoas in *Blyttia* et *Metzgeria*) nullus, sed quia media frons multo crassior est quam margines, qui ex unico cellularum strato constant, in omnibus pinnis luce transmissa umbram linearem evidentissimam nervum medianum simulanten observes; margines contra in latitudine 3—5 cellularum pellucidi videntur. Truncus communis plerumque teres et glaber ut in (*Pseudoneura*) *Jg. fucoide* Hook. Sw., vel cellulis prominulis hirtellus, ut in (*Pseudoneura*) *Metzgeria eriocaula* α et β Synops. Hepat., vel denique utrinque alatus, ut in *Pseudoneura alata* G. Ms., e Peruvia.

1. *Pseudoneura multifida Gottsche.*

Ps. pinnatim multifida decomposita et supradecomposita, trunco primario biconvexo rigidulo, ramis horizontalibus, ramulis pectinatim pinnatis laciniolis linearí-angustissimis, innovationum tenuioribus linearibus obtusis, omnibus ad speciem nervo mediano percursis, fructu in trunco ramisque lateralí, involucro squamiformi carnosó, calyptra tuberculata.

Variat. α , monoeca,
 β , dioeca.

Aneura multifida Dumort. Synops. Hepat. p. 496. n. 5.

Liebmann fandt Varieteten α i Skove omkring Hacienda de Mirador (3000') steril i Januar, og Var. β omkring San Antonio de Huatusco (4500') i Departementet Vera Cruz med Frugt.

2. *Pseudoneura humilis* *Gottsche.*

Ps. dioeca, trunco communi repente subtereti, ramis principalibus adscendentibus fere semipollicularibus ramulos suboppositos flabellatim pinnatifidos 2—3 utrinque edentibus et denique in caulem subteretem nudum simplicem vel saepius bifidum recurvatum terminatis, calyptre subcylindrica tuberculosa apice conico fuscescente mucronulata. Gottsche Icon. Hepat. inedit.

Liebmann fandt denne Plante ved Hacienda de Mirador (3000') iblandt andre Hepaticae (n. 281 c).

Truncus communis nigro-olivaceus hinc inde radicellis parvis terrae affixus; frondes dilucide fusco-virides. Rami primarii 5 lineas alti, erecti, utrinque 2—3 pinnas paullum retroversas, 2 lin. longas et $1\frac{1}{2}$ lin. latas, horizontales, imbricatas edunt, dum caulis rami inter ultimas pinnas tamquam conus obtusus terminatur vel longius prominens plerumque in 2 ramos recurvatos dividitur (cf. Hookeri Musc. exotic. tab. 72 ramum adscendentem *Jg. (Pseudoneurae) eriocaulae*). Pinnulae singulae utrinque 3—4 laciniis linearibus sibi contiguis horizontalibus oblique divergentibus, lata umbra mediana percursis, compositae sunt; margo pellucidus 5—6 cellulas obliquo tractu inter se connexas latus est. Inter ramos primarios e trunco ramuli minores simplicius et angustius pinnati flexuosique oboriuntur, qui totum caespitem magis innectunt et primo adspectu *Aneurae palmatae* intertextae speciem praebent. Fructus plerumque bini, ad speciem oppositi, re vera tamen alterni, ventrali-laterales. Calyptre cellulis prominentibus majoribus sub apice interdum uncinatim recurvis tuberculato-aspera, apice mucrone fuscescente coronata, qui collum pistilli incrassatum sistit. Rudimenta reliquorum pistillorum sterilium, ut e. gr. in *Metzgeria eriocaula* Hook. Synops. Hepat. p. 505. n. 4. in calce describuntur, videre numquam mihi contigit. Involucrum squamiforme margine laciniato-dentatum. Capsula quadrivalvis, valvarum apices penicillati, semina et elateres utrinque attenuati monospiri convenient cum Aneurae speciebus.

In commentatione de Hepaticis Novo-Granatensis a Lindigio collectarum in Annal. des Sciences Nat. nunc divulgata, similem formam »*Pseudoneuram Bogotensem*» descripsimus, quae a planta Mexicana inflorescentia monoeca, statura paullo elevatiore, frondibus paullo latioribus etc. diversa est.

Obs. Si icon Hookeri Musc. exotic. tab. 85, cuius exemplar authenticum ab amicissimo T. Taylor, nomine datoris »Hornemann« insignitum habeo, veram *Jungerm. fucoidem* Swartzii depingit, plantae nostrae nullo modo ad *Pseudoneuram fucoidem* tamquam varietas referri possunt.

3. *Pseudoneura Pöppigiana Göttsche.*

A. pinnatim divisa, caudice procumbente compresso glabro, pinnis subovatis subbipinnatifidis lacinulis linearibus obtusis, calyptre ex axillis pinnarum cum caudice ascendente cylindrica glabra.

Metzgeria Poeppigiana Synops. Hepat. p. 506. n. 7.

Liebmann fandt denne Plante paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000'); fide observat. Lindenbergi.

XXX. *Metzgeria Raddi. Synops. Hep. p. 501.*

1. *Metzgeria furcata Nees ab Es.*

M. furcatim proliferove-divisa, linearis, supra glabra, margine costaque (interdum etiam hic et illic in interstitio) subtus setulosis nudisve.

A. in pagina ventrali omnino glabra.

a. *extensa*, major, parce furcatim divisa laciniis elongatis, inferne subsimplex aut alternatim ramosa.

1. ciliis marginis binatis hamato-incurvis longioribus, interdum patellà suctoria apice coronatis. — Frondis cellulae mediocres. (Liebmann. Herb. n. 190. 194 b).

2. ciliis marginis solitariis (sive simplicibus) brevioribus rectiusculis. Viridis. Frondis cellulae majores. — (Hb. Müller. n. 2363.)

B. in pagina ventrali subglabra, hic inde illic marginem et costam setulis vel radicellis, interdum patellà suctorià coronatis, instructa.

β. *communis*, furcatim subalternatimve divisa, laciniis brevibus obtusissimis ciliis marginis binatis brevioribus subrectis divergentibus hic inde apice in patellam suctorię transeuntibus.

* *prolifera* e costa et e margine, laciniis novellis plerumque nervo percursis (rarius enervibus), marginis ciliis simplicibus.

γ , *setulosa*, e facie ventrali setulas multas, apice interdum in patellam suctoriā ex crescentes, protrudens.

C. margine nudo. (Liebmann. Hb. n. 336.)

Liebmann samlede Varieteten α i de skyggefulde Skove, som bedække Siderne af Pico de Semopaltepec, (n. 190, 194 b) med Frugt i Juni; Fred. Müller fandt denne Varietet i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Aserradero de Santa Cruz; Var. β (n. 220, 319, 364) og Var. γ fandt Liebmann paa Plantagen Mirador i Marts, og Leibold sandsynligviis paa Plantagen Zazuapan.

Omnis hae varietates etiam in exemplis Europaeis occurunt. Secundum auctores (Hooker, Nees) radicellae tantummodo e costa proveniunt; sed saepius cilia marginis aequa ac setulas superficie ventralis apice in patellam suctoriā commutata nec a radicibus genuinis auctorum distinguenda vidimus. Cilia marginis e cellula minori propria proveniunt; cilia ventralia tamen ex angulo cellularum frondis e cuticula ortum trahunt, in apice laciniarum semper desunt, et dein e cellulis adultis ex crescunt. In fronde cocta et praeparata membrana secundaria cellularum intacta tamquam nucleus hexagonalis levi ictu ejici potest, ut cellulæ frondis adhuc cohaerentes nunc e merè membranā primariā residuā roseo-hyalinā constent.

2. Metzgeria Liebmanniana Lindbg. et Gottsche.

M. fronde dichotoma linearis undulata flaccidula, facie dorsali glabra, ventrali setuloso-pubescente, ciliis marginis solitariis rectis.

α , latior — Stirps originalis —.

Synops. Hep. p. 505. n. 3.

β , intermedia, fronde paullo angustiore minusque undulata.

Metzgeria dichotoma Synops. Hep. p. 788. n. 2.

Liebmann fandt Hovedformen paa Vulkanen Orizaba ved Vaqueria del Jacal i 10000 Fods Høide med Frugt i September (n. 165 b et 167) og Varieteten β i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca (n. 424 ex parte og 431) i Mai.

Plantae confertim crescentes, flavo-fuscae praesertim ad apices versus, $1\frac{1}{2}$ pollic. longae; frons $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ lin. (versus apices) lata, prolifera e margine et e costa, interdum juxta fructificationem; quin frondem novellam cum basi calyptre coalitam inveni. Fructificatio eadem atque in *M. furcata* sed major, setulis minoribus sed densius vestita; val varum apices elateribus barbati.

Varietas β paulo angustior est, frons 1 lin. lata, ramosior, sed nervi destructione delabens, plerumque 1 pollicem longa, minus undulata, facie ventrali ubique aequa dense setulis vestita ac species originalis. Est forma intermedia inter *Metzg. furcata* γ *setulosam* et formam *Metzg. Liebmanniana* principalem.

Observ. Planta Peruviana, quae a cl. Kunze data in Hb. Lindenbergiano (nunc in Universitate liter. Vindobonensi asservato) sub nomine *Jg. hymenophylloidis* et *Jg. fimbriolatae* adest, vix a *Metzg. furcata* diversa est; habet enim cilia marginalia et costae ventralia densa, curvata, haec elongata, in reliqua superficie ventrali nulla vel rara. Exemplaria originalia plantae Swartzianae e Jamaica et Raddianae e Brasilia comparare nequeo; sed illustr. Neesius in *Synops. Hepat.* p. 504. n. 2. illa notis levioribus tantummodo a *Metzg. furcata*, cuius setulas ventrales inter costam et marginem nusquam in tractatu suo (*Hep. Europ.* III. p. 185—503) commemorat, diversa esse dicit.

XXXI. *Monoclea* Hooker. — *Synops. Hep.* p. 508.

Gott sche: Ueber das Genus *Monoclea*. Mohl et Schlechtend. Bot. Zeitschr. 1858. Nr. 38 et 39. pag. 281 sqq. (tab. VII et VIII).

Fructificatio perfecta frondi immersa, pedunculo ante apicem frondis diruptum emergente. Calyptra libera elongata plerumque inter labia rupturae visibilis. Involucrum nullum. Perianthium nullum. Origo fructus ignota. Capsula elongata, coriacea, univalvis (i. e. longitudinaliter rima deorsum dehiscens marginibus siccitate reflexis) ex una serie cellularum, intus fibris spiralibus reticulatis vestitarum composita. Elateres bispiri ubique capsulae parieti adhaerentes. Semina parva, granulata, tetraëdro-globosa.

Antheridiorum torus versus apicem frondis elevatus, marginatus, plerumque ovalis.

Frons lata, lobata, e pluribus cellularum stratis composita, succulenta, punctis albis conspersa (si humida), enervis, exareolata, eporosa, sub linea mediana pilis radicalibus confertis vestita. Squamulae nullae.

Plantae terrestres locis uidis irriguisque crescentes.

1. *Monoclea Forsteri* Hook.

Gott sche l. c. p. 289. Hook. Musc. exot. tab. 174. *Synops. Hepat.* p. 508. n. 1.

Fr. Müller (fra Bern) fandt denne sjeldne Plante med Frugt i Skovene omkring Vulkanen Orizaba. Jeg besidder den desuden fra Cuba ♀, samlet af Wright, og ♂ og ♀ fra Venezuela, samlet i Nærheden af Valencia af Fendler og ligeledes fra Ny-Granada, samlet af Alex. Lindig.

XXXII. *Plagiochasma* Lehm. et Lindbg. — *Synops. Hep. p. 511.*

1. *Plagiochasma intermedium* Lindbg. et Gottsche.

Pl. fronde ex apice innovante obovata elongata subtus atropurpurea, squamis ventralibus apicis semiovatis (uni-bi-) appendiculatis (in fronde ipsa interdum obsoletis), fructu in fronde media plerumque solitario, pedunculo fusco-purpureo basi paleaceo, receptaculo femineo 1—4-carpo subtus barbato, seminibus majoribus, elateribus solidis sine fibra spirali.

Synops. Hepat. p. 513. n. 2.

Liebmann fandt denne Plante paa Plantagen Hacienda de Jovo (1000—2000') i Departementet Vera Cruz, ved Tlaltengo i Districtet Chinantla i Dep. Oajaca og i Bjergværet Yavesia i Districtet Ixtlan i en Høde af 7—8000 Fod; Frederik Müller fandt den ogsaa med fuldkommen Frugt i Districtet Orizaba.

Plantae gregatim crescentes, fronde viridi-flavescente subtus atropurpurea rugulosa. Frons oblonga, $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ pollic. longa, 2—3 lin. lata, simplex aut rarius apice bifida, flexuosa, medio plerumque fructum unicum gerens. Squamae ventrales semiovatae, appendiculo linguiformi-lanceolato auctae, purpureae, frondes marginem non nisi sub apicem superantes et in faciem superiorem viridem reflexae. Receptaculum femineum 1—4-carpum; pedunculus fusco-purpureus, 3-linearis, apice sub receptaculo barbatus, basi paullum paleaceus, ceteroquin nudus vel paleis raris conspersus. Capsula flava, matura supra medium dehiscens margine laciniato, ex unico cellularum strato sine fibris circularibus. Sporae magnae, fuscae, tetraëdrae, polyëdrae, cristis elevatis repandisque reticulato-rugosae, qua propter ad speciem margine lato undulato alatae; sporodermis externa granulato-scabra. Elateres flavi, paullum flexuosi, solidi, canalis centralis vestigium plus minus perspicuum monstrantes, semper sine fibra spirali. Discus antherifer, 1 lin. fere latus, subelevatus, cordiformis vel suborbicularis apice emarginato, in media fronde versus apicem plerumque in laciniis minoribus obovatis.

Frondis articulatione, superficie porosa et subvenosa hoc ad *Plag. cordatum* accedit, sed articulis longioribus, paleis numerosioribus sub capitulo et in basi pedunculi

in mediâ fronde affixi praesentibus satis superque diversum. A *Plag. appendiculato* colore et superficie magis porosa frondis et articulatione differt.

Observ. Secundum semina majora et elaterum conditionem tam insignem planta Nepalensis, quae in Synopsi Hepaticarum nostra p. 517 ad *Plagiochasma appendiculatum* tamquam? varietas β , *depauperata* refertur, *Plagiochasmati intermedio* nostro proxima est.

2. *Plagiochasma elongatum Lindbg. et Gottsche.*

Pl. fronde subcontinua lineari-dichotoma elongata, margine adscendente subconvoluta, squamis ventralibus saepe bipartitis laciniis lanceolatis (in basi plantae saepe obsoletis), fructibus subseriatibus, pedunculo brevissimo basi subnudo, receptaculo mono-dicarpo subtus longe barbato, capsula viridi, seminibus majoribus, elateribus trispiris.

β , *leucolepis*, fronde magis porosa, poris per series dispositis, pedunculis longioribus validis fuscis, squamis ventralibus margine prominentibus apice hyalino.

Synops. Hep. p. 519. n. 10.

Liebmann fandt denne Plante i Departementet Oajaca i Districtet Chuapam ved Zapotekbyen Comaltepec (2000—3000'), i Districtet Chinantla i de fugtige skyggefulde Skove ved San Pedro Tepinapa (2000—2500') og i Districtet Villa alta i de fugtige Bjergskove omkring Tepitongo (4—5000') (Hb. Liebm. n. 290, 294, 305) i Juni og Juli med moden Frugt. Varieteten β fandtes paa kalkagtig Grund i Nærheden af Jalapa (4500') af Schiede og Deppe med Frugt. (Hb. Reg. Berolin. n. 109).

Frondes pollicem vel uncias 2 longae, subtus medio fibrillis multis dense villosae, dichotomae, laciniae lineares, elongatae, marginibus adscendentibus canaliculatae et plus vel minus convolutae etiam in statu humectato, supra glauco-virides, subtus purpureae, rugulosae. Squamae ventrales in planta sterili et in fertili quoque ad basin breves, saepe nullae, in apice vero praesertim plantae fructiferae crebriores, bifidae, lanceolatae, marginem excedentes, sursum flexae, violaceae. Receptacula pleraque monocarpa, rugosa, crenatolobata. Pedunculus semilineam, rarius lineam longus, basi nudus vel una alterave lacinia instructus. Involucrum bivalve, diametro $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lin. metiens. Capsula laete viridis. Sporae majores, flavescentes, tetraëdro-polyedrae, cristis sporodermidis prominentibus repandis reticulato-rugosae, sub microscopio ad speciem margine sinuato dilutiore alatae; sporodermis flava, punctato-aspera. Elateres pellucide flavescentes, valde flexuosi, trispiri.

Inflorescentia masculina disciformis in media fronde pone fructificationem femineam saepius apparebat.

3. *Plagiochasma crenulatum* Gottsche.

Pl. fronde subcontinua obovato-lineari dichotoma concava, margine crenulato (in planta sicca convoluto) et subtus atropurpurea, squamis ventralibus semilunaribus marginem frondis nusquam attingentibus in appendiculum obcordatum ellipticumve contractis, fructibus seriatis fere sessilibus, receptaculis 1—3-carpis subtus aequae ac basi pedunculi $\frac{1}{2}$ —1 linearis paleaceis, capsula flava, elateribus flavis trispiris.

β , *minor*, fronde angustiore et teneriore.

Frederik Müller fandt denne Plante (δ og φ) med moden Frugt i Districtet Orizaba; Varieteten β samlede Liebmann i Districtet Chinantla i Departementet Oajaca i April. (Hb. Liebm. n. 519).

Plantae intricatae in latis caespitibus et stratis sibi invicem superimpositis crescentes, frondes pollicem et ultra longas et 3—4 lineas latas, statu sicco convolutas, humectatas concavas, marginibus adscendentibus crenulatas subtusque atropurpureas rugulosas habent. Squamae ventrales semilunares nusquam frondis marginem attingentes, appendiculatae; anteriores appendiculum ellipticum vel ovale totum hyalinum monstrant, in reliquis appendiculum inter laminas vitreas compressum ad speciem cordatum margine angulato-repandum basi rubrum apiceque hyalinum appetat. Fructus seriati plerumque 3—4; receptacula plerumque 2—3-carpa, interdum superne rubra, propter parvam pedunculi ($\frac{1}{2}$ —1 linearis, rarissime 2—3 linearis) longitudinem frondi incumbunt. Involucrum ochraceum magnitudine seminis rapae; paleae receptaculi lineari-lanceolatae, elongatae, 1 lineam fere longae, medio violaceae, basi et apice hyalinae; paleae baseos pedunculi rariores, similes. Capsula flava, margine lacera secundum legem generis, et basi calyptre adhuc vestita. Semina flava, subtetraëdra vel tetraëdro-polyedra, reticulatim cristato-rugulosa ad speciem foveolata. Elateres flavi, flexuosi, interdum furcati, trispiri.

Disci antheriferi in innovationibus propriis e ventre ortis vel rarius in fronde principali, semicirculares apice emarginati, $\frac{1}{4}$ lin. elevati, margine violaceo praediti paleisque lanceolatis violaceis apice hyalinis basi flavescentibus parcis adpressis vestiti, in superficie porosa 50—60 tubercula monstrantes.

A *Plagiochasmate intermedio* frondis habitu margineque crenulato, fructibus plerumque quatuor seriatis et elateribus trispiris, a *Plagiochasmate elongato* toto habitu et frondis robustioris margine crenulato facile dignoscendum; a *Plagiochasmate Mexicano* et *valido* fructibus minoribus et squamis ventralibus nec apice frondis marginem attingentibus diversum est.

4. *Plagiochasma Mexicanum* *Lindbg. et Gottsche.*

Pl. fronde subcontinua obovato-lineari simplici bifidave concava, marginibus crispis convolutis, squamis ventralibus ovato-lanceolatis, superioribus apice subulatis prominentibus, fructibus subseriatis majoribus, pedunculo basi paleaceo, receptaculo di- (rarius 1—3-) carpo subtus barbato, capsula flava, seminibus minoribus, elateribus trispiris.

Synops. Hep. p. 519. n. 11.

Liebmann fandt denne Art paa Kalkhøiene ved San Lorenzo Tehuacan i Mai med moden Frugt. (Hb. Liebm. n. 71.)

Frondes caespitose intricatae, lineas 6—9 longae, obovatae vel sublineares, semper tamen apice aliquantum dilatatae; si expansae sunt, basi 1—1½ lineas latae, apice duplo latiores, simplices bifidae, latere innovantes, subtus denso fibrillarum villo e media planta proveniente terrae et sibimet ipsis affixae, medio subcarnosae, margine membranaceae sinuato-crenulatae, crispatae, subtus membrana purpurea transverse plicato-rugulosa tectae. Margines adscendent et praesertim siccitate convolvuntur. Squamae ventrales ovatae, ad basin frondis minores, supremae lanceolatae marginem nonnihil superantes, apice subulatae, albidae. Fructiferae frondes paullo breviores, squamis crebrioribus longioribusque instructae. Fructus e media fronde prodeuntes, saepe seriati, majores; pedunculus vix linearis, purpureus, basi paleis brevibus circumdatus. Receptaculum plerumque dicarpum, rarius 1—3-carpum, subtus barbatum; involucrum bivalve, ochraceum, satis magnum. Capsula flava matura ad normam generis lacera, basi calyptae residuis pistillo adhuc instructis circumdata. Elateres flexuosi, flavi, trispiri, medio canalis centralis vestigium tantummodo monstrantes. Sporae tetraëdro-polyedrae, cristis repandis reticulato-rugosae, quapropter in imagine microscopica ad speciem margine undulato alatae sunt; sporodermis punctato-aspera.

Propius hoc accedit ad *Plagiochasma Aitoniam*, sed differt frondium marginibus magis crispatis, siccitate omnino convolutis; frons madefacta marginibus adscendentibus fit concava quidem, sed tamen canalem tam conspicuum, quam in *Plag. Aitoniam*, non ostendit. Exemplaria Capensia *Plag. Aitoniae*, ab Ecklon et Pappe lecta, speciei nostrae valde affinia sunt eique forsitan sententia beati Lindenbergii addicenda.

XXXIII. *Marchantia Linn.* — *Synops. Hep. p. 521.*

1. *Marchantia polymorpha Linn.*

M. receptaculis femineis stellatis radiis teretibus, involucris contiguis pleiocarpis margine laciniis ciliato-dentatis fimbriatis, fronde dichotomo-lobato canaliculata subtus pliato-venulosa squamulosa.

A. *communis*, tenuior, laciniis planiusculis, marginibus haud adscendentibus minus lobatis undulatisve, costa media saepe colorata, pedunculis gracilio-ribus receptaculi feminei radiis saepe longioribus.

α, *aquatica*, laciniis magis minusve elongatis late linearibus subcuneatisve, costa media saepe colorata.

Synops. Hep. p. 523.

Frederik Müller fandt denne Art med fuldkommen Frugt i Omegnen af Vulkanen Orizaba (n. 2245).

2. *Marchantia disjuncta Sullivant.*

M. receptaculo femineo excentrico subseptem-radiato, radiis apice cuneato-dilatatis emarginato-crenulatis subtus dense barbatis, involucro mono-tricarpo subintegerrimo, receptaculo masculo semicirculari septemradiato, radiis usque ad brevem pedunculum discretis, fronde dichotoma et articulatim innovante.

Synops. Hep. p. 789. n. 10 b. Sullivant Mosses et Hepatic. of the United States p. 86. n. 2.

Liebmann samlede denne Art (♀) i Departementet Vera Cruz i Nærheden af Sta Maria Tlapacoyo paa Plantagen Hacienda de Jovo (1800—2000'). Frederik Müller fandt den i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Aserradero de Santa Cruz i Juli med Frugt.

3. *Marchantia tholophora Bischoff.*

M. receptaculo femineo excentrico 8—9-radiato conico-umbonato papillato subtus longe barbato, radiis arcuato-deflexis ad medium usque connexis apice dilatatis emarginatisque imberibus, involucris pleiocarpis margine ciliis purpurascentibus fimbriatis, pedunculo dense piloso basi paleis vaginato, fronde oblonga biloba viridi subtus purpurascente.

Synops. Hepat. p. 531. n. 17.

Ved Gruber i Omegnen af Oajaca fandt Sommerschu denne Plante med fuldkommen Frugt og Hanplanten samlede Liebmann i Districtet Chinantla.

4. *Marchantia chenopoda* Linn.

M. receptaculo femineo excentrico hemisphaerico subquinquelobo, lobis obtusis subcrenatis subinde obsoletis, involucris margine hyalino denticulatis, masculo dimidiato palmatim quadri-quinquefido, fronde linearis dichotoma subpalmata.

Synops. Hepat. p. 535. n. 23.

Liebmam fandt denne Art i Nærheden af Indianerbyen Comaltepec paa Sukkerplantagen Trapiche de la Concepcion (3000') i Districtet Chuapam i Departementet Oajaca, ♂ og ♀, og ved Mirador ♂ og ♀ i en yngre Tilstand; Fred. Müller samlede ♂ og ♀ i Omegnen af Orizaba paa Sierra de Agua og ♂ ved Cordova.

XXXIV. *Dumontiera Reinw., Blume et Nees ab Es.*

Synops. Hep. p. 542.

1. *Dumontiera hirsuta* Reinw., Blume et Nees ab Es.

D. receptaculo femineo (polycarpo) convexo setulis insperso, margine involucrisque hirsutissimis subtus circa pedunculum barbato, fronde dichotoma crenulato-undulata subtus hirsuta.

Formae variae inveniuntur, quae receptaculis plus minusve setulosis et fronde modo latiore modo angustiore, modo continua modo iterum innovationibus crebris et brevioribus multilobata, denique frondis teneritate diversae videntur.

α , *latior*, fronde apice dilatata 4—6 lin. lata, dichotoma, continua, receptaculo setuloso.

β , *angustior*, fronde 3 lin. lata, innovationibus multilobata, receptaculo parvo valde setuloso.

β^* , *depauperata*, fronde 1—2 lin. lata, receptaculis di-tricarpis pusillis, barba obsoleta.

γ , *macrospora*.

Synops. Hepat. p. 543. n. 3.

Allerede Alexander von Humboldt har samlet denne Plante i Mexico; Liebmam fandt den brede Form af Planten α i Districtet Chinantla, den smallere Form β og β^* med fuldkommen Frugt i April og Mai paa Plantagen Mirador (3000') og ved Colipa (500—800') i Departementet Vera Cruz.

XXXV. Reboulia Nees ab Es. — Synops. Hep. p. 547.
1. Reboulia hemisphaerica Raddi.

R. frondibus dichotomis et articulatim innovantibus extremitate emarginato-rotundatis supra viridibus subtus purpureis, receptaculi barba filiformi angustissima.

β , *gracilis*, receptaculis minoribus pro magnitudine frondis parvis, deplanatis, pedunculo tenuiore atropurpureis; discis antheriferis semicircularibus antice subemarginatis.

Synops. Hep. p. 548. n. 1. var. δ .

Frederik Müller fandt denne Plante i Districtet Orizaba i en Grøft ved Ranchoen Norden for Byen, voxende sammen med *Marchantia chenopoda*, i Januar med udstøvet Frugt.

Exemplaria nostra longitudinem peduncularum supra dictam non habent, sed $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{4}$ pollicem metiuntur; diameter maximi capituli erat sesquilinearis; frondes dichotomae 1 pollicem longae, 3—4 lineas latae; discus antherifer latissimus in frondis apice juxta et pone pedunculum $\frac{3}{4}$ lin. metiebatur. Paleae parcae coloratae conspiciebantur in basi pedunculi, violaceae in margine disci antheriferi et albidae sub receptaculo dependentes.

XXXVI. Duvalia Nees ab Es. — Synops. Hep. p. 553.
1. Duvalia tenera Gottsche.

D. receptaculo femineo magno plano-convexo margine membranaceo-crenato subtus nudo, fronde membranacea obcordata crenulata venuloso-lacunosa.

Synops. Hep. p. 554. n. 2.

Alexander von Humboldt samlede denne Plante ved Ario.

XXXVII. *Fimbriaria* Nees ab Es. — *Synops. Hep.* p. 555.

1. *Fimbriaria echinella* Gotsche.

F. fronde linear-i-oblonga subtus ad margines versus purpurascente atropurpureave, squamulis ovato-lanceolatis (interdum bifidis) margines non nisi ad apicem attingentibus, pedunculo decolore paleis violaceis longissimis creberrimisque piloso, receptaculo femineo convexo mono-tetracarpo muricibus longioribus cavis echinato subtus prolixo barbato, perianthiis dependentibus flavescentibus apice subviolaceis, disco antherifero apicali subelevato obcordato paleis violaceis margine fimbriato.

Frederik Müller fandt denne Art i Districtet Orizaba ved Engenio i November, i hvilken Tid Frugten først begynder at modnes.

Frondes 1 pollicem longae, 2 lineas latae, medio secundum carinam subtus paullo prominentem subdepressae, margine subrepanda vel leviter crenatae subundulataeque; subtus interdum virides, sed plerumque plus minus purpureae praesertim versus margines, interstitio virescente inter squamulas et margines intermedio. Squamae a costa ortae, ad dimidiam fere latitudinem spatium inter costam et margines explentes, ovato-lanceolatae, interdum bifidae, totae purpureae vel medio tantum marginaque hyalino latiore angustioreve circumdatae, apice intensius coloratae et cellulis, reliquis duplo triplove majoribus, compositae.

E costa proveniunt innovationes laterales promiscue femineae et masculares, pollinicares, altero fine receptaculum femineum ferentes iterumque laterales innovationes promentes; in lacinia musculari innovatio plerumque ex apice oritur sub ipso disco antherifero vel paullum ad latus conversa. Costa elongatur in pedunculum decolorem, 3—4-linearem, basi plerumque nudum, sed deinde paleis angustis longissimisque vestitum, et apice sub receptaculo barba prolixa ornatum. Receptaculum femineum convexum, mono-tetracarpum, papillis longioribus, cavis, 1 millim. fere longis echinatum vel muricatum principalem characterem hujus speciei sistit. Perianthia deorsum spectantia, obovata, secundum legem generis apice tubulo parvo coronata, flavicantia apicem versus fuscescens vel violacea praesertim in costis. Capsula bulbo parvo (loco pedunculi) insidens, sessilis ex unico cellularum angulis paullum incrassatarum strato confecta, flava. Sporae magnae, fuscae, inflatae, margine flavo undulato late alatae; sporodermis externa punctato-granulosa, cristulis elevatis latioribus reticulata, in alae margine granulato-crenulata appareat; seminis membrana interior flava, laevissima. Elateres fere aequales, breves, 3—4 sporarum diametros longitudine aequantes, raro curvati et furcati, tubulum hyalinum clausum fibra spirali flava tenuiore percursum et praeterea canalem plus minus completum vel hic et illuc interstitia minora aëre repleta monstrant. Inveniuntur rarius duae fibrae spirales completae in elatere, saepius

autem incompletae, ita ut tantummodo in medio fibram accessoriam spiralem videas, anfractibus summis et imis simplicibus. Inflorescentia mascula in lacinia diversa apicalis vel etiam, ut videtur, in planta diversa; discus antherifer obcordatus, in apice frondis, altero fine emarginatus, altero plus minus obtusus, paullum elevatus, margine paleis longis violaceis angustis fimbriatus; in disco numeravi circiter 50—60 papillas antheriferas; innovatio, quas lacinia mascula edit, rursus mascula est, quod e palearum situ in frondis apice videre licet.

2. *Fimbriaria elegans Sprengel.*

F. fronde linearis subsimplici subtus abrupte carinata rugulosa violacea, pedunculo fusco superne piloso, receptaculo femineo e perianthiorum declivitate convexiusculo papillato-tuberculoso subquadrilobo subtus paleaceo, margine papillis prominentibus crenulato, perianthiis ovatis tubulo coronatis rimosis denique octofidis.

β . *Beyrichiana*, perianthiis acuminatis, barba rubella longiore, pedunculo intensius colorato et pilosiore, fronde fructifera e latere oriente minima, subtus variegata.

β^* , *intermedia*, frondis fructiferae circumscriptio, magnitudine et colore purpureo faciei ventralis ad formam γ *Cubensem* transiens.

β^{**} *alpina*.

γ , *obtusata*, receptaculis majoribus purpureo-violaceis papillis brevioribus, perianthiis obtusioribus minoribus violaceis, pedunculis atropurpureis pilosioribus, fronde fructifera e latere oriente minima.

Synops. Hep. p. 564. n. 13.

Varieteten β og β^* fandtes i Omegnen af Jalapa (Beyrich, Schiede og Deppe); den alpine Form samlede Liebmann paa Vulkanen Orizaba, og Varieteten γ paa Sukkerplantagen Trapiche de la Concepcion (3000') i Nærheden af Zapotekbyen Comaltepec i Districtet Chuapam i Departementet Oajaca. Fr. Müller fandt den ligeledes i Districtet Orizaba.

XXXVIII. Targionia Micheli. — Synops. Hepat. p. 574.

1. Targionia convoluta Lindbg. et Gottsche.

F. fronde obovata prolifera subsimplici margine adscendentibus convolutis integerimis, squamis subobovato-rotundis marginem non attingentibus integerrimis, involucro magno obovato.

Synops. Hepat. p. 576. n. 4.

Liebmann samlede denne Plante i de fugtige skyggefulde Skove af Districtet Chinantla i Departementet Oajaca. (Hb. Liebm. n. 421 b, 424 b, 469, 520.)

Frondes lineas 3—8 longae, proliferae, simplices, rarius apice furcatae, expansae 2—3 lin. latae, supra virides, subtus purpurascentes, marginibus adscendentibus convolutis ut (praesertim statu sicco) major plantae pars teres videatur et superficies (apice in sterili stirpe excepto) omnino non conspiciantur. Margo integerrimus vel obsolete crenulatus. Squamae ad costam breves, ovato-semicirculares, ad apicem plantae majores, haud tameu marginem attingentes, integerrimae, interdum obsolete. Involucrum magnum obovatum, valvae purpurascentes; capsula breviter pedicellata lacera; elateres tenues flexuosi utrinque attenuati, nonnulli ramosi; semina valde tuberculata.

A *Targionia Micheli* & *angusta* majore statura, fronde marginibus adscendentibus convoluta, involucro longiore distinguitur.

2. Targionia Mexicana Lehm. et Lindbg.

T. fronde linearis bifurca prolifero-ramosa marginibus undulatis purpureis subtus concolore, costa valida flavescente squamis costalibus alternis appressis parvis triangularris (saepe tridentatis) ad apicem versus elongatis a margine longissime distantibus, involucro hemisphaericum.

Synops. Hep. p. 576. n. 6.

Dr. Schiede fandt denne Art, sandsynligviis i Nærheden af Jalapa. (Herb. Berolin. n. 106.)

XXXIX. Cyathodium Kunze. — Synops. Hep. p. 577.

1. Cyathodium cavernarum Kunze.

Synops. Hep. p. 577. n. 1.

Frederik Müller samlede af denne Plante en lidet Tue med fuldkommen moden Frugt i Districtet Orizaba imellem andre Hepaticae.

L. Anthoceros Mich. — Synops. Hep. p. 583.

Gottsch Uebersicht etc. in Mohl et Schl. Botan. Ztg. (Beilage p. 18 sqq.) 1858.

§ 1. Elateres pluricellulares fibra spirali depicti.

1. Anthoceros laciniatus Schweinitz.

A. fronde maxima enervi multifida plana lobis multiformibus laciniata, aliis linearioribus oblongis, aliis latis rotundatis margine plicatis crenatis et laciniatis, capsulis sparsis rarissimis maximis in media fronde, involucro elongato, seminibus flavis circuitu repandis ceteroquin laevibus.

Synops. Hep. p. 587. n. 10.

Liebmann fandt denne Art paa Mexico's Østkyst i Departementet Vera Cruz ved Colipa (5—800') i Marts med fuldkommen moden Frugt. (Hb. Liebm. n. 142.)

Frons $\frac{1}{2}$ —1-pollicaris. Involucrum $1\frac{1}{2}$ lin. longum. Capsula 1— $2\frac{1}{2}$ poll. longa. Elateres e cellulis 4—6 compositi, in tubulo hyalino ad speciem simplici fibram latam flavam spiralem monstrant, quae locis conjunctis annulo angustissimo contiguo arctissime cohaerent, ut accuratior demum observator compositionem e pluribus cellulis videat. Sporae flavae, ovato-angulatae margine crenulato-repandae; sporodermis laevis.

Exemplaria Mexicana capsulam paullo tenuiorem et flexibiliorem habent, ceteroquin cum exemplari originali a Schweinitzio dato, fide Lindenbergii, ad amussim congruunt.

§ 2. Elateres e cellulis articulatim compositi sine fibra spirali.

2. Anthoceros punctatus Linn.

A. fronde enervi circulari turbinata sinuata laciniata, superficie papuloso-reticulata, involucro tubuloso truncato ore scarioso, seminibus nigris foveolatis, basi muricatis.

a, cavernosus, fronde crassa lobulata et denticulata, capsulis crassiusculis fusco-nigris.

Synops. Hepat. p. 583. n. 2.

Fr. Müller samlede denne Plante i Districtet Orizaba med moden Frugt.

3. *Anthoceros venosus* *Lindbg. et Gottsche.*

A. fronde obovata 2—3-fida margine lobato-crenata crispata medio concava venoso-rugulosa (venis subtus prominentibus) involucro cylindrico truncato, capsula angusta incurva acuta, seminibus nigris muricatis.

Synops. Hepat. p. 584. n. 3.

Liebmann fandt denne Plante ved Indianerlandsbyen Alpatlahua med moden Frugt i September. (Hb. Liebm. n. 460.)

Frondes 4—6 lineas longae, obovatae, rarius simplices, plerumque 2—3-fidae, medio concavae, membranaceae et venis percursae subtus prominentibus, margine lobato-crenatae, crispulae. Fibrillae breves e medio plantae incrassato oriuntur. Involucrum cylindraceum, sesquilineare, paullum curvatum, aequale, apice truncato-excisum. Capsula lineas 6—12 longa, angusta, curvata, acuta. Elateres et semina omnino similia illis, quae in *A. punctato* reperiuntur, sed sporodermis inter murices minus foveolata videtur.

Haec planta Mexicana a formis vulgaribus *Anthocerotis punctati* longius distat, unde beatus Lindenbergius non dubitavit nomen proprium huic imponere; tamen tacere nolumus, hanc quibusdam notis propriis ad formam Capensem *Anthocerotis punctati* accedere.

4. *Anthoceros granulatus* *Gottzsche.*

A. fronde orbiculari-cuneata turbinata sinuato-lobata, involucro tubuloso ore truncato, seminibus fusco-nigris granuloso-scaberrimis.

Fr. Müller fandt denne Plante i Districtet Orizaba med fuldkommen Frugt (n. 2285 og 2287).

Anthocerotis punctato minori omnino similis, nec nisi seminibus ab illo dignoscendus. Lobi margine orbiculari sinuati, 3 lin. fere longi, 2—3 lineas parte latissima lati, cuneati, medio depresso, 1—3 fructus gerentes. Capsula fere pollicaris, vel etiam minor, nigra. Elateres quales in *A. punctato*, sed semina diversa, et hucusque characterem diagnosticum insignem praebent, quia semina nigra granulosa non amplius inventa sunt. Circuitus eorum rotundior est quam in *A. punctato*, et granula, quamquam basin scaberrimam

reddunt, non tam exstant, quam in *A. punctato*; ubi granula confertissima sunt, in iconē microscopica marginem halone pellucido circumdant; sporodermis nigra, in lateribus laevis.

5. *Anthoceros laevis Linn.*

A. fronde enervi plana subradiatim dissecta crenata laeviuscula, involucro cylindrico ore oblique truncato late scarioso, seminibus flavis granulosis basi plerumque granulis elevatis scabriusculis.

Synops. Hepat. p. 586. n. 7.

Liebm̄ann samlede denne Plante i Districtet Vera Cruz paa Sukkerplantagen Hacienda de Mirador (3000') med moden Frugt i Februar. Fr. Müller samlede den i December og Januar ogsaa i moden Tilstand i Omegnen af Vulkanen Orizaba ved Aserradero de Sta Cruz og Engenio (n. 2321).

6. *Anthoceros flexivalvis Nees ab Es. et Gottsche.*

A. fronde enervi planiuscula subradiatim dissecta lobato-crenata laeviuscula, involucro cylindrico ore recta truncata anguste membranaceo, capsulae longae gracilisque valsis postremum serpentino-flexuosis tortisque, seminibus flavis parce granulosis.

Synops. Hep. p. 586. n. 8.

β , *minor*, capsula breviore minus flexuosa.

Liebm̄ann fandt denne Plante i Februar og Marts med moden Frugt paa Plantagen Hacienda de Mirador (3000') i Departementet Vera Cruz (Hb. Liebm. 83 a, 59 — var. β —, 60, 583); Frederik Müller samlede den i Districtet Orizaba ved Rio blanco i Januar med moden Frugt (n. 2325).

Frondes lineas 3—6 longae, e basi angustiore dilatatae, medio incrassatae, subcaudiculatae, subtus fibrillas crebras emittentes, membranaceae, in lobos fissae 2—3 inaequales margine sinuato-crenatos obtusos; interdum lacinula una alterave adest acuta. Involucrum $1\frac{1}{2}$ lin. longum, saepe nonnihil curvatum, cylindricum, rarius apice paullum dilatatum, ore oblique truncatum vel breviter excisum. Capsula pollicaris-sesquiuncialis, tenuissima, acuta, fusca, lucida; valvulae valde flexuosae. Forma β non differt nisi statura minore, textura nonnihil laxiore et capsulae valvulis minus serpentinis. In plantis Mexicanis semina paullo fortiora granula in sporodermide monstrant, quam in planta Breutelianā originali; in planta Venezuelana a cl. Fendlero collecta, plantis Müllerianis omnino congrua, sporodermidem laeviorem, quam in planta originali, inveni.

XLI. Notothylas Sullivant. — Synops. Hep. p. 834 et 792.

1. Notothylas valvata Sullivant.

N. involucro horizontali deflexo corniformi, capsula elongato-cylindrica curvula sutura colorata (fusca) semper instructa, sporis flavo-fuscis fronde orbiculari diametro 3—8 linearie minoreve.

Notothylas valvata Gottsche in Uebersicht p. 20 (Beiblatt) Mohl et Schlechtend.

Bot. Zeitung 1858. — Milde in Mohl et Schlecht. Bot. Ztg. 1859. p. 44.

Carpolipum valvatum Nees ab Es. Synops. Hep. p. 792. n. 2.

Iblundt Jung, *hyalina* fra Vulkanen Orizaba fandt jeg et eneste Exemplar med Frugt.

XLII. Riccia Micheli. — Synops. Hep. p. 598.

1. Riccia membranacea Lindbg. et Gotsche.

R. fronde tenuissima membranacea subcavernosa fibrosa nervosa e basi angustiore subito rotundata margine crenato-sublobata subtus concolor.

Synops. Hep. p. 608. n. 28.

Liebmann fandt denne Plante paa Kanten af en Bjergsump ved Ranchoen Cabrestros ved Rio Nautla i Dep. Vera Cruz i en Baranke neppe 500' over Havet. (Hb. Liebm. n. 451.)

Frondes 2—4 lineas longae et latae, orbiculares, sed brevi basi nonnihil angustatae, margine crenatae vel paullo profundius incisae, lobis brevissimis emarginato-crenatis planae vel ad apices loborum subsulcatae, tenuissimae, membranaceae, medio fibrillis terrae arcte affixae, margine flaccidae, fibris medio in nervum conjunctis percursae, cavernosae, virides, subtus concolores. Fructus sparsi, vel 2—4 in sorulum aggregati. Sporangia oblongo-rotunda stylo longiore apice dilatato obliquo coronata. Sporae luteo-fuscae, subglobosae, margine cinctae.

Textura omnimodo qualis in Ricciellis, sed forma frondis *Ricciae crystallinae* similis, a qua tamen fronde tenuissima membranacea fibroso-nervosa differt. Utrum fructus superne tendant, an paginam inferiorem rumpant, quum egrediuntur, in his parcis exemplaribus videri nequit. (Lindenbergs.)

2. *Riccia fluitans Linn.*

R. fronde ad apicem versus cavernosa dichotoma submembranacea plana aut subcanaliculata fibroso-nervosa viridi in margine subtusque concolore, laciniis linearibus elongatis obtuse emarginato-bifidis apiceve furcato-angustatis.

β , *canaliculata*, angustior margine adscendente sulcata.

Synops. Hepat. p. 610. n. 34.

Liebm. samlede Hovedformen (n. 164) svømmende i en Bæk paa Plantagen Hacienda de Sta Cruz i Nærheden af Tehuantepec i December, og Varieteten β i Nærheden af Jicaltepec ved Rio Nautla i Departementet Vera Cruz. (Hb. Liebm. n. 440.)

Rettelser.

Skrifterne S. 105 (Særtryk S. 9)	Lin. 12 f. o. «Tab. II» læs: Tab. I.
— — (— —)	— 14 — «fig. 4» læs: fig. 4—5.
— » 133 (— » 37)	— 6 f. n. «fig. 6» læs: fig. 5.
— » 183 (— » 87)	— 4 — adde: fig. 6. folium involucrale.
— » 202 (— » 106)	— 18 f. o. «Tab. XIV» læs: Tab. XVII.
— » 217 (— » 121)	— 20 — «fig. 2 sectio longitudinalis perigynii» adde: calyptra fundo tantum, ut fieri solet, adnata; orificium perigonii ciliis parvis undique clauditur ut quasi canalis centralis remaneat.

Register.

	Skrif- terne.	Separat- Aftryk.		Skrif- terne.	Separat- Aftryk.
	Side	Side		Side	Side
<i>Androcryphia</i> N. ab Es.	351.	255.	<i>Chiloscyphus</i> <i>Orizabensis</i> G.	213.	117.
— <i>porphyrorhiza</i> N.	351.	255.	<i>Cyathodium</i> Kze.	370.	274.
<i>Aneura</i> Dumort.	354.	258.	— <i>cavernarum</i> Kze	370.	274.
— <i>palmata</i> N. ab Es.	354.	258.	<i>Dumortiera</i> R. Bl. et N.	365.	269.
— <i>* pinguis</i> Dum.	354.	258.	— <i>hirsuta</i> R. Bl. et N.	365.	269.
<i>Anthoceros</i> Micheli	370	274.	<i>Duvalia</i> N. ab Es.	366.	270.
— <i>flexivalvis</i> N. ab Es. et G. .	372.	276.	— <i>tenera</i> G.	366.	270.
— <i>granulatus</i> G.	371.	275.	<i>Fimbriaria</i> N. ab Es.	367.	271.
— <i>laciniatus</i> Schwein.	370.	274.	— <i>echinella</i> G.	367.	271.
— <i>laevis</i> Linn.	372.	276.	— <i>elegans</i> Spr.	368.	272.
— <i>punctatus</i> Linn.	370.	274.	<i>Fossombronia</i> Raddi	351.	255.
— <i>venosus</i> Lg. et G.	371.	275.	— <i>carinata</i> Lg. et G.	351.	255.
<i>Bryopteris</i> Lg.	263.	167.	<i>Frullania</i> Raddi	329.	233.
— <i>diffusa</i> N. ab Es.	265.	169.	— <i>aeolotis</i> N. ab Es.	335.	239.
— <i>filicina</i> N. ab Es.	263.	167.	— <i>arietina</i> Tayl.	331.	235.
— <i>flaccida</i> Lg. et Hpe.	266.	170.	— <i>atrata</i> N. ab Es.	350.	254.
— <i>Liebmanniana</i> Lg. et G. . .	264.	168.	— <i>Brasiliensis</i> Raddi	342.	246.
— <i>Trinitensis</i> Lg.	265.	169.	— <i>connata</i> Lg. et G.	347.	251.
<i>Calypogeia</i> Raddi	220.	124.	— <i>cucullata</i> Lg. et G.	345.	249.
— <i>laxa</i> Lg. et G.	221.	125.	— <i>cylindrica</i> G.	343.	247.
— <i>Peruviana</i> M. N.	220.	124.	— <i>Deppii</i> G.	341.	245.
— <i>Trichomanis</i> Cord.	220.	124.	— <i>Eckloni</i> Spr.	332.	236.
<i>Chiloscyphus</i> Cord.	210.	114.	— <i>ericoides</i> N. ab Es.	335.	239.
— <i>amphibolius</i> N. ab Es. . .	210.	114.	— <i>gibbosa</i> N. ab Es.	329.	233.
— <i>combinatus</i> N. ab Es. . .	211.	115.	— <i>hians</i> Lg. L.	333.	237.
— <i>fragilifolius</i> Tayl.	218.	122.	— <i>Hutchinsiae</i> N. ab Es.	338.	242.
			— <i>Leiboldii</i> Lg. et G.	344.	248.

	Skrif- terne.	Separat- Aftryk.		Skrif- terne.	Separat- Aftryk.
	Side	Side		Side	Side
<i>Frullania Liebmanniana</i> Lg. et G.	349.	253.	<i>Jungermannia linguifolia</i> G.	182.	86.
— <i>Lindbergiana</i> G.	336.	240.	— <i>minuta</i> Crantz	189.	93.
— <i>Lindenbergii</i> G.	340.	244.	— <i>multiceps</i> Lg. et G.	201.	105.
— <i>longicollis</i> Lg. et G.	346.	250.	— <i>nuda</i> Lg. et G.	183.	87.
— <i>Mexicana</i> Lg.	337.	241.	— <i>Orizabensis</i> G.	181.	85.
— <i>microcephala</i> G.	347.	251.	— <i>parcea</i> G.	190.	94.
— <i>Miradorensis</i> Lg. et G.	343.	247.	— <i>porphyroleuca</i> N. ab Es.	187.	91.
— <i>Moritziana</i> Lg. et G.	344.	248.	— <i>renitens</i> Hb. Berol.	149.	53.
— <i>sagittistipula</i> Lg. et G.	348.	252.	— <i>setacea</i> Web.	195.	99.
— <i>Sebastianopolitana</i> Lg.	330.	234.	— <i>subapicalis</i> N. ab Es.	179.	83.
— <i>semiconnata</i> Lg. et G.	338.	242.	— <i>subtilis</i> Lg. et G.	195.	99.
— <i>semivillosa</i> Lg. et G. V.	336.	240.	— <i>succulenta</i> L. Lg.	180.	84.
— <i>squarrosa</i> N. ab Es.	334.	238.	— <i>trichophylla</i> Linn.	196.	100.
— <i>triquetra</i> Lg. et G.	340.	244.	<i>Lejeunia</i> Lg. et G.	276.	180.
— <i>turfosa</i> Lg. et G.	339.	243.	— <i>aberrans</i> Lg. et G.	284.	188.
<i>Gymnanthe Liebmanniana</i> vid. <i>Lindigia</i>	216.	120.	— <i>adnata</i> Kze	311.	215.
<i>Gymnomitrium</i> N. ab Es.	101..	5.	— <i>ambigua</i> Lg. et G.	315.	219.
— ? <i>miniatum</i> Lg. et G.	101.	5.	— <i>amoena</i> G.	305.	209.
<i>Isotachis</i> Mitten	200.	104.	— <i>angusta</i> L. Lg.	318.	222.
— <i>multiceps</i> G.	201.	105.	— <i>assimilis</i> Lg. et G.	299.	203.
<i>Jungermannia</i> Linn.	176.	80.	— <i>axillaris</i> N. ab Es.	283.	187.
— <i>amoena</i> Lg. et G.	182.	86.	— <i>Brasiliensis</i> G.	325.	229.
— <i>bicuspidata</i> Linn.	191.	95.	— <i>cardiocarpa</i> M.	325.	229.
— <i>callithrix</i> Lg. et G.	184.	88.	— <i>cerina</i> L. Lg.	302.	206.
— <i>catenulata</i> Hüben.	190.	94.	— <i>concava</i> Lg. et G.	302.	206.
— <i>colorata</i> L. Lg.	181.	85.	— <i>conferta</i> Meissn.	291.	195.
— <i>concreta</i> G.	178.	82.	— <i>contigua</i> N. ab Es.	304.	208.
— <i>conformis</i> Lg. et G.	177.	81.	— <i>cordistipula</i> Lg. et G.	297.	201.
— <i>congesta</i> L. Lg.	186.	90.	— <i>Crescentiae</i> Lg. et G.	286.	190.
— <i>crassifolia</i> Lg. et G.	193.	97.	— <i>cucullata</i> N. ab Es.	322.	226.
— <i>curvifolia</i> Dicks.	194.	98.	— <i>deplanata</i> N. ab Es.	308.	212.
— <i>decipiens</i> Hook.	174.	78.	— <i>devexa</i> Lg. et G.	281.	185.
— <i>exsecta</i> Schmid.	176.	80.	— <i>diversifolia</i> G.	323.	227.
— <i>hyalina</i> Lyell.	185.	89.	— <i>diversistipa</i> Lg. et G.	316.	220.
— <i>incisa</i> Schrad.	188.	92.	— <i>dubiosa</i> Lg. et G.	286.	190.
— <i>intricata</i> Lg. et G.	189.	93.	— <i>elliptica</i> L. Lg.	327.	231.
— <i>Liebmanniana</i> Lg. et G.	218.	122.	— <i>flaccida</i> Lg. et G.	298.	202.
			— <i>flava</i> Sw.	315.	219.
			— <i>flavicans</i> G.	301.	205.

	Skrift- terne.	Separat- Aftryk.			Skrift- terne.	Separat- Aftryk.
	Side	Side			Side	Side
<i>Lejeunia Guianensis</i> N. et M.	326.	230.	<i>Lejeunia xanthophylla</i> Lg.	312.	216.	
— <i>Hobsoniana</i> Lg.	277.	181.	— <i>variabilis</i> Lg.	327.	231.	
— <i>Huitamalceensis</i> Lg. et G.	308.	212.	<i>Leiocyphus</i> Mitten	218.	122.	
— <i>incongrua</i> Lg. et G.	281.	185.	— <i>Liebmannianus</i> G.	218.	122.	
— <i>laeta</i> L. Lg.	317.	221.	<i>Lepidozia</i> N. ab Es.	222.	126.	
— <i>laevicalyx</i> G.	317.	221.	— <i>cupressina</i> Lg.	223.	127.	
— <i>lanceolata</i> G.	300.	204.	— <i>Hampeana</i> Lg.	223.	127.	
— <i>Leiboldiana</i> G.	301.	205.	— <i>reptans</i> N. ab Es.	222.	126.	
— <i>levida</i> Lg. et G.	320.	224.	— <i>truncatella</i> N. ab Es.	224.	128.	
— <i>lunulata</i> N. ab Es.	288.	192.	<i>Leptoscyphus Liebmannianus</i> Mitten .	218.	122.	
— <i>Magnoliae</i> Lg. et G.	313.	217.	<i>Lindigia</i> G.	216.	120.	
— <i>marginata</i> L. Lg.	324.	228.	— <i>Liebmanniana</i> G.	216.	120.	
— <i>Melastomatis</i> Lg. et G.	313.	217.	—? <i>Mülleri</i> G.	217.	121.	
— <i>Mexicana</i> Lg.	285.	189.	<i>Lophocolea</i> N. ab Es.	202.	106.	
— <i>microdonta</i> G.	293.	197.	— <i>aberrans</i> Lg. et G.	208.	112.	
— <i>Mülleriana</i> G.	280.	184.	— <i>bidentata</i> N. ab Es.	205.	109.	
— <i>opaca</i> G.	304.	208.	— <i>connata</i> N. ab Es.	204.	108.	
— <i>oxyloba</i> Lg. et G.	310.	214.	— <i>granulosa</i> G.	205.	109.	
— <i>pallida</i> Lg. et G.	307.	211.	— <i>Liebmanniana</i> G.	209.	113.	
— <i>parvistipula</i> Lg. et G.	306.	210.	— <i>Martiana</i> N. ab Es.	202.	106.	
— <i>perigonialis</i> G.	319.	223.	— <i>muricata</i> L. Lg.	209.	113.	
— <i>phylllobola</i> N. ab Es.	309.	213.	— <i>terminalis</i> Lg. et G.	207.	111.	
— <i>phyllorhiza</i> N. ab Es.	276.	180.	<i>Madotheca Dumort</i>	249.	153.	
— <i>piriformis</i> Lg. et G.	321.	225.	— <i>alpina</i> Lg. et G.	255.	159.	
— <i>proboscidea</i> G.	321.	225.	— <i>cognata</i> Lg. et G.	257.	161.	
— <i>Raddiana</i> Lg.	293.	197.	— <i>divergens</i> Lg. et G.	260.	164.	
— <i>radicans</i> Lg. et G.	319.	223.	— <i>elongata</i> Lg. et G.	256.	160.	
— <i>Sagraeana</i> Mont.	278.	182.	— <i>expansa</i> Lg. et G.	259.	163.	
— <i>seriata</i> Lg. et G.	311.	215.	— <i>intermedia</i> G.	254.	158.	
— <i>spiniloba</i> Lg. et G.	309.	213.	— <i>Leiboldi</i> G.	253.	157.	
— <i>stenophylla</i> Lg. et G.	328.	232.	— <i>Liebmanniana</i> Lg. et G.	250.	154.	
— <i>stricta</i> Lg. et G.	294.	198.	— <i>Mexicana</i> Hpe	261.	165.	
— <i>Sullivanti</i> G.	292.	196.	— <i>Mülleri</i> G.	249.	153.	
— <i>tenera</i> Sw.	329.	233.	— <i>navicularis</i> N. ab Es.	262.	166.	
— <i>tenuistipula</i> Lg. et G.	295.	199.	— <i>Neesiana</i> Lg.	258.	162.	
— <i>thymifolia</i> N. ab Es.	314.	218.	— <i>platyphylloidea</i> N. ab Es. . . .	262.	166.	
— <i>unciloba</i> Lg.	290.	194.	— <i>semiteres</i> Lg. et G.	262.	166.	
— <i>undulata</i> Lg. et G.	296.	200.	— <i>Swartziana</i> Lg.	261.	165.	
— <i>unidentata</i> L. Lg.	324.	228.	<i>Marchantia</i> Linn.	364.	268.	
— <i>xanthocarpa</i> L. Lg.	289.	193.				

	Skrift- terne.	Separat- Aftryk.		Skrift- terne.	Separat- Aftryk.
	Side	Side		Side	Side
<i>Marchantia chenopoda</i> Linn.	365.	269.	<i>Plagiochasma</i> L. Lg.	360.	264.
— <i>disjuncta</i> Sull.	364.	268.	— <i>crenulatum</i> G.	362.	266.
— <i>polymorpha</i> Linn.	364.	268.	— <i>elongatum</i> Lg. et G. . . .	361.	265.
— <i>tholophora</i> Bisch.	364.	268.	— <i>intermedium</i> Lg. et G. . .	360.	264.
<i>Mastigobryum</i> N. ab Es.	224.	128.	— <i>Mexicanum</i> Lg. et G. . .	363.	267.
— <i>acuminatum</i> Lg. et G. . .	227.	131.	<i>Plagiochila</i> N. M	103.	7.
— <i>affine</i> Lg. et G.	230.	134.	— <i>acanthoda</i> Lg. et G.	113.	17.
— <i>arcuatum</i> Lg. et G. . . .	224.	128.	— <i>adiantoides</i> Lg.	145.	49.
— <i>denticulatum</i> Lg. et G. . .	232.	136.	— <i>aërea</i> Tayl.	141.	45.
— <i>Liebmannianum</i> Lg. et G. . .	229.	133.	— <i>affinis</i> Lg. et G.	154.	58.
— <i>Müllerianum</i> G.	225.	129.	— <i>aliena</i> G.	118.	22.
— <i>Orizabense</i> G.	226.	130.	— <i>alternans</i> Lg. et G.	159.	63.
— <i>planiusculum</i> Lg. et G. . .	233.	137.	— <i>anomala</i> Lg. et G.	158.	62.
— <i>stoloniferum</i> Lg.	231.	135.	— <i>apicalis</i> G.	125.	29.
— <i>Taleanum</i> G.	227.	131.	— <i>asplenoides</i> M. N.	158.	62.
— <i>teretiusculum</i> Lg. et G. . .	228.	132.	— <i>Barutana</i> G.	119.	23.
<i>Metzgeria</i> Raddi	357.	261.	— <i>bicuspidata</i> G.	139.	43.
— <i>dichotoma</i> Synops.	358.	262.	— <i>bifaria</i> Lg.	170.	74.
— <i>fureata</i> N. ab Es.	357.	261.	— <i>bursata</i> Lg.	140.	44.
— <i>Liebmanniana</i> Lg. et G. . . .	358.	262.	— <i>Chinantlana</i> G.	108.	12.
<i>Monoclea</i> Hk.	359.	263.	— <i>Columbica</i> G.	142.	46.
— <i>Forsteri</i> Hk.	359.	263.	— — <i>β Orizabensis</i>	142.	46.
<i>Notothylas</i> Sulliv.	373.	277.	— <i>compressula</i> N.	171.	75.
— <i>valvata</i> Sulliv.	373.	277.	— <i>connata</i> Lg. et G.	156.	60.
<i>Omphalanthus</i> Lg. N.	272.	176.	— <i>contigua</i> G.	126.	30.
— <i>debilis</i> Lg.	272.	176.	— <i>crispata</i> G.	167.	71.
— <i>filiformis</i> N. ab Es. . . .	272.	176.	— <i>cucullata</i> Lg. et G.	166.	70.
— <i>isocalycinus</i> N. ab Es. . .	274.	178.	— <i>cucullata</i> β Synops.	127.	31.
— <i>lusorius</i> Lg. et G. . . .	275.	179.	— <i>cuneata</i> Lg. et G.	137.	41.
— <i>subalatus</i> Lg. et G. . . .	273.	177.	— <i>decipiens</i> N. M.	174.	78.
<i>Phragmicomia</i> Dumort.	266.	170.	— <i>demissa</i> G.	133.	37.
— <i>bicolor</i> N. ab Es.	268.	172.	— <i>dimorpha</i> Lg. et G.	103.	7.
— <i>Bongardiana</i> Lg.	266.	170.	— <i>distinctifolia</i> Lg.	128.	32.
— <i>Guilleminiana</i> N. M. . . .	267.	171.	— <i>distinctifolia</i> γ Synops. . . .	110.	14.
— <i>Leiboldiana</i> Lg. et G. . . .	269.	173.	— <i>diversifolia</i> Lg. et G.	143.	47.
— <i>Liebmanniana</i> Lg. et G. . .	270.	174.	— <i>dubia</i> Lg. et G.	112.	16.
— <i>polycarpa</i> N. ab Es. . . .	268.	172.	— <i>exesa</i> Lg. et G.	122.	26.
— <i>teretiuscula</i> Lg. et G. . . .	271.	175.	— <i>expansa</i> G.	114.	18.
			— <i>fastigiata</i> Lg. et G.	173.	77.
			— <i>flavescens</i> G.	148.	52.

	Skrift- terne.	Separat- Aftryk.		Skrift- terne.	Separat- Aftryk.
	Side	Side		Side	Side
Plagiochila frausa G.	162.	66.	Plagiochila stolonifera Lg. et G	160.	64.
— frondescens β Synops.	133.	37.	— stolonifera β Synops.	113.	17.
— germana G.	130.	34.	— subcontracta Lg. et G.	107.	11.
— — β Mülleriana	131.	35.	— subconvoluta G.	120.	24.
— gymnochalyrina Lg.	139.	43.	— suberistata G.	150.	54.
— heteromalla L. et Lg.	164.	68.	— supina G.	161.	65.
— hians G.	143.	47.	— tortuosa Lg.	166.	70.
— horrida G.	170.	74.	— truncata G.	121.	25.
— Huatuscana G.	120.	24.	— truncatella G.	132.	36.
— hypnoides Lg.	154.	58.	— Xalapensis G.	117.	21.
— Javanica Lg.	127.	31.	— Zazuapanica G.	116.	20.
— implexa Lg. et G.	172.	76.	Pseudoneura G.	355.	259.
— intermedia Lg. et G.	111.	15.	— humilis G.	356.	260.
— irregularis G.	110.	14.	— multifida G.	355.	259.
— Lambertina G.	117.	21.	— Pöppigiana G.	357.	261.
— Lansbergii G.	109.	13.	Radula N. ab Es.	237.	141.
— longispina Lg. et G.	146.	50.	— affinis Lg. et G.	241.	145.
— Martiana N.	124.	28.	— complanata Dum.	248.	152.
— Maximiliana G.	114.	18.	— conferta Lg. et G.	246.	150.
— Miqueliana Lg.	133.	37.	— flaccida Lg. et G.	244.	148.
— miradorensis G.	127.	31.	— macrostachya Lg. et G.	245.	149.
— Mülleriana G.	134.	38.	— Mexicana Lg. et G.	246.	150.
— ovata Lg. et G.	165.	69.	— mollis Lg. et G.	241.	145.
— patula N.	105.	9.	— pallens N. ab Es.	243.	147.
— paupercula G.	118.	22.	— quadrata G.	240.	144.
— plicata Lg. et G.	152.	56.	— subinflata Lg. et G.	237.	141.
— porelloides Lg.	157.	61.	— tenella G.	245.	149.
— praetermissa G.	145.	49.	— Xalapensis Mont.	238.	142.
— punctualis G.	153.	57.	Reboulia N.	366.	270.
— Riojaneirensis G.	127.	31.	— hemisphaerica Raddi	366.	270.
— retrorsa G.	163.	67.	Riccia Mich.	373.	277.
— rutilans Lg.	135.	39.	— fluitans Linn.	374.	278.
— rutilans β Synops.	116.	20.	— membranacea Lg. et G.	373.	277.
— sancta G.	168.	72.	Sarcosecyphus Corda	102.	6.
— Schiedeana G.	149.	53.	— Mexicanus Lg. et G.	102.	6.
— Schlimiana G.	123.	27.	Seapania Lg.	175.	79.
— simplex Lg.	137.	41.	— undulata M. N.	175.	79.
— sinuata G.	151.	55.	Sendtnera Endl.	234.	138.
— socia Lg. et G.	115.	19.	— adunca G.	236.	140.
— speciosa Lg. et G.	147.	51.			


	Skrift- terne.	Separat- Atryk.		Skrift- terne.	Separat- Atryk.
	Side	Side		Side	Side
<i>Sendtnera juniperina</i> N. ab Es.	234.	138.	<i>Symphyogyna Brongniartii</i> Mont.	353.	257.
— <i>ochroleuca</i> N. ab Es.	236	140.	— <i>Hymenophyllum M. et N.</i>	352.	256.
— <i>Orizabensis</i> G.	235.	139.	— <i>podophylla M. et N.</i>	352.	256.
<i>Sphagnoecetis</i> N. ab Es.	197.	101.	— <i>sinuata M. et N.</i>	353.	257.
— <i>communis</i> N. ab Es. . .	199.	103.			
— <i>prostrata</i> N. ab Es. . . .	198.	102.	<i>Targionia Micheli</i>	369.	273.
— <i>stolonifera</i> Lg. et G. . .	198.	102.	— <i>convoluta Lg. et G.</i>	369.	273.
— <i>variabilis</i> Lg. et G. . .	197.	101.	— <i>Mexicana L. L.</i>	369.	273.
<i>Symphyogyna</i> M. et N.	352.	256.	<i>Trichocolea Dumort.</i>	214.	118.
— <i>Brasiliensis</i> N. ab Es. . .	354.	258.	— <i>tomentosa G.</i>	215.	119.

Oversigt over de afbildede Arter:
(Species in tabulis I—XX depictæ.)

	Tab.		Tab.
<i>Chiloscyphus amphibolius</i> N. ab Es.	XIX.	<i>Plagiochila exesa</i> Lg. et G.	XVI.
— <i>combinatus</i> N. ab Es.	XX.	— <i>expansa</i> G.	XVI.
— <i>Orizabensis</i> G.	XIX.	— <i>fastigiata</i> Lg. et G.	XIII.
<i>Gymnanthe Liebmanniana</i> vid. <i>Lindigia</i>	XX.	— <i>flavescens</i> G.	VII.
<i>Isotachis multiceps</i> G.	XVII.	— <i>frausa</i> G.	XII.
<i>Jungermannia amoena</i> Lg. et G.	XVIII.	— <i>germana</i> G.	XIV.
— <i>callithrix</i> Lg. et G.	XVII.	— <i>horrida</i>	XIII.
— <i>concreta</i> G.	XIX.	— <i>implexa</i> Lg. et G.	XIII.
— <i>conformis</i> Lg. et G.	XVII.	— <i>intermedia</i>	I.
— <i>intricata</i> Lg. et G.	XVIII.	— <i>irregularis</i> G.	XI.
— <i>linguifolia</i> G.	XIX.	— <i>longispina</i> Lg. et G.	VII.
— <i>nuda</i> Lg. et G.	XVIII.	— <i>Martiniana</i> N.	IV.
— <i>parea</i> G.	XIX.	— <i>Miqueliania</i> Lg.	XV.
— <i>subtilis</i> Lg. et G.	XVIII.	— <i>miradorensis</i> G.	X.
<i>Leioscyphus Liebmannianus</i> G.	XVII.	— <i>Mülleriana</i> G.	XVI.
<i>Lindigia Liebmanniana</i> G.	XX.	— <i>ovata</i> Lg. et G.	XII.
<i>Lophocolea aberrans</i> Lg. et G.	XVIII.	— <i>patula</i> N.	II.
— <i>Liebmanniana</i> G.	XVIII.	— <i>paupercula</i> G.	II.
<i>Plagiochila acanthoda</i> Lg. et G.	V.	— <i>plicata</i> Lg. et G.	IX.
— <i>aërea</i> Tayl.	IV.	— <i>punctualis</i> G.	X.
— <i>affinis</i> Lg. et G.	VIII.	— <i>retrorsa</i> G.	XI.
— <i>aliena</i> G.	I.	— <i>rutilans</i> Lg.	VI.
— <i>alternans</i> Lg. et G.	VII.	— <i>sancta</i> G.	XIII.
— <i>anomala</i> Lg. et G.	VII.	— <i>Schiedeana</i> G.	IX.
— <i>apicalis</i> G.	III.	— <i>Schlimgiana</i> G.	I.
— <i>bicuspidata</i> G.	IV.	— <i>sinuata</i> G.	X.
— <i>bursata</i> Lg.	XV.	— <i>socia</i> Lg. et G.	II.
— <i>Chinantlana</i> G.	V.	— <i>speciosa</i>	VIII.
— <i>connata</i> Lg. et G.	VIII.	— <i>stolonifera</i> β <i>Synops.</i>	XI.
— <i>contigua</i> G.	XIV.	— <i>subcontracta</i> Lg. et G.	III.
— <i>erispata</i> G.	XV.	— <i>subconvoluta</i>	III.
— <i>eucullata</i> Lg. et G.	XI.	— <i>subcristata</i> G.	X.
— <i>cuneata</i> Lg. et G.	IV.	— <i>supina</i> G.	XII.
— <i>demissa</i> G.	XVI.	— <i>truncata</i> G.	XIV & X.
— <i>dimorpha</i> Lg. et G.	XIV & I.	— <i>Xalapensis</i> G.	III.
— <i>distinctifolia</i> Lg.	VI.	— <i>Zacuapanica</i> G.	VI.
— <i>diversifolia</i> Lg. et G.	XV & VII.	<i>Radula affinis</i> Lg. et G.	XX.
— <i>dubia</i> Lg. et G.	II.	— <i>subinflata</i> Lg. et G.	XX.



Plagiochila dimorpha.



Plagiochila intermedia.



Plagiochila Schlimiana. J.




Plagiochila aliena.



Plagiochila socia.




Plagiochila patula.



Plagiochila dubia.



Plagiochila paupercula.




Plagiochila xalapensis.




Plagiochila subconvoluta.




Plagiochila subcontracta.



Plagiochila apicalis.



Plagiochila Martiana f. tenerior.



Plagiochila bicuspida.





Plagiochila cuneata.



Plagiochila aerea.

Augusta Thorne sculpt.






Plagiochila distinctifolia. α .




Plagiochila distinctifolia. β .




Plagiochila rutilans. β . *Liebmanniana*.



Plagiochila *Zacuapanica*.




Plagiochila longispina



Plagiochila alternans.



Plagiochila flavesens.




Plagiochila diversifolia



Plagiochila anomala



Plagiochila speciosa.




Plagiochila affinis.



Plagiochila connata α major.



Plagiochila connata β minor.



Plagiochila plicata α




Plagiochila plicata β .




Plagiochila Schiedeana



Plagiochila sinuata




Plagiochila truncata.



Plagiochila subscripta.



Plagiochila Miradorensis.




Plagiochila punctalis.



Plagiochila retrorsa.




Plagiochila irregularis.




Plagiochila stolonifera.



Plagiochila cucullata.



Plagiochila supina.




Plagiochila ovata.



Plagiochila frusa α.



Plagiochila frusa β.




Plagiochila sancta




Plagiochila fastigiata



Plagiochila implexa



Plagiochila horrida



Plagiochila dimorpha.





Plagiochila truncatella.



Plagiochila contigua.



Plagiochila germana.







Plagiochila Muelleriana.





Plagiochila exesa.




Plagiochila demissa.



Plagiochila expansa.




Jungermannia callitrichia.




Leioscyphus Liebmannianus.




Jungermannia amoena.




Jungermannia muda.




Lophocolea aberrans.




Jg. intricata.




Jg. subtilis.




Lophocolea Liebmanniana.




Jungermannia concreta.



Jungermannia parca.




Chiloscyphus amphibolius.




Jungermannia linguifolia.



Chiloscyphus Orizabensis.




Chiloscyphus combinatus α




Chiloscyphus combinatus β spinosior.


Aut. del.



Gymnanthe Liebmanniana



Radula affinis



Radula subinflata

Angusta Thoren sculpt.